



www.Padasalai.Net

படங்களை தொடுக! பாடசாலை வலைதளத்தை சமூக ஊடகங்களில் பின்தொடர்க!! உடனுக்குடன் புதிய செய்திகளை Notifications-ல் பெறுக!



YouTube



Zoom



Touch Below Links



Download!

12th Standard	Syllabus	Books	Study Materials – EM	Study Materials - TM	Practical	Online Test (EM & TM)
	Monthly Q&A	Mid Term Q&A	Revision Q&A	PTA Book Q&A	Centum Questions	Creative Questions
	Quarterly Exam	Half Yearly Exam	Public Exam	NEET		

11th Standard	Syllabus	Books	Study Materials – EM	Study Materials - TM	Practical	Online Test (EM & TM)
	Monthly Q&A	Mid Term Q&A	Revision Q&A	Centum Questions	Creative Questions	
	Quarterly Exam	Half Yearly Exam	Public Exam	NEET		

10th Standard	Syllabus	Books	Study Materials - EM	Study Materials - TM	Practical	Online Test (EM & TM)
	Monthly Q&A	Mid Term Q&A	Revision Q&A	PTA Book Q&A	Centum Questions	Creative Questions
	Quarterly Exam	Half Yearly Exam	Public Exam	NTSE	SLAS	

9th Standard	Syllabus	Books	Study Materials	1st Mid Term	2nd Mid Term	3rd Mid Term
	Quarterly Exam	Half Yearly Exam	Annual Exam	RTE		

8th Standard	Syllabus	Books	Study Materials	1st Mid Term	2nd Mid Term	3rd Mid Term
	Term 1	Term 2	Term 3	Public Model Q&A	NMMS	Periodical Test

7th Standard	Syllabus	Books	Study Materials	1st Mid Term	2nd Mid Term	3rd Mid Term
	Term 1	Term 2	Term 3	Periodical Test	SLAS	

6th Standard	Syllabus	Books	Study Materials	1st Mid Term	2nd Mid Term	3rd Mid Term
	Term 1	Term 2	Term 3	Periodical Test	SLAS	

1st to 5th Standard	Syllabus	Books	Study Materials	Periodical Test	SLAS	
	Term 1	Term 2	Term 3	Public Model Q&A		

Exams	TET	TNPSC	PGTRB	Polytechnic	Police	Computer Instructor
	DEO	BEO	LAB Asst	NMMS	RTE	NTSE

Portal	Matrimony	Mutual Transfer	Job Portal
---------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------

Volunteers	Centum Team	Creative Team	Key Answer Team
-------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Downloads	LESSON PLAN	Department Exam	Income Tax	Forms & Proposals	Fonts	Downloads
	Proceedings	GO's	Regulation Orders	Pay Orders	Panel	



Padasalai – Official Android App – [Download Here](#)



Kindly Send Your Study Materials, Q&A to our Email ID – Padasalai.net@gmail.com



ARTHI

Every second watching my black eye

*Learn every second ,
Learn every person,
Learn everything,*

COMPLEX NUMBER

12



Mr DEEPAK M.Sc., M.A., B.Ed., DCA.,
Mrs ARTHIDEEPAK B.E(ECE).,

Mail: darthi99ktp@gmail.com

Ph.number: 9944249262

2. Complex Number

properties of complex numbers:

Under Additions

* Let z_1, z_2 and z_3 are complex numbers

(i) Closure property $\Rightarrow$ மூடும்பணம்

$z_1 + z_2$ is a complex numbers

(ii) commutative property $\Rightarrow$ பரிமாற்றப் பணம்

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1$$

(iii) Associative property $\Rightarrow$ சேர்ப்பு பணம்

$$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$$

(iv) Additive identity $\Rightarrow$ எல்லைப்பணம்

$$z + 0 = 0 + z = z$$

(v) Additive inverse $\Rightarrow$ எதிர்மறைப் பணம்

$$(z + (-z)) = (-z + z) = 0$$

Under Multiplication

(i) closure property

z_1, z_2 is also a complex number

(ii) commutative property

$$z_1 z_2 = z_2 z_1$$

(iii) Associative property

$$(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$$

(iv) Multiplicative identity

$$z_1 \cdot 1 = 1 \cdot z_1 = z_1$$

(v) Multiplicative inverse

$$z \cdot w = w \cdot z = 1$$

$$w = z$$

$$w = z^{-1}$$

Distributive property (Multiplication distributes over addition)
பகிர்வெண் பண்பு

$$z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$$

$$\text{Also, } (z_1 + z_2) z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3$$

* conjugate of $x+iy$ is $x-iy$

$$* |z_1 - z_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

$$* |z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$* \left| |z_1| - |z_2| \right| \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$* \left| |z_1| - |z_2| \right| \leq |z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$* |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$$

* Let $a+ib = \sqrt{x+iy}$ then

$$x = \frac{\sqrt{a^2 + b^2} + a}{2}$$

$$y = \pm \sqrt{\frac{\sqrt{a^2+b^2} - a}{2}}$$

* $|z - z_0| < r$ represents the points interior of the circle

* $|z - z_0| > r$ represents the points ~~interior~~^{ex}terior of the circle

$$* \arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2$$

$$* \arg\left[\frac{z_1}{z_2}\right] = \arg z_1 - \arg z_2$$

$$* \arg(z^n) = n \arg z$$

* Alternate form of $\cos \theta + i \sin \theta$ is $\cos(2k\pi + \theta) + i \sin(2k\pi + \theta)$, $k \in \mathbb{Z}$

Euler's formula

$$* e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \text{ or } z = re^{i\theta}$$

* If $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ then

$$z^{-1} = \frac{1}{r}(\cos \theta - i \sin \theta)$$

$$* z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

$$* \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} [\cos(\theta_1 - \theta_2) + i \sin(\theta_1 - \theta_2)]$$

$$* (\cos \theta - i \sin \theta)^n = \cos n\theta - i \sin n\theta \text{ A } (\cos \theta + i \sin \theta)^{-n} \\ = \cos n\theta - i \sin n\theta$$

$$* (\cos \theta - i \sin \theta)^{-n} = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

$$= i (\cos \theta - i \sin \theta)$$

$$* 1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1} = 0$$

where ω is the n^{th} root of unity

$$1 - \omega - \omega^2 \dots \omega^{n-1} = (-1)^{n-1}$$

$$\omega^{n-k} = \omega^{-k} = (\bar{\omega})^k \quad 0 \leq k \leq n-1$$

$$* i^0 = 1, i^1 = i, i^4 = 1, i^{-4} = 1, (i)^{-1} = -i,$$

$$(i)^{-2} = -1, (i)^{-3} = i$$

* $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ is valid only if atleast one of a, b is non-negative.

when $z_1 = x_1 + iy_1$ and $z_2 = x_2 + iy_2$ then

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$

$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

properties of complex conjugates

$$(1) \quad \overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$$

$$(2) \quad \overline{z_1 - z_2} = \overline{z_1} - \overline{z_2}$$

$$(3) \quad \overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$$

$$(4) \left[\frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}} \right] = \frac{\overline{z_1}}{\overline{z_2}}, \quad z_2 \neq 0$$

$$(5) \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \overline{z}}{2}$$

known

$$(6) \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \overline{z}}{2i}$$

$$(7) (\overline{z^n}) = (\overline{z})^n, \text{ where } n \text{ is an integer}$$

$$(8) z \text{ is real iff } z = \overline{z}$$

$$(9) z \text{ is purely imaginary iff } z = -\overline{z}$$

$$(10) \overline{\overline{z}} = z$$

properties of modulus of a complex number

$$(1) |z| = |\overline{z}|$$

$$(2) |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

(Triangle inequality)

$$(3) |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$$

$$(4) |z_1 - z_2| \geq \left| |z_1| - |z_2| \right|$$

$$(5) \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$$

$$(6) |z^n| = |z|^n, \text{ where } n \text{ is an integer}$$

$$(7) \operatorname{Re}(z) \leq |z|$$

$$(8) \operatorname{Im}(z) \leq |z|$$

கலப்பெண்கள்


சமன்பாடு : 1

$$x^2 - 1 = 0$$

$$x^2 = 1$$

$$x = \pm \sqrt{1}$$

$$x = \pm 1$$



$x = -1$ மற்றும் $x = 1$ என்ற இரண்டு மையம் எண் தீர்வுகள் உள்ளன.


கிச்சமன்பாட்டை தீர்ப்பது எப்பதும் $f(x) = x^2 - 1$ என்ற வளைவறையின் x மைட்டுத்துண்டுகளை காண்பதும் வகற்றுதான்.

x - சச்ச வளைவறையு $(-1, 0)$ மற்றும் $(1, 0)$ சாகிய

முள்ளிகளில் மைடுகிறது.

சமன்பாடு 2 :

$$x = \pm \sqrt{-1}$$



சமன்பாடு (2) க்கு மெய் தீர்வுகள் கில்லை

$f(x) = x^2 + 1$ என்ற வளைவரை வரப்படத்திறிந்து
கிது x எச்சை வடிபாது.

கிதற்காண காரணம் என்ன வென்றால், ஒரு மெய்
எண்ணை வர்க்கப்படுத்தி ஒரு குறை எண்ணைப் பெறுவது
என்பது கியலாது காரியமாகும்.

கற்பனை எலகி i க் அடுக்கிகள் :

(i) $i^0 = 1$

(ii) $i^1 = i$

(iii) $i^2 = -1$

(iv) $i^3 = (i)^2 (i) = (-1)(i) = -i$

(v) $i^4 = (i)^2 (i)^2 = (-1)(-1) = 1$

(vi) $(i)^{-1} = \frac{1}{i} \times \frac{i}{i} = \frac{i}{i^2} = \frac{i}{-1} = -i$

(vii) $(i)^{-2} = \frac{1}{i^2} = \frac{1}{-1} = -1$

$$(viii) (i)^{-3} = \frac{1}{i^3} = \frac{1}{i^2} \times \frac{1}{i} = \frac{1}{-1} \times \frac{1}{i} = \frac{1}{-1} \times \frac{i}{i} \\ = \frac{i}{-(i)^2} = \frac{i}{+1}$$

$$(ix) (i)^{-4} = \frac{1}{i^4} = \frac{1}{i^2} \times \frac{1}{i^2} = \frac{1}{-1} \times \frac{1}{-1} = \frac{1}{1} = 1$$

இதிலிருந்து :

$$(i)^n = (i)^{4q+k} = (i)^{4q} (i)^k = (i^4)^q (i)^k = (1)^q (i)^k \\ = i^k$$

எ.கா : 2.1

i) i^7

தீர்வு :

$$i^7 = (i)^{4+3} \\ = (i)^4 (i)^3 \\ = (1)(-i) \\ = -i$$

ii) i^{1729}

தீர்வு :

$$i^{1729} = i^{1728} i \\ = (1)(i) \\ = i$$

$$4 \overline{) 1729} \begin{array}{r} 432 \\ 16 \\ \hline 12 \\ 12 \\ \hline 4 \\ 4 \\ \hline 0 \end{array}$$

(iii) $i^{-1924} + i^{2018}$

தீர்வு :

$$i^{-1924} + i^{2018} = i^{-1924} + (i)^{2016+2}$$

$$= (1) + i^2$$

$$= (1) + (-1)$$

$$= 0$$

$$\begin{array}{r} 4 \overline{) 1924 (481} \\ \underline{16} \\ 32 \\ \underline{32} \\ 4 \\ \underline{4} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \overline{) 2018 (504} \\ \underline{20} \\ 12 \\ \underline{16} \\ 6 \\ \underline{0} \\ 6 \end{array}$$

iv $\sum_{n=1}^{102} i^n$

தீர்வு :

$$\sum_{n=1}^{102} i^n = (i^1 + i^2 + i^3 + i^4) + (i^5 + i^6 + i^7 + i^8) + \dots + (i^{97} + i^{98} + i^{99} + i^{100}) + i^{101} + i^{102}$$

$$= \{ i + (-1) + (-i) + 1 \} + \dots + i + (-1)$$

$$= 0 + i - 1$$

cQ i^{15}

தீர்வு :

$$(i)^{15} = (i)^4 (i)^4 (i)^4 (i)^3$$

$$= 1 \times 1 \times 1 \times -i$$

$$= (1)(-i)$$

$$= -i$$

Q. (ii) $(i)^{21}$

தீர்வு :

$$= (i)^4 (i)^4 (i)^4 (i)^4 (i)^4 (i)^1$$

$$= 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times i$$

$$= (1) (+i)$$

$$= i$$

Q. iii $(i)^{1729}$

தீர்வு :

$$= (i)^{1728} (i)^1$$

$$= 1 \times i$$

$$= i$$

Q. iv $(i)^{2018}$

தீர்வு :

$$= (i)^{2016} (i)^2$$

$$= 1 \times (-1)$$

$$= -1$$

Q. v $(i)^{-1924}$

தீர்வு :

$$(i)^{-1924} = \frac{1}{i^{1924}}$$

$$= \frac{1}{1} = 1$$

$$v) \sum_{n=1}^{102} i^n$$

தீர்வு

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{102} i^n &= i^1 + i^2 + i^3 + i^4 + i^5 + i^6 + i^7 + i^8 + \dots + i^{101} + i^{102} \\ &= (i - i) + (i^2 - i^2) + \dots + i + i^2 \\ &= 0 + 0 + \dots + i + i^2 \\ &= i + i^2 \\ &= i - 1 \end{aligned}$$

$$vi) i i^2 i^3 \dots i^{40}$$

தீர்வு:

$$\begin{aligned} i i^2 i^3 \dots i^{40} &= i^{1+2+3+\dots+40} \\ &= i^{\frac{40(40+1)}{2}} \\ &= i^{\frac{40(41)}{2}} \\ &= i^{820} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$\frac{40(41)}{2} = 820$
 $820 \div 4 = 205$
 $205 \div 4 = 51$ remainder 1
 $51 \div 4 = 12$ remainder 3
 $12 \div 4 = 3$ remainder 0
 $3 \div 4 = 0$ remainder 3
 So, $i^{820} = i^3 = -i$

Complex Numbers

Exercise : 2.1

Simplify the following :-

i) $i^{1947} + i^{1950}$

Soln :

$$\begin{aligned} i^{1947} + i^{1950} &= (i)^{3 \times 649} + (i)^2 \\ &= -i + (-1) \\ &= -i - 1 \\ &= -1 - i \end{aligned}$$

ii) $i^{1948} - i^{-1869}$

Soln :

$$\begin{aligned} (i)^{1948} - (i)^{-1869} &= (i)^0 - (i)^{-1} \\ &= 1 + i \end{aligned}$$

iii) $\sum_{n=1}^{12} i^n$

Soln :

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{12} i^n &= (i^1 + i^2 + i^3 + i^4) + \\ &\quad (i^5 + i^6 + i^7 + i^8) + \\ &\quad (i^9 + i^{10} + i^{11} + i^{12}) \\ &= (i - 1 - i + 1) + \\ &\quad (i - 1 - i + 1) + \\ &\quad (i - 1 - i + 1) \\ &= 0 + 0 + 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

iv) $i^{59} + \frac{1}{i^{59}}$

Soln :

$$\begin{aligned} i^{59} + \frac{1}{i^{59}} &= (i)^{59} + (i)^{-59} \\ &= (i)^3 + (i)^{-3} \\ &= -i + i \\ &= 0 \end{aligned}$$

v) $i i^2 i^3 \dots i^{2000}$

Soln :

$$\begin{aligned} (i) (i)^2 (i)^3 \dots (i)^{2000} &= i^{1+2+3+\dots+2000} \\ &= (i)^{\frac{2000(2001)}{2}} \\ &= (i)^{1000(2001)} \\ &= (i)^{2001000} \\ &= (i)^0 = 1 \end{aligned}$$

vi) $\sum_{n=1}^{10} i^{n+50}$

Soln :

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{10} i^{n+50} &= (i)^{1+50} + (i)^{2+50} + \dots + (i)^{10+50} \\ &= (i)^{51} + (i)^{52} + \dots + (i)^{60} \end{aligned}$$

Taking $(i)^{50}$ common we get

$$\begin{aligned} &= (i)^{50} [(i)^1 + (i)^2 + (i)^3 + (i)^4 + \\ &\quad (i)^5 + (i)^6 + (i)^7 + (i)^8 + \\ &\quad (i)^9 + (i)^{10}] \end{aligned}$$

$$= (i)^{50} [0 + 0 + i^9 + i^{10}]$$

$$= (i)^{50} [i + i^2]$$

$$= (i)^{50} (i - 1)$$

$$= (i)^2 (i - 1)$$

$$= i^3 - i^2$$

$$= -i + 1$$

$$= 1 - i$$

கலப்பெண்கள்

2m செவ்வக வடிவம்:

ஒரு கலப்பெண்ணின் செவ்வக வடிவம் என்பது $(x+iy)$ அல்லது $(x+iyi)$ ஆகும்.

இங்கு, x மற்றும் y ஆகியவை மெய்யெண்களாகும். இதில் x என்பது கலப்பெண்ணின் மெய்பகுதி எனவும் y என்பது கற்பனைப்பகுதி எனவும் அழைக்கப் படுகின்றது.

குறிப்பு:

முற்றியம் மட்டும் தான் ஒரு நேரத்தில் முடிவதும் மெய்யெண்ணாகவும், கற்பனை எண்ணாகவும் இருக்கும்.

வரையறை:

1m

கிரண்டு கலப்பெண்கள் $z_1 = x_1 + iy_1$ மற்றும் $z_2 = x_2 + iy_2$ ஆகியவை சமமாக இருக்க வேண்டியதும் பொதுமானது. நிபந்தனை $Re(z_1) = Re(z_2)$ மற்றும் $Im(z_1) = Im(z_2)$ அதாவது $x_1 = x_2$, $y_1 = y_2$

எ.கா:

$$\alpha + i\beta = -7 + 3i$$

$$\alpha = -7$$

$$\beta = 3$$

20

சுருக்கன் தளம் (Argand plane) :

ஒரு கலப்பை $Z = x + iy$ ஐ ஆரே ஒரு வடிவில் (x, y) என்ற மெய்யெண்களின் வரிசை ஜோடியாக எழுதலாம்.

$3 - 8i$, 6 மற்றும் $-4i$ கூகிய கலப்பைகள் முறையே

$(3, -8)$, $(6, 0)$, $(0, -4)$ என வரிசை ஜோடிகளாக


எழுதலாம்.

கிவ்வாறாக, $Z = x + iy$ என்ற கலப்பைண்ணை (x, y) என்ற புள்ளியால் கூய அச்ச தளத்தில் தொடர்புபடுத்தலாம்.

x அச்ச மெய்யெண்ணாகவும், y அச்ச கற்பனை. அச்சாகவும் கொண்டால் $x + iy$ தளத்தை கலப்பை தளம் (அ) சுருக்கன் தளம் என்கிறோம்.

குறிப்பு :

சுருக்கன் தளம் என்ற பெயராகது சுவிட்சர்லாந்தைச் சார்ந்த கணிதவியலாளர் லெவன் சுருக்கன் என்பவரின் நினைவாக பெயரிடப்பட்டது.




ஒரு புள்ளியாக கலப்பை

Imaginary axis

$x + iy$


Real axis

உதயகர்த்த அபிமானம் கருவிக்
நினைவாக கலப்பை



வினாக்கள் எடுத்துக்காட்டு:

$2+i$, $-1+2i$, $3-2i$, $0-2i$, $3+\sqrt{2}$, $-2-3i$, $\cos \pi/6 + i \sin \pi/6$
மற்றும் $3+0i$ ஆகியவை ஆங்காள் தளத்தில்



கலப்பெண்களின் மீதான கியூம்கணிதச் செயல்பாடுகள்

Algebraic Operations on complex Numbers

கலப்பெண்களின் திணைமலிப் பைங்கம்


$$z = x + iy$$

$$kz = (kx) + (ky)i$$


குறிப்புகள்

$$0z = 0, 1z = z, (-1)z = -z$$


$$K = 2, \frac{1}{2}, -1$$



$K=2$ ஸ்கேல்



$K = \frac{1}{2}$ ஸ்கேல்



$K = -1$ ஸ்கேல்


கலப்பெண்களின் கூட்டல் :

$$z_1 = x_1 + iy_1$$

$$z_2 = x_2 + iy_2$$

$$z_1 + z_2 = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2)$$

$$= (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$




கலப்பெண்களின் கழித்தல் :

$$z_1 = x_1 + iy_1$$

$$z_2 = x_2 + iy_2$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 + iy_1) - (x_2 + iy_2)$$

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$



கலப்பெண்களின் பெருக்கல் :

$$z_1 = x_1 + iy_1$$

$$z_2 = x_2 + iy_2$$

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) \\ &= (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1) \end{aligned}$$


மேற்றிப்பு

z யை i கால் பெருக்கிதல்

$$z = x + iy$$

$$iz = i(x + iy)$$

$$= -y + ix$$



கலப்பெண் iz என்பது கலப்பெண் z யை 90° (அ) $\pi/2$ டிகிரி கட்டி சுழற்றிவிடும். அதாவது z யை 90° (அ) $\pi/2$ டிகிரி சுழற்றிவிடும்.

வினாக்கள் எடுத்துக்காட்டு : 2

i) $z_1 = 6 + 7i$

$$z_2 = 3 - 5i$$

தீர்வு :

$$z_1 + z_2 = (6 + 7i) + (3 - 5i)$$

$$= (6 + 3) + 7i - 5i$$

$$= 9 + 2i$$

$$z_1 - z_2 = (6 + 7i) - (3 - 5i)$$

$$= 6 + 7i - 3 + 5i$$

$$= 3 + 12i$$

$$(i) \quad z_1 = 2+3i$$

$$z_2 = 4+7i$$

$$z_1 z_2 = (2+3i)(4+7i) = 8+14i+12i+21i^2$$

$$= 8+12i+14i-21$$

$$z_1 z_2 = -13+26i$$

எ.கா: 2.2 ✓ (9)

$$(2+i)x + (1-i)y + 2i - 3 \text{ மற்றும் } x + (-1+2i)y + 1+i$$

சூழிய கலப்பணங்கள் சமம் எனில் x மற்றும் y ன் மூலம்
மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு:

$$z_1 = (2+i)x + (1-i)y + 2i - 3$$

$$= 2x + xi + y - yi + 2i - 3$$

$$= (2x + y - 3) + i(x - y + 2) \rightarrow (1)$$

$$z_2 = x + (-1+2i)y + 1+i$$

$$= x - y + 2yi + 1+i$$

$$= (x - y + 1) + i(2y + 1) \rightarrow (2)$$

$$z_1 = z_2$$

$$(2x + y - 3) + i(x - y + 2) = (x - y + 1) + i(2y + 1)$$

இருபுறமும் மெய் பகுதிகளை சமப்படுத்தி

$$2x + y - 3 = x - y + 1$$

$$2x + y - 3 - x + y - 1 = 0$$

$$x + 2y - 4 = 0$$

$$x + 2y = 4 \rightarrow (3)$$

கிடைசும் கற்பனை பகுதிகளை சம்பந்தம்:

$$x - y + 2 = 2y + 1$$

$$x - y + 2 - 2y - 1 = 0$$

$$x - 3y + 1 = 0$$

$$x - 3y = -1 \rightarrow (4)$$

$$x + 2y = 4$$

$$x - 3y = -1$$

(3) - (4)

$$\begin{array}{r} (-) \quad (+) \quad (+) \\ \hline \end{array}$$

$$5y = 5$$

$$y = \frac{5}{5}$$

$$y = 1$$

$y = 1$ ன்றால் (3) ல் பிரதியிட,

$$(3) \Rightarrow x + 2(1) = 4$$

$$x = 4 - 2$$

$$x = 2$$

தீர்வு:

$x = 2$
$y = 1$

Exercise : 2.2

1. Evaluate the following if $z = 5 - 2i$ and $w = -1 + 3i$.

i) $z + w$.

Soln

$$z = 5 - 2i$$

$$w = -1 + 3i$$

$$\begin{aligned} z + w &= (5 - 2i) + (-1 + 3i) \\ &= (5 - 1) + (-2i + 3i) \\ &= 4 + i \end{aligned}$$

ii) $z - iw$

$$\begin{aligned} &= (5 - 2i) - i(-1 + 3i) \\ &= 5 - 2i + i - 3i^2 \\ &= 5 - 2i + i + 3 \\ &= 8 - i \end{aligned}$$

iii) $2z + 3w$

$$\begin{aligned} &= 2(5 - 2i) + 3(-1 + 3i) \\ &= 10 - 4i - 3 + 9i \\ &= 7 + 5i \end{aligned}$$

iv) $z^2 + 2zW + W^2$

$$\begin{aligned} &= (5 - 2i)^2 + 2(5 - 2i)(-1 + 3i) + (-1 + 3i)^2 \\ &= 25 + 4i^2 - 20i + 2[-5 + 15i + 2i - 6i^2] + 1 + 9i^2 + 2(-1)(3i) \\ &= 25 + (-4) - 20i + 2(-5 + 17i + 6) + 1 - 9 - 6i \\ &= 21 - 20i + 2(17i + 1) - 8 - 6i \\ &= 21 - 20i + 2 + 34i - 8 - 6i \\ &= 15 + 8i \end{aligned}$$

v) zw

$$\begin{aligned} &= (5 - 2i)(-1 + 3i) \\ &= -5 + 15i + 2i - 6i^2 \\ &= -5 + 15i + 2i + 6 \end{aligned}$$

$$= 1 + 17i$$

vi) $(z + w)^2$

$$\begin{aligned} &= [(5 - 2i) + (-1 + 3i)]^2 \\ &= [(5 - 1) + (-2i + 3i)]^2 \\ &= (4 + i)^2 \\ &= 16 + i^2 + 8i \end{aligned}$$

$$= 16 - 1 + 8i$$

$$= 15 + 8i$$

2. Given the complex number $z = 2 + 3i$, represent the complex numbers in Argand diagram.

i) z , iz and $z + iz$.

Soln

$$z = 2 + 3i$$

can be represented as $(2, 3)$

$$iz = i(2 + 3i)$$

$$= 2i + 3i^2 = 2i + 3(-1)$$

$$= 2i - 3 = -3 + 2i$$

can be represented as $(-3, 2)$

$$z + iz = (2 + 3i) + i(2 + 3i)$$


$$= 2 + 3i + 2i + 3i^2$$

$$= 2 + 5i + 3(-1)$$

$$= -1 + 5i$$

can be represented as $(-1, 5)$

in the argand diagram.



iii) z , $-iz$ and $z - iz$

Soln

$$z = 2 + 3i$$

can be represented as $(2, 3)$.

$$iz = -i(2 + 3i) = -2i - 3i^2$$

$$= -2i + 3$$

$$= 3 - 2i$$

can be represented as $(3, -2)$.


$$z - iz = (2 + 3i) - i(2 + 3i)$$

$$= 2 + 3i - 2i - 3i^2$$

$$= 2 + i + 3$$

$$= 5 + i$$

can be represented as $(5, 1)$



3. Find the values of the real numbers x and y , if the complex numbers.

$(3-i)x - (2-i)y + 2i + 5$ and $2x + (-1+2i)y + 3+2i$ are equal.

Soln :

$$\begin{aligned} \text{Given: } & (3-i)x - (2-i)y + 2i + 5 \\ & = 3x - ix - 2y + iy + 2i + 5 \\ & = (3x - 2y + 5) + i(-x + y + 2) \rightarrow (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Given } & 2x + (-1+2i)y + 3+2i \\ & = 2x - y + 2iy + 3 + 2i \\ & = (2x - y + 3) + i(2y + 2) \rightarrow (2) \end{aligned}$$

From (1) and (2) are equal

$$(3x - 2y + 5) + i(-x + y + 2) = (2x - y + 3) + i(2y + 2)$$

Equating the real part of both sides.

$$3x - 2y + 5 = 2x - y + 3$$

$$3x - 2x - 2y + y + 5 - 3 = 0$$

$$x - y + 2 = 0 \rightarrow (3)$$

Equating an imaginary part of both sides.

$$-x + y + 2 = 2y + 2$$

$$-x + y + 2 - 2y - 2 = 0$$

$$-x - y - 0 = 0$$

$$x + y = 0.$$

(3) - (4) We get

$$x - y = -2 \rightarrow (3)$$

$$x + y = 0 \rightarrow (4)$$

$$\begin{array}{r} (-) \quad (-) \quad (-) \\ \hline -2y = -2 \end{array}$$

$$(3) - (4) \Rightarrow -2y = -2$$

$$y = 1$$

Put $y=1$ in (3) equation

$$(3) \Rightarrow x - (1) = -2$$

$$x = -2 + 1$$

$$x = -1$$

Result.:

$x = -1$
$y = 1$

கலப்பெண்களின் பண்புகள் :

Basic Algebraic properties of complex numbers

கூட்டலைப் பொறித்து :

I சிதையுபண்பு

z_1 மற்றும் z_2 என்ற ஏதேனும் இரண்டு கலப்பெண்களின் கூடுதல் $z_1 + z_2$ ஆம் ஆடு கலப்பெண் ஆகும்.

II பரிமாற்றுப்பண்பு

z_1, z_2 என்பது ஏதேனும் இரண்டு கலப்பெண் என்க.

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1$$

III இயைபுபண்பு

$z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ என்க.

$$(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$$

IV கூட்டல் சமனி

எந்த ஆடு கலப்பெண் z க்கும் $0 = 0 + 0i$ என்ற ஆடு கலப்பெண்ணினை $z + 0 = 0 + z = z$ என்றவாறு காணலாம்.

$0 = 0 + 0i$ என்ற கலப்பெண்ணினை கூட்டல் சமனி என்கிறோம்.

V கூட்டல் நேர்மாறு

எந்த ஆடு கலப்பெண் z க்கும் $-z$ என்ற ஆடு கலப்பெண்ணினை $z + (-z) = (-z) + z = 0$ என்றவாறு காணலாம்.

z ன் கூட்டல் நேர்மாறு $-z$ என்கிறோம்.

பெருக்கலை பொருத்து

சிக்கலுபண்பு :

$$z_1, z_2 \in \mathbb{C} \Rightarrow z_1 z_2 \in \mathbb{C}$$

பரிமாற்றுபண்பு :

$$z_1, z_2 \in \mathbb{C} \Rightarrow z_1 z_2 = z_2 z_1$$

சேர்ப்பு பண்பு

$$z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C} \Rightarrow (z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$$

பெருக்கல் சமனி

எந்த ஒரு கலப்பெண் z க்கு $1 = 1+0i$ என்ற

ஒரு கலப்பெண்ணினை

$$z \cdot 1 = 1 \cdot z = z \text{ என்றவாறு காணலாம்.}$$

$1 = 1+0i$ என்ற கலப்பெண்ணினை பெருக்கல் சமனி என்கிறோம்.

பெருக்கல் நேர்மாறு :

எந்த ஒரு மூலக்கூறுமற்ற கலப்பெண் z க்கும் W என்ற ஒரு கலப்பெண்ணினை

$$zW = Wz = 1 \text{ என்றவாறு காணலாம்.}$$

z ன் பெருக்கல் நேர்மாறு W க்கும்.

W னை z^{-1} என குறிப்பர்.

பங்கீட்டு விதி (கூட்டணின் மூலப் பகுதிகளின் பங்கீட்டு விதி)

$$z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C} \Rightarrow z_1(z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$$

$$(z_1 + z_2) z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3$$

கூட்டணின் பரிமாற்று விதி :

Statement:

ஏதேனும் கிடைக்கப்பெறும் z_1 (ம) z_2 இற்கும்

$z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ எனப் பெறலாம்.

Proof

$$z_1 = x_1 + iy_1, z_2 = x_2 + iy_2, x_1, y_1, x_2, y_2 \in \mathbb{R}$$

$$z_1 + z_2 = (x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2)$$

$$= (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2) \rightarrow \textcircled{1}$$

$$z_2 + z_1 = (x_2 + iy_2) + (x_1 + iy_1)$$

$$= (x_2 + x_1) + i(y_2 + y_1)$$

$$= (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2) \rightarrow \textcircled{2}$$

from ① and ②

R.H.S are equal so L.H.S are equal

$$z_1 + z_2 = z_2 + z_1$$

திறிபி :

$$z^m z^n = z^{mn}$$

$$\frac{z^m}{z^n} = z^{m-n}$$

$$(z^m)^n = z^{mn}$$

$$(z_1 z_2)^m = z_1^m z_2^m$$

Padasalai.Net

கலப்பெண்களின் அடிப்படை இயற்கணித பண்புகள்
Basic Algebraic properties of complex numbers

பெருக்கெழுக்கான நேர்மாறு பண்பு

statement

மூலக்கெழுமற்ற எந்த ஒரு கலப்பெண்
 $z = x+iy$ க்கும் பெருக்கெல் நேர்மாறு உண்டது

$$\frac{x}{x^2+y^2} + i \frac{y}{x^2+y^2} \text{ ஆகும்.}$$

proof

$z^{-1} = u+iv$ எனப்பது $z = x+iy$ ன் நேர்மாறு

என்க.

$$zz^{-1} = 1$$

$$(x+iy)(u+iv) = 1$$

$$ux+ivx+iu y+i^2vy = 1$$

$$ux+ivx+iu y-vy = 1$$

$$(ux-vy)+i(vx+uy) = 1+0i$$

இருபுறமும் எம்(1) கற்பணை பகுதிகளை சமப்படுத்த

$$ux - vy = 1 \rightarrow \textcircled{1}$$

$$vx + uy = 0 \rightarrow \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \times x \Rightarrow ux^2 - vx^2y = x \rightarrow \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} \times y \Rightarrow vxy + uy^2 = 0 \rightarrow \textcircled{4}$$

$$ux^2 + uy^2 = x$$

$$u(x^2+y^2) = x$$

$$u = \frac{x}{x^2+y^2} \quad \text{என இவ் பகுதியை}$$

$$\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right)x^2 - vxy = x$$

$$\frac{x^3}{x^2+y^2} - vxy = x$$

$$-vxy = x - \frac{x^3}{x^2+y^2}$$

$$-vxy = \frac{x^3 + xy^2 - x^3}{x^2+y^2}$$

$$-vxy = \frac{xy^2}{x^2+y^2}$$

$$v = \frac{xy^2}{x^2+y^2} \times \frac{1}{xy}$$

$$v = \frac{y}{x^2+y^2}$$

திருந்து :

$$u = \frac{x}{x^2+y^2}$$

$$v = \frac{y}{x^2+y^2}$$

Exercise : 2.3

1. If $z_1 = 1-3i$, $z_2 = -4i$ and $z_3 = 5$, show that

i) $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$

Soln

L.H.S

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= (1-3i) + (-4i) \\ &= 1-7i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (z_1 + z_2) + z_3 &= (1-7i) + 5 \\ &= 6-7i \rightarrow \textcircled{1}. \end{aligned}$$

R.H.S

$$z_2 + z_3 = -4i + 5$$

$$\begin{aligned} z_1 + (z_2 + z_3) &= (1-3i) + (-4i+5) \\ &= 6-7i \rightarrow \textcircled{2}. \end{aligned}$$

From $\textcircled{1}$ and $\textcircled{2}$.

$$L.H.S = R.H.S$$

$$\therefore (z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3).$$

ii) $(z_1 z_2) z_3 = z_1 (z_2 z_3)$

Soln

L.H.S

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (1-3i)(-4i) \\ &= -4i + 12i^2 \\ &= -4i - 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (z_1 z_2) z_3 &= (-4i - 12) 5 \\ &= -20i - 60 \rightarrow \textcircled{1}. \end{aligned}$$

R.H.S

$$\begin{aligned} z_2 z_3 &= (-4i)(5) \\ &= -20i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_1 (z_2 z_3) &= (1-3i)(-20i) \\ &= -20i - 60 \rightarrow \textcircled{2}. \end{aligned}$$

From $\textcircled{1}$ and $\textcircled{2}$.

$$L.H.S = R.H.S$$

$$\therefore z_1 (z_2 z_3) = (z_1 z_2) z_3$$

a. If $z_1 = 3$, $z_2 = -7i$ and $z_3 = 5+4i$ show that

i) $z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3$

Soln

L.H.S

$$\begin{aligned} z_1 (z_2 + z_3) &= 3(-7i + 5 + 4i) \\ &= 3(5 - 3i) \\ &= 15 - 9i \rightarrow \text{①} \end{aligned}$$

R.H.S

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= (3)(-7i) \\ &= -21i \\ z_1 z_3 &= (3)(5+4i) \\ &= 15+12i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (z_1 z_2) + (z_1 z_3) &= -21i + 15 + 12i \\ &= 15 - 9i \rightarrow \text{②} \end{aligned}$$

from ① and ②.

$$\text{L.H.S} = \text{R.H.S}$$

$$z_1 (z_2 + z_3) = z_1 z_2 + z_1 z_3.$$

ii). $(z_1 + z_2) z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3.$

$$\begin{aligned} z_1 + z_2 &= 3 + (-7i) \\ &= 3 - 7i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (z_1 + z_2) z_3 &= (3 - 7i)(5 + 4i) \\ &= 43 - 23i \rightarrow \text{③} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_2 z_3 &= -7i(5 + 4i) \\ &= -35i - 28(i)^2 \\ &= -35i + 28 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_1 z_3 &= 3(5 + 4i) \\ &= 15 + 12i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_1 z_3 + z_2 z_3 &= (-35i + 28) + (15 + 12i) \\ &= 43 - 23i. \end{aligned}$$

$$\therefore (z_1 + z_2) z_3 = z_1 z_3 + z_2 z_3.$$

3. If $z_1 = 2+5i$, $z_2 = -3-4i$ and $z_3 = 1+i$, find the additive and multiplicative inverse z_1 , z_2 and z_3 .

Soln.

Additive :

$$z_1 = 2+5i$$

Additive inverse of $a - z_1 = -2-5i$.

$$z_2 = -3-4i$$

Additive inverse of $a - z_2 = -(-3-4i) = 3+4i$.

$$z_3 = 1+i$$

Additive inverse of $a - z_3 = -(1+i) = -1-i$.

Multiplicative :

$$z_1 = 2 + 5i$$

Multiplicative Inverse of

$$a \quad \frac{1}{z_1} = \frac{1}{2+5i} \times \frac{2-5i}{2-5i}$$

$$= \frac{2-5i}{(2)^2 - (5i)^2}$$

$$= \frac{2-5i}{4 - 25i^2}$$

$$= \frac{2-5i}{4 - 25(-1)}$$

$$= \frac{2-5i}{29}$$

$$z_2 = -3 - 4i$$

z_2 Multiplicative Inverse

$$\text{of } \frac{1}{z_2} = \frac{1}{-3-4i} \times \frac{-3+4i}{-3+4i}$$

$$= \frac{-3+4i}{(-3)^2 - (4i)^2}$$

$$= \frac{-3+4i}{9 + 16}$$

$$= \frac{-3+4i}{25}$$

$$z_3 = 1 + i$$

z_3 Multiplicative Inverse

$$\text{of } \frac{1}{z_3} = \frac{1}{1+i} \times \frac{1-i}{1-i}$$

$$= \frac{1-i}{1-i^2}$$

$$= \frac{1-i}{1+1}$$

$$= \frac{1-i}{2}$$

ஒரு கலப்பெண்ணின் கிணை கலப்பெண் :
conjugate of a complex Number

வரையறை :

$x+iy$ என்ற கலப்பெண்ணின் கிணை
கலப்பெண் $x-iy$ ன் வரையறுக்கப்படுகிறது

இறப்பு :

Z என்ற ஒரு கலப்பெண்ணின் கிணை கலப்பெண்
 $\bar{Z}$ ன் இறப்பிடப்படுகிறது.

Im

Z ன் கிணை கலப்பெண்ணை, படிவதற்கு i க்கு
பதிலாக $-i$ ஐ z ல் பிரதியிட வேண்டும்.

எ.கா :

$3+4i$ ன் கிணை கலப்பெண் $3-4i$

$7-4i$ ன் கிணை கலப்பெண் $7+4i$

Im

கிணை கலப்பெண்ணின் பண்புகள் :

$$1) \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$$

$$2) \overline{z_1 - z_2} = \bar{z}_1 - \bar{z}_2$$

$$3) \overline{z_1 z_2} = \bar{z}_1 \bar{z}_2$$

$$4) \overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}$$

$$5) \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$$

$$6) \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$$

$$7) (\bar{z}^n) = (\bar{z})^n \text{ இங்கு, } n \text{ ஒரு முழுஎண்}$$

பண்பு:

எதையும் இது கலப்பெண்களுக்கு $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$ என நிரூபிக்க

நிபுணம்

$z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$, மற்றும் x_1, x_2, y_1 , மற்றும் $y_2 \in \mathbb{R}$ என்க.

$$\begin{aligned}\overline{z_1 + z_2} &= \overline{(x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2)} \\ &= \overline{(x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)} = (x_1 + x_2) - i(y_1 + y_2) \\ &= (x_1 - iy_1) + (x_2 - iy_2) \\ &= \overline{z_1} + \overline{z_2}.\end{aligned}$$

இதனை கணிதத் தொகுத்தறிதல் மூலம் முடிவுற்ற எண்ணிக்கையிலான கலப்பெண்களுக்கும் இதனை விரிவுபடுத்தலாம். $\overline{z_1 + z_2 + z_3 + \dots + z_n} = \overline{z_1} + \overline{z_2} + \overline{z_3} + \dots + \overline{z_n}$

பண்பு

$\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$ இங்கு x_1, x_2, y_1 , மற்றும் $y_2 \in \mathbb{R}$.

நிபுணம்

$z_1 = x_1 + iy_1$ மற்றும் $z_2 = x_2 + iy_2$ என்க.

ஆகவே, $z_1 z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$.

எனவே, $\overline{z_1 z_2} = \overline{(x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1)} = (x_1 x_2 - y_1 y_2) - i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$,

மேலும் $\overline{z_1} \overline{z_2} = (x_1 - iy_1)(x_2 - iy_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) - i(x_1 y_2 + x_2 y_1)$.

ஆகவே, $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2}$.

பண்பு

z ஒரு முழுவதும் கற்பனை எண் என இருந்தால். இருந்தால் மட்டுமே $z = -\overline{z}$.

நிபுணம்

$z = x + iy$ என்க. வரையறையின்படி $\overline{z} = x - iy$ ஆகும்.

எனவே, $z = -\overline{z}$

$$\Leftrightarrow x + iy = -(x - iy)$$

$$\Leftrightarrow 2x = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$\Leftrightarrow z \text{ ஒரு முழுவதும் கற்பனை எண்.}$$

இதுபோலவே, இணைக் கலப்பெண்களின் மற்ற பண்புகளையும் நிறுவலாம்.

8) z ஒரு மெய்யெண் என இருந்தால், இருந்தால்
மட்டுமே $z = \bar{z}$

9) z ஒரு முடிவதும் தற்பண என. என இருந்தால்,
இருந்தால் மட்டுமே $z = -\bar{z}$

10) $\overline{\bar{z}} = z$

Padasalai.Net

ஓ.கா: 2-3

$\frac{3+4i}{5-12i}$ யை $x+iy$ வடிவில் எழுதுக. இதிலிருந்து மெய் மற்றும் கற்பனை பகுதிகளை காண்க .

$$\begin{aligned}
 \frac{3+4i}{5-12i} &= \frac{3+4i}{5-12i} \times \frac{5+12i}{5+12i} \\
 &= \frac{15+36i+20i+48i^2}{(5)^2-(12i)^2} \\
 &= \frac{15+56i+48(-1)}{25+144} \\
 &= \frac{15+56i-48}{169} \\
 &= \frac{-33+56i}{169} \\
 &= \frac{-33}{169} + \frac{56i}{169}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{-33}{169} + \frac{56}{169}i$$

Result :

$$\text{Real part} = \frac{-33}{169}$$

$$\text{Imaginary part} = \frac{56}{169}$$

எ.கா: 2.4

$$\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3 - \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^3 \text{ ன்று எவ்வாறு கிடைக்கக் காண்க.}$$

$$\begin{aligned} \text{Take } \left(\frac{1+i}{1-i}\right) &= \frac{1+i}{1-i} \times \frac{1+i}{1+i} \\ &= \frac{(1+i)^2}{1^2 - i^2} \\ &= \frac{1+i^2+2(1)(i)}{1+1} \\ &= \frac{2i}{2} \\ &= i \end{aligned}$$

$$\left(\frac{1-i}{1+i}\right) = \left(\frac{1}{\left(\frac{1+i}{1-i}\right)}\right)$$

$$= \frac{1}{i}$$

$$= (i)^{-1} = -i$$

$$\begin{aligned}\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^3 - \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^3 &= (i)^3 - (-i)^3 \\ &= -i - (+i) \\ &= -i - i \\ &= -2i\end{aligned}$$

எ.கா: 2.5

$\frac{z+3}{z-5i} = \frac{1+4i}{2}$ எனில் கலப்பெண் z ஐ எவ்வகையில் காண்க.

$$\frac{z+3}{z-5i} = \frac{1+4i}{2}$$

$$2(z+3) = (1+4i)(z-5i)$$

$$2z+6 = z-5i+4zi-20i^2$$

$$2z+6 = z-5i+4zi+20$$

$$2z+6 = z(1+4i) - 5i+20$$

$$2z - z(1+4i) = -5i+20-6$$

$$(2-1-4i)z = -5i+14$$

$$(1-4i)z = -5i+14$$

$$z = \frac{-5i+14}{1-4i} \times \frac{1+4i}{1+4i}$$

$$= \frac{-5i-20i^2+14+56i}{(1)^2 - (4i)^2}$$

$$= \frac{-5i+20+14+56i}{-1+16}$$

$$= \frac{-5i+34+56i}{17} = \frac{34+51i}{17} = \frac{34}{17} + \frac{51}{17}i = 2+3i$$

த.கா: 2-6

$Z_1 = 3 - 2i$ (ம) $Z_2 = 6 + 4i$ எனில் $\frac{Z_1}{Z_2}$ கைய எக்ஸ்வக

உடனில் எழுதுக.

$$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{3-2i}{6+4i} \times \frac{6-4i}{6-4i}$$

$$= \frac{(3-2i)(6-4i)}{(6)^2 - (4i)^2}$$

$$= \frac{18 - 12i - 12i + 8i^2}{36 - 16i^2}$$

$$= \frac{18 - 24i - 8}{36 - 16(-1)}$$

$$= \frac{-24i + 10}{36 + 16}$$

$$= \frac{-24i + 10}{52}$$

$$= \frac{10 - 24i}{52}$$

$$= \frac{10}{52} - \frac{24}{52}i$$

Result

$$\text{Real part} = \frac{10}{52} = \frac{5}{26}$$

$$\text{Imaginary part} = \frac{-24}{52}i = \frac{-6}{13}i$$

எ.கா: 2.8

நிறுவுத:

i) $(2+i\sqrt{3})^{10} + (2-i\sqrt{3})^{10}$ ஒரு மெய் எண்

தீர்வு:

$$Z = (2+i\sqrt{3})^{10} + (2-i\sqrt{3})^{10} \text{ என்க.}$$

$$\begin{aligned} \bar{Z} &= \overline{(2+i\sqrt{3})^{10} + (2-i\sqrt{3})^{10}} \\ &= \overline{(2+i\sqrt{3})^{10}} + \overline{(2-i\sqrt{3})^{10}} \quad [\overline{Z_1 + Z_2} = \bar{Z}_1 + \bar{Z}_2] \\ &= (\overline{2+i\sqrt{3}})^{10} + (\overline{2-i\sqrt{3}})^{10} \quad [\because (\bar{Z}^n) = (\bar{Z})^n] \\ &= (2-i\sqrt{3})^{10} + (2+i\sqrt{3})^{10} \end{aligned}$$

$$\bar{Z} = Z \Rightarrow Z \text{ is Real part}$$

$\therefore Z$ என்பது மெய்யெண்

ii) $\left(\frac{19+9i}{5-3i}\right)^{15} - \left(\frac{8+i}{1+2i}\right)^{15}$

தீர்வு:

$$\begin{aligned} \left(\frac{19+9i}{5-3i}\right) &= \frac{19+9i}{5-3i} \times \frac{5+3i}{5+3i} \\ &= \frac{95+45i+57i+27i^2}{(5)^2 - (3i)^2} \end{aligned}$$

$$= \frac{95-27+102i}{25+9}$$

$$= \frac{68+102i}{34}$$

$$= \frac{68^2}{34} + \frac{102^2}{34} i$$

$$= 2+3i \rightarrow (1)$$

$$\frac{8+i}{1+2i} = \frac{8+i}{1+2i} \times \frac{1-2i}{1-2i}$$

$$= \frac{8+i-16i-2i^2}{(1)^2-(2i)^2}$$

$$= \frac{8-15i+2}{1+4}$$

$$= \frac{10-15i}{5}$$

$$= \frac{10}{5} - \frac{15i}{5}$$

$$= 2-3i \rightarrow (2)$$

$$Z = (2+3i)^{15} - (2-3i)^{15}$$

$$\bar{Z} = \overline{(2+3i)^{15} - (2-3i)^{15}}$$

$$= \overline{(2+3i)^{15}} - \overline{(2-3i)^{15}} \left[\overline{Z_1 + Z_2} = \overline{Z_1} + \overline{Z_2} \right]$$

$$= (\overline{2+3i})^{15} - (\overline{2-3i})^{15} \left[\therefore (\bar{Z}^n) = (\bar{Z})^n \right]$$

$$\begin{aligned} &= + (2-3i)^{15} - (2+3i)^{15} \\ &= - \left[- (2-3i)^{15} + (2+3i)^{15} \right] \\ &= - \left[+ (2+3i)^{15} - (2-3i)^{15} \right] = -Z \end{aligned}$$

Padasalai.Net

Exercise : 2.4.

1. Write the following in the rectangular form:

i) $(5+9i) + (2-4i)$

Soln

$$\begin{aligned} (5+9i) + (2-4i) &= (5+2) + (9i-4i) \\ &= 7+5i \\ &= 7-5i. \end{aligned}$$

ii) $\frac{10-5i}{6+2i}$

Soln

$$\begin{aligned} \frac{10-5i}{6+2i} &= \frac{10-5i}{6+2i} \times \frac{6-2i}{6-2i} \\ &= \frac{60-30i-20i+10i^2}{(6)^2-(2i)^2} \\ &= \frac{60-50i-10}{36+4} \\ &= \frac{50-50i}{40} \\ &= \frac{50}{40} (1-i) \\ &= \frac{5}{4} (1-i). \end{aligned}$$

iii) $3\bar{i} + \frac{1}{2-i}$

Soln:

$$3\bar{i} + \frac{1}{2-i} = -3i + \frac{1}{2-i} \times \frac{2+i}{2+i}$$

$$= -3i + \frac{(2+i)}{2^2 - i^2}$$

$$= -3i + \frac{(2+i)}{4+1}$$

$$= \frac{-15i + 2 + i}{5}$$

$$= \frac{-14i + 2}{5}$$

$$= \frac{2}{5} - \frac{14}{5}i$$

$$= \frac{2}{5} + i \left(-\frac{14}{5} \right)$$

2. If $z = x + iy$, find the following in rectangular form.

i) $\operatorname{Re} \left(\frac{1}{z} \right)$.

Soln

$$\operatorname{Re} \left(\frac{1}{z} \right) = \operatorname{Re} \left(\frac{1}{x+iy} \right)$$

$$= \operatorname{Re} \left(\frac{1}{x+iy} \times \frac{x-iy}{x-iy} \right)$$

$$= \operatorname{Re} \left(\frac{x-iy}{x^2 - (i^2 y^2)} \right)$$

$$= \operatorname{Re} \left(\frac{x-iy}{x^2 + y^2} \right)$$

Real part is $\frac{x}{x^2 + y^2}$

ii) $\operatorname{Re} (i\bar{z})$.

Soln

$$\operatorname{Re} (i\bar{z}) = \operatorname{Re} (i(x-iy))$$

$$= \operatorname{Re} (ix - i^2 y)$$

$$= \operatorname{Re} (ix + y)$$

$$= \operatorname{Re} (y + ix)$$

Real part is y .

iii) $\operatorname{Im} (3z + 4\bar{z} - 4i)$.

Soln

$$\operatorname{Im} (3z + 4\bar{z} - 4i) = \operatorname{Im} (3(x+iy) +$$

$$4(x-iy) - 4i)$$

$$= \operatorname{Im} (3x + i3y + 4x - i4y - 4i)$$

$$= \operatorname{Im} (7x + i(3y - 4y - 4))$$

$$= \operatorname{Im} (7x + i(-y - 4))$$

$\therefore$ Imaginary part is $-y - 4$.

3. If $z_1 = 2-i$ and $z_2 = -4+3i$ find the inverse of $z_1 z_2$ and $\frac{z_1}{z_2}$

Soln

i) $z_1 = 2-i$

$$z_2 = -4+3i$$

$$z_1 z_2 = (2-i)(-4+3i)$$

$$= -8 + 4i + 6i - 3i^2$$

$$= -8 + 10i + 3$$

$$= -5 + 10i$$

Inverse of $z_1 z_2$ is $\frac{1}{z_1 z_2}$

$$\begin{aligned}\frac{1}{z_1 z_2} &= \frac{1}{-5+10i} \times \frac{-5-10i}{-5-10i} \\&= \frac{-5-10i}{(-5)^2 - (10i)^2} \\&= \frac{-5-10i}{25 + 100} \\&= \frac{-5-10i}{125} \\&= \frac{5(-1-2i)}{125} \\&= \frac{-1-2i}{25}\end{aligned}$$

Inverse of $z_1 z_2$ is $\frac{1}{25}(-1-2i)$.

ii) $z_1 = 2-i$
 $z_2 = -4+3i$

Inverse of $\frac{z_1}{z_2}$ is $\frac{1}{\frac{z_1}{z_2}} = \frac{z_2}{z_1}$

$$\begin{aligned}\frac{z_2}{z_1} &= \frac{-4+3i}{2-i} = \frac{-4+3i}{2-i} \times \frac{2+i}{2+i} \\&= \frac{-8+6i-4i+3i^2}{(2)^2 - (i)^2} \\&= \frac{-8+2i-3}{4+1} \\&= \frac{-11+2i}{5}\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{5}(-11+2i)$$

Inverse of $\frac{z_1}{z_2}$ is $\frac{1}{5}(-11+2i)$

4. The complex numbers u, v and w are related by $\frac{1}{u} = \frac{1}{v} + \frac{1}{w}$.
If $v = 3-4i$ and $w = 4+3i$,
find u in rectangular form.

Soln

$$v = 3-4i$$

$$w = 4+3i$$

$$\frac{1}{u} = \frac{1}{v} + \frac{1}{w}$$

$$= \frac{1}{3-4i} + \frac{1}{4+3i}$$

$$= \frac{3+4i}{(3-4i)(3+4i)} + \frac{4-3i}{(4+3i)(4-3i)}$$

$$= \frac{3+4i}{9-16i^2} + \frac{4-3i}{16-(3i)^2}$$

$$= \frac{3+4i}{9+16} + \frac{4-3i}{16+9}$$

$$= \frac{3+4i}{25} + \frac{4-3i}{25}$$

$$= \frac{3+4i+4-3i}{25}$$

$$\frac{1}{u} = \frac{7+i}{25}$$

$$u = \frac{25}{7+i} = \frac{25}{7+i} \times \frac{7-i}{7-i}$$

$$= \frac{25(7-i)}{7^2 - (i)^2}$$

$$= \frac{25(7-i)}{49+1}$$

$$= \frac{25(7-i)}{50}$$

$$= \frac{7-i}{2}$$

$$u = \frac{1}{2}(7-i).$$

5. Prove the following properties :

i) z is real if and only if $z = \bar{z}$

Soln

$$\text{Let } z = x+iy$$

$$\bar{z} = x-iy$$

$$z = \bar{z}$$

$$\Leftrightarrow x+iy = x-iy$$

$$\Leftrightarrow x+iy - x+iy = 0$$

$$\Leftrightarrow 2iy = 0$$

$$\Leftrightarrow y = 0$$

[$\therefore 2$ and i are constants]

When $y=0$, $z=x$ which

is real

$\therefore z$ is purely real

$$\Leftrightarrow z = \bar{z}.$$

$$\text{ii) } \operatorname{Re}(z) = \frac{z+\bar{z}}{2} \text{ and } \operatorname{Im}(z) = \frac{z-\bar{z}}{2i}$$

$$\text{Let } z = x+iy \rightarrow \textcircled{1}.$$

Where x is the $\operatorname{Re}(z)$ and

y is the $\operatorname{Im}(z)$

$$\bar{z} = x-iy \rightarrow \textcircled{2}.$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} \Rightarrow z + \bar{z} = 2x$$

$$\frac{z+\bar{z}}{2} = x$$

$$\frac{z+\bar{z}}{2} = \operatorname{Re}(z).$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \Rightarrow z - \bar{z} = x+iy - x+iy$$

$$z - \bar{z} = 2iy$$

$$\frac{z-\bar{z}}{2i} = \operatorname{Im}(z).$$

6. Find the least value of the positive integer n for which $(\sqrt{3}+i)^n$.

i) real ii) purely imaginary.

Soln :

$$\text{Let } z = (\sqrt{3}+i)^n$$

$$= \left[2 \left(\frac{\sqrt{3}+i}{2} \right)^n \right]$$

Multiply and divide by 2

$$= \left[2^n \left(\frac{\sqrt{3}+i}{2} \right)^n \right]$$

$$= 2^n \left[\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \right]^n$$

$$= 2^n \left[\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right]^n$$

$$z = 2^n \left[\cos \frac{n\pi}{6} + i \sin \frac{n\pi}{6} \right] \rightarrow \textcircled{1}$$

$$\bar{z} = 2^n \left[\cos \frac{n\pi}{6} - i \sin \frac{n\pi}{6} \right] \rightarrow \textcircled{2}$$

Since z is real, $z = \bar{z}$

From $\textcircled{1}$ and $\textcircled{2}$.

$$2^n \left[\cos \frac{n\pi}{6} + i \sin \frac{n\pi}{6} \right] =$$

$$2^n \left[\cos \frac{n\pi}{6} - i \sin \frac{n\pi}{6} \right]$$

$$2i \sin \frac{n\pi}{6} = 0$$

$$\sin \frac{n\pi}{6} = 0$$

$$\sin \frac{n\pi}{6} = \sin \pi$$

$$\frac{n\pi}{6} = \pi \quad [\because \sin \pi = 0]$$

$$\frac{n}{6} = 1$$

$$\boxed{n = 6}$$

ii) Since z is purely imaginary

$$z = -\bar{z}$$

$$2^n \left[\cos \frac{n\pi}{6} + i \sin \frac{n\pi}{6} \right] =$$

$$-2^n \left[\cos \frac{n\pi}{6} - i \sin \frac{n\pi}{6} \right]$$

$$2 \cos \frac{n\pi}{6} = 0$$

$$\cos \frac{n\pi}{6} = 0$$

$$\cos \frac{n\pi}{6} = \cos \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{n\pi}{6} = \frac{\pi}{2}$$

$$\frac{n}{3} = 1$$

$$\boxed{n = 3}$$

7. Show that

i) $(2+i\sqrt{3})^{10} - (2-i\sqrt{3})^{10}$ is purely imaginary.

ii) $\left(\frac{19-7i}{9+i}\right)^{12} + \left(\frac{20-5i}{7-6i}\right)^{12}$ is real.

Soln

$$i) (2+i\sqrt{3})^{10} - (2-i\sqrt{3})^{10}$$

$$\text{Let } z = (2+i\sqrt{3})^{10} - (2-i\sqrt{3})^{10}$$

$$\bar{z} = \overline{(2+i\sqrt{3})^{10} - (2-i\sqrt{3})^{10}}$$

$$= \overline{(2+i\sqrt{3})^{10}} - \overline{(2-i\sqrt{3})^{10}}$$

$$= (2-i\sqrt{3})^{10} - (2+i\sqrt{3})^{10}$$

$$= (2-i\sqrt{3})^{10} - (2+i\sqrt{3})^{10}$$

$$= -[(2+i\sqrt{3})^{10} - (2-i\sqrt{3})^{10}]$$

$$\bar{z} = -z \Rightarrow z \text{ is purely imaginary}$$

Hence

$(2+i\sqrt{3})^{10} - (2-i\sqrt{3})^{10}$ is p. imaginary

$$11) \left(\frac{19-7i}{9+i} \right)^{12} + \left(\frac{20-5i}{7-6i} \right)^{12}$$

Soln

$$\frac{19-7i}{9+i} = \frac{19-7i}{9+i} \times \frac{9-i}{9-i}$$

$$= \frac{171-19i-63i+7i^2}{(9)^2 - (i)^2}$$

$$= \frac{171-82i-7}{81+1}$$

$$= \frac{164-82i}{82}$$

$$= 2-i$$

$$\frac{20-5i}{7-6i} = \frac{20-5i}{7-6i} \times \frac{7+6i}{7+6i}$$

$$= \frac{140+120i-35i-30i^2}{(7)^2 - (6i)^2}$$

$$= \frac{140+85i+30}{49+36}$$

$$= \frac{170+85i}{85}$$

$$= 2+i$$

$$\therefore \left(\frac{19-7i}{9+i} \right)^{12} + \left(\frac{20-5i}{7-6i} \right)^{12} =$$

$$(2-i)^{12} + (2+i)^{12}$$

$$\text{Let } z = (2-i)^{12} + (2+i)^{12}$$

$$\therefore \bar{z} = \overline{(2-i)^{12} + (2+i)^{12}}$$

$$= \overline{(2-i)^{12}} + \overline{(2+i)^{12}}$$

$$= (2+i)^{12} + (2-i)^{12}$$

$$= z$$

$\therefore \bar{z} = z \Rightarrow z$ is purely real.


$$\therefore \left(\frac{19-7i}{9+i} \right)^{12} + \left(\frac{20-5i}{7-6i} \right)^{12} \text{ is real.}$$

20

ஒரு கலப்பெண்ணின் மட்டு மதிப்பு
Modulus of a complex number

மைய எண் கோண்கோட்டில் மட்டு மதிப்பு என்பது எவ்வாறு சூழிக்கும் அந்த எண்ணுக்கும் உள்ள தொலைவு சூழிக்கிறதோ அதுபோலவே ஒரு கலப்பெண்ணின் மட்டு என்பது கலப்பெண் தளத்தில் சூழிக்கும் அந்த எண்ணுக்கும் உள்ள தொலைவை சூழிக்கின்றது.

சூழியிடுந்து சூழரமன் திசையில் $z = x + iy$ உள்ள தொலைவு என்பது ஒரு பக்கம் x மற்றும் மறு பக்கம் y யாகக் கொண்டு அமைக்கப்படும் எவ்வகை முக்கோணத்தில் கர்ணத்தின் நீளத்திற்கு சமமாகும்.



உரையாற்ற:

$$Z = x + iy \text{ எனில்,}$$

Z ன் மட்டுமதிப்பினை $|Z|$ என குறிப்பிடுகின்றோம்.
இதனை $|Z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ என உரையாற்றப்படும்.

எ.கா:

$$\begin{aligned} \text{i) } |i| &= \sqrt{0^2 + 1^2} \\ &= \sqrt{1^2} \\ &= \sqrt{1} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii) } |-12i| &= \sqrt{0^2 + (-12)^2} \\ &= \sqrt{144} \\ &= 12 \end{aligned}$$

iii) $Z = 2 + 3i$ எனில் $|Z|$ காண்க

$$\begin{aligned} |Z| &= \sqrt{(2)^2 + (3)^2} \\ &= \sqrt{4 + 9} \\ &= \sqrt{13} \end{aligned}$$

குறிப்பு :

$$Z = x + iy$$

$$\bar{Z} = x - iy$$

$$Z\bar{Z} = (x + iy)(x - iy)$$

$$= x^2 - (iy)^2$$


$$= x^2 + y^2$$

$$Z\bar{Z} = |Z|^2$$

$$|Z| = \sqrt{x^2 + y^2} = (x^2 + y^2)^{1/2}$$

$$|Z|^2 = (x^2 + y^2)^{1/2 \times 2}$$

வடிவ கணித விளக்கம்



O, Z_1, Z_2 மற்றும் $Z_1 + Z_2$ ஆகியவற்றை
இணைப்புள்ளிகளாகக் கொண்ட இக்கோணத்தினை
கவனிக்கவும்.

வடிவவியல் வாயிலாக $Z_1 + Z_2$ உடன்
தொடர்புடைய இக்கோணத்தின் பக்கம் நீளமுள்ள
கிரண்டு பக்கங்களின் நீளங்களை கவனமாக வில

சிதிகமாக கிடுக்காது என நாம் அறிவோம்.
கிதனால் தான் கிந்த பண்டினை ஓக்கோண சமஸிளி
என்கிதோம்.

கூறிப்பு :

$$1. |z_1 + z_2 + z_3 + \dots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + |z_3| + \dots + |z_n|$$

இங்கு $n = 2, 3, \dots$

2. z_1 மற்றும் z_2 என்ற கலப்பண்களுக்கு கிதயட்ட
தூரம்

$$z_1 = x_1 + iy \text{ மற்றும் } z_2 = x_2 + iy_2 \text{ எனில்}$$

$$|z_1 - z_2| = |(x_1 - x_2) + (y_1 - y_2)i|$$

$$= \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$


3. z_1 (ம) z_2 என்ற கலப்பண்களுக்கு கிதயட்ட
தூரம் $|z_1 - z_2|$ ஆகும்.

கிதயபாலகவ ஆதி z_1 , மற்றும் z_2 ஆகியவற்றை
கிதயப்புள்ளிகளாகக் கொண்டு ஓக்கோணத்தில்
கிதயகறிய வுதிமுறையின் படி,

$$|z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 - z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$



4. பெருக்கலின் எண்ணளவு என்பது எண்ணளவுகளின் பெருக்கல் பலனுக்கு சமம் ஆகும்.

z_1 (அ) z_2 என்ற ஏதேனும் இரண்டு கலப்பெண்களுக்கு $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$ ஆகும்.

நிரூபணம்

$$\begin{aligned}
 |z_1 z_2|^2 &= (z_1 z_2)(\overline{z_1 z_2}) \quad \because |z|^2 = z \overline{z} \\
 &= (z_1)(z_2)(\overline{z_1})(\overline{z_2}) \quad \because \overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \overline{z_2} \\
 &= (z_1 \overline{z_1})(z_2 \overline{z_2}) \\
 &= |z_1|^2 |z_2|^2 \\
 |z_1 z_2| &= |z_1| |z_2|
 \end{aligned}$$

5. கணிதத் தொகுத்தறியல் மூலம் கிடைத்த முடிவுற்ற எண்ணிக்கையிலான கலப்பெண்களுக்கும் கிடைத்த ஜோடிப்படுத்தலும்.

$$|z_1 z_2 z_3 \dots z_n| = |z_1| |z_2| |z_3| |z_4| \dots |z_n|$$

அதாவது கலப்பெண்களின் பெருக்கற்பலனின் மட்டு மதிப்பு என்பது அக்கலப்பெண்களின் மட்டுகளின் பெருக்கல் பலனுக்கு சமம் ஆகும்.

பிரிக்காண சமனிலி விதி

5m

Statement

கிடைசு கலப்பணங்களின் கூடுதலின் மட்டு அல்லது எண்களின் மட்டுகளின் கூடுதலுக்கு சமனாகவோ சமனாகவோ இருக்கும்.

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

Proof

z_1, z_2 கிடைசு கலப்பணங்கள் என்க.

$$|z_1 + z_2|^2 = (z_1 + z_2)(\overline{z_1 + z_2}) \quad \because |z|^2 = z\overline{z}$$

$$= (z_1 + z_2)(\overline{z_1} + \overline{z_2})$$

$$= z_1\overline{z_1} + z_1\overline{z_2} + z_2\overline{z_1} + z_2\overline{z_2}$$

$$= z_1\overline{z_1} + (z_1\overline{z_2} + z_2\overline{z_1}) + z_2\overline{z_2}$$

$$= z_1\overline{z_1} + (z_1\overline{z_2} + \overline{z_1}z_2) + z_2\overline{z_2} \quad [\overline{\overline{z}} = z]$$

$$= |z_1|^2 + 2\operatorname{Re}(z_1\overline{z_2}) + |z_2|^2 \quad [\because z + \overline{z} = 2\operatorname{Re}(z)]$$

$$\leq |z_1|^2 + 2|z_1||\overline{z_2}| + |z_2|^2 \quad \because \operatorname{Re}(z) \leq |z|$$

$$= |z_1|^2 + 2|z_1||z_2| + |z_2|^2$$

$$= |z_1|^2 + 2|z_1||z_2| + |z_2|^2 \quad \because |\overline{z}| = |z|$$

$$|z_1 + z_2|^2 \leq (|z_1| + |z_2|)^2$$

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

எ.கா: 2.9

$$z_1 = 3+4i, z_2 = 5-12i, \text{ மற்றும் } z_3 = 6+8i$$

எனில் $|z_1|, |z_2|, |z_3|, |z_1+z_2|$ & $|z_2-z_3|$

மற்றும் $|z_1+z_3|$ ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

$$|z_1| = |3+4i| = \sqrt{3^2+4^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$$

$$|z_2| = |5-12i| = \sqrt{5^2+(-12)^2} = \sqrt{25+144} = \sqrt{169} = 13$$

$$|z_3| = |6+8i| = \sqrt{6^2+8^2} = \sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10$$

$$z_1+z_2 = (3+4i) + (5-12i)$$

$$= (3+5) + (4-12)i$$

$$= 8-8i$$

$$|z_1+z_2| = |8-8i| = \sqrt{8^2+(-8)^2} = \sqrt{64+64} = \sqrt{128}$$

$$= \sqrt{2(64)} = 8\sqrt{2}$$

$$z_2-z_3 = (5-12i) - (6+8i)$$

$$= (5-6) + i(-12-8)$$

$$= -1 + (-20i)$$

$$= -1-20i$$

$$|z_2-z_3| = |-1-20i| = \sqrt{(-1)^2+(-20)^2}$$

$$= \sqrt{1+400} = \sqrt{401}$$

$$\begin{aligned}
 z_1 + z_3 &= (3+4i) + (6+8i) \\
 &= (3+6) + i(4+8) \\
 &= 9+12i
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 |z_1 + z_3| &= |9+12i| = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{81+144} \\
 &= \sqrt{225} \\
 &= 15
 \end{aligned}$$

வி.கா: 2.10

கீழ்க்காண்பனவற்றின் மதிப்புகளை காண்க .

$$i) \left| \frac{2+i}{-1+2i} \right|$$

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{2+i}{-1+2i} \right| &= \frac{|2+i|}{|-1+2i|} \quad \because \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \\
 &= \frac{\sqrt{2^2+1^2}}{\sqrt{(-1)^2+2^2}} \\
 &= \frac{\sqrt{4+1}}{\sqrt{1+4}} \\
 &= \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

$$ii) \left| \overline{(1+i)} (2+3i) (4i-3) \right|$$

தீர்வு:

$$\left| \overline{(1+i)} (2+3i) (4i-3) \right|$$

$$= \left| (1-i) (2+3i) (4i-3) \right| \quad |z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$$

$$= |1-i| |2+3i| |4i-3|$$

$$= (\sqrt{1^2+(-1)^2}) (\sqrt{2^2+3^2}) (\sqrt{4^2+(-3)^2})$$

$$= (\sqrt{1+1}) (\sqrt{4+9}) (\sqrt{16+9})$$

$$= (\sqrt{2}) (\sqrt{13}) (\sqrt{25})$$

$$= 5\sqrt{26}$$

$$iii) \left| \frac{i(2+i)^3}{(1+i)^2} \right|$$

$$\left| \frac{i(2+i)^3}{(1+i)^2} \right| = \frac{|i| |2+i|^3}{|1+i|}$$

$$= \frac{\sqrt{1} (\sqrt{2^2+1^2})^3}{\sqrt{1^2+1^2}}$$

$$= \frac{(1) (\sqrt{4+1})^3}{(\sqrt{1+1})^2}$$

$$= \frac{(\sqrt{5})^3}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{\sqrt{5} \sqrt{5} \sqrt{5}}{\sqrt{2}}$$

$$= \frac{5\sqrt{5}}{2}$$

எ.கா: 2.11

$i, -2+i$, மற்றும் 3 ஆகியவற்றில் எந்த கலப்பெண் ஆகியிருந்து அதிக தொலைவில் உள்ளது?

தீர்வு:

$Z = i, -2+i$, மற்றும் 3 ஆகியவற்றிற்கும் ஆதிக்கம்

உள்ள தொலைவுகள்

$$|Z| = |i| = \sqrt{1^2} = 1$$

$$|Z| = |-2+i| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2} = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}$$

$$|Z| = |3| = \sqrt{3^2} = 3$$

$1 < \sqrt{5} < 3$ எனவே ஆகியவற்றில் அதிக தொலைவில் உள்ள கலப்பெண் 3 ஆகும்.

எ.கா: 2.12

Z_1, Z_2 மற்றும் Z_3 ஆகிய கலப்பெண்கள் $|Z_1| = |Z_2| = |Z_3| = 1$ என்றவற்று கருந்தால் $\left| \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3} \right|$ க் மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு:

$$|Z_1| = 1$$

$$|Z_2| = 1$$

$$|Z_3| = 1 \text{ எனவே}$$

கொடுக்கப்படும் வரம்புகள்,

$$|z_1|^2 = 1^2$$

$$|z_2|^2 = 1^2$$

$$|z_3|^2 = 1^2$$

$$z \bar{z}_1 = 1$$

$$z \bar{z}_2 = 1$$

$$z \bar{z}_3 = 1$$

$$\bar{z}_1 = \frac{1}{z_1}$$

$$\bar{z}_2 = \frac{1}{z_2}$$

$$\bar{z}_3 = \frac{1}{z_3}$$

$$\left| \frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} + \frac{1}{z_3} \right| = \left| \bar{z}_1 + \bar{z}_2 + \bar{z}_3 \right|$$


$$= \left| \overline{z_1 + z_2 + z_3} \right|$$

$$= |z_1 + z_2 + z_3|$$

$$= 1$$

எ.கா : 2.13

$|z| = 2$ எனில் $3 \leq |z + 3 + 4i| \leq 7$ எனக் காட்டுக.



$$|z + 3 + 4i| \leq |z| + |3 + 4i|$$

$$= 2 + \sqrt{3^2 + 4^2}$$

$$= 2 + \sqrt{9 + 16}$$

$$= 2 + \sqrt{25}$$

$$= 2 + 5$$

$$\leq 7 \rightarrow \textcircled{1}$$

$$|z + 3 + 4i| \geq ||z| - |3 + 4i||$$

$$= |2 - \sqrt{3^2 + 4^2}|$$

$$= |2 - \sqrt{25}|$$

$$= |2 - 5|$$

$$= |-3|$$

$$\geq 3 \rightarrow \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{ மற்றும் } \textcircled{2} \text{ சேர்ந்து } 3 \leq |z + 3 + 4i| \leq 7$$

குறிப்பு

m

கீழ் மற்றும் மேல் எல்லை மதிப்புகளை காண


$$||z_1| - |z_2|| \leq |z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$$

எ.கா: 2.14

1, $\frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, மற்றும் $\frac{-1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$ என்ற புள்ளிகள்
ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் மூன்றாம்புள்ளிகளாக அமையும்
என நிரூபிப்பது.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின்
மூன்றாம்புள்ளியாக அமைய முக்கோணத்தின் மூலக்கோணத்தின்
நிலைகள் சமம் என நிரூபிப்பது போதும்.



$$z_1 = 1, \quad z_2 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad z_3 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$|z_1 - z_2| = \left| 1 - \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right|$$

$$= \left| 1 + \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right|$$

$$= \left| \frac{3}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right|$$

$$= \sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}}$$

$$= \sqrt{\frac{12}{4}}$$

$$= \sqrt{3} \rightarrow \textcircled{1}$$

$$|z_2 - z_3| = \left| \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) - \left(-\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right|$$

$$= \left| -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right|$$

$$= \left| i \frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right|$$

$$= |i\sqrt{3}|$$

$$= \sqrt{0^2 + (\sqrt{3})^2}$$

$$= \sqrt{3} \rightarrow \textcircled{2}$$

$$|z_3 - z_1| = \left| \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) - 1 \right|$$

$$= \left| -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 \right|$$

$$= \left| -\frac{3}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right|$$

$$= \sqrt{\left(-\frac{3}{2} \right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{3}{4}}$$

$$= \sqrt{\frac{12}{4}}$$

$$= \frac{2\sqrt{3}}{2}$$

$$= \sqrt{3} \rightarrow \textcircled{3}$$

பக்கங்களைக் கீழ்க்கண்ட சமம்

எனவே கீழ்க்கண்ட பட்ட புள்ளிகள் ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின்

முனைப்பற்றிக் கொள்ளுதல்.

(48)

Q-கன : Q.15

z_1, z_2, z_3 எண்மக் கருப்பெண்கள் $|z_1| = |z_2| = |z_3| = r > 0$

மற்றும் $z_1 + z_2 + z_3 \neq 0$ எனவும் கொடுக்கல் $\left| \frac{z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_3 z_1}{z_1 + z_2 + z_3} \right| = r$

Soln:

$|z_1| = |z_2| = |z_3| = r$ என்க.

$|z_1|^2 = r^2$ $|z_2|^2 = r^2$ $|z_3|^2 = r^2$ [Squaring on both sides]

$$\Rightarrow z_1 \bar{z}_1 = z_2 \bar{z}_2 = z_3 \bar{z}_3 = r^2 \quad [\because |z|^2 = z \bar{z}]$$

$$\Rightarrow z_1 = \frac{r^2}{\bar{z}_1}, \quad z_2 = \frac{r^2}{\bar{z}_2}, \quad z_3 = \frac{r^2}{\bar{z}_3}$$

$$|z_1 + z_2 + z_3| = [r^2] \left[\left| \frac{1}{\bar{z}_1} + \frac{1}{\bar{z}_2} + \frac{1}{\bar{z}_3} \right| \right]$$

$$= r^2 \left| \frac{z_2 z_3 + z_1 z_3 + z_1 z_2}{|\bar{z}_1| |\bar{z}_2| |\bar{z}_3|} \right|$$

↓ crl
Cross multiplication

$$= r^2 \left| \frac{z_2 z_3 + z_1 z_3 + z_1 z_2}{|z_1| |z_2| |z_3|} \right|$$

$$= r^2 \frac{|z_2 z_3 + z_1 z_3 + z_1 z_2|}{r^3}$$

$$|z_1 + z_2 + z_3| = \frac{|z_2 z_3 + z_1 z_3 + z_1 z_2|}{r}$$

$$r = \frac{|z_2 z_3 + z_1 z_3 + z_1 z_2|}{|z_1 + z_2 + z_3|}$$

$$r = \left| \frac{z_2 z_3 + z_1 z_3 + z_1 z_2}{z_1 + z_2 + z_3} \right|$$

பா-கா : 2.16

$z^2 = \bar{z}$ எனும் சமன்பாட்டிற்கு நான்கு மூலங்கள் கிடைக்கும் என நிரூபிக்க.

தீர்வு:

$$\text{Given } z^2 = \bar{z}$$

இருபுறம் மட்டு கிடை

$$|z|^2 = |\bar{z}|$$

$$|z|^2 = |z|$$

$$|z|^2 - |z| = 0$$

$$|z| (|z| - 1) = 0$$

$$|z| = 0 \quad |z| - 1 = 0$$

$$|z| = 1$$

$|z| = 0 \Rightarrow z = 0$ என்பது ஒரு தீர்வு.
is a solution

$$|z| = 1$$

$$z\bar{z} = 1$$

$$\bar{z} = \frac{1}{z}$$

$$z^2 = \frac{1}{z} \quad [\because \text{Given data: } \bar{z} = z^2]$$

$$z^3 = 1$$

தகவல் 3 பூச்சியற்ற தீர்வுகள் கிடைக்கும்.

மொத்தம் 4 பூச்சியற்ற தீர்வுகள் உள்ளது எனக் கூறும்

It has 3 non-zero solutions
தீர்வுகள் கிடைக்கும். Hence including zero solution. Therefore solution

11

$$\sqrt{a+ib} = \pm \left(\sqrt{\frac{|z|+a}{2}} + i \frac{b}{|b|} \sqrt{\frac{|z|-a}{2}} \right) \text{ கிடைக்க } z = a+ib \text{ என்று } b \neq 0$$

b இன்று என் $\frac{b}{|b|} = -1$, 2 மற்றும் 4 அதிகம் வலுவாக

5) നൂറു ശതമാനം. If b is negative $\frac{b}{|b|} = -1$, x and y have different sign

b. மிகைக எண் $\frac{b}{|b|} = 1$, α மெய்யு 4. இவ்வகை ஒரு

⑤ നൂറുനാലാം. If b is positive $\frac{b}{15} = 1$ 2 and 4 have same sign.

55

6-81 இன் வர்க்கமூலம் காண்க. (Find the square root of 6-81)

११२: $z = 6 - 8i$

$$\begin{aligned} |z| &= |6 - 8i| = \sqrt{(6)^2 + (-8)^2} \\ &= \sqrt{36 + 64} \\ &= \sqrt{100} \\ &= 10 \end{aligned}$$

உபகரணம் காண சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி
applying the formula for given root we get

The formula for $\sqrt{a+ib}$ is

$$\sqrt{6-8i} = \pm \left(\sqrt{\frac{10+b}{2}} - i \sqrt{\frac{10-b}{2}} \right) \quad \sqrt{a+ib} = \pm \left(\sqrt{\frac{|z|+a}{2}} + i \frac{b}{|b|} \sqrt{\frac{|z|-a}{2}} \right)$$

bis Negative

$$\frac{b}{|b|} = -1$$

$$= \pm \left(\sqrt{\frac{16}{2}} - i \sqrt{\frac{4}{2}} \right)$$

$$= \pm (\sqrt{8} - i\sqrt{2})$$

$$= \pm (2\sqrt{2} - i\sqrt{2})$$

பயிற்சி 2.5

1. கீழ்க்காணும் கலப்பெண்களின் மட்டு மதிப்பினைக் காண்க.

i) $\frac{2i}{3+4i}$

தீர்வு:

$$\begin{aligned} z &= \frac{2i}{3+4i} \\ |z| &= \left| \frac{2i}{3+4i} \right| \\ &= \frac{\sqrt{2^2}}{\sqrt{3^2+4^2}} \\ &= \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9+16}} \\ &= \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{25}} \\ &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

ii) $\frac{2-i}{1+i} + \frac{1-2i}{1-i}$

தீர்வு:

$$\begin{aligned} z &= \frac{2-i}{1+i} + \frac{1-2i}{1-i} \\ &= \frac{(2-i)(1-i) + (1-2i)(1+i)}{(1+i)(1-i)} \end{aligned}$$

$$= \frac{2 - 2i - \cancel{i} + i^2 + (1 + \cancel{i} - 2i - 2i^2)}{1^2 - i^2} = \frac{-i^2 - 4i + 3}{1+1}$$

$$= \frac{-i^2 - 4i + 3}{1+1}$$

$$= \frac{4 - 4i}{2}$$

$$= \frac{2(2 - 2i)}{2}$$

$$z = 2 - 2i$$

$$|z| = \sqrt{2^2 + (-2)^2}$$

$$= \sqrt{4+4}$$

$$= \sqrt{8}$$

$$= 2\sqrt{2}$$

iii) $(1-i)^{10}$

தீர்வு.

$$z = (1-i)^{10}$$

$$|z| = |1-i|^{10}$$

$$= \left[\sqrt{1^2 + (-1)^2} \right]^{10}$$

$$= \left[\sqrt{2} \right]^{10}$$

$$= (2)^{10 \times \frac{1}{2}}$$

$$= 2^5$$

$$= 32$$

iv) $2i(3-4i)(4-3i)$

தீர்வு:

$$z = 2i(3-4i)(4-3i)$$

$$|z| = |2i(3-4i)(4-3i)|$$

$$= |2i| |3-4i| |4-3i|$$

$$= \sqrt{2^2} \sqrt{3^2+(-4)^2} \sqrt{4^2+(-3)^2}$$

$$= (2) \sqrt{9+16} \sqrt{16+9}$$

$$= (2) (5) (5)$$

$$|z| = 50$$

10. கீழ்க்காண்பதவகளின் மார்க்கமுலம் காண்க.

(i) $4+3i$

தீர்வு:

$$z = 4+3i$$

$$z = a+ib$$

$$a=4 \Rightarrow \text{மினக}$$

$$b=3 \Rightarrow \text{மினக}$$

$$|z| = \sqrt{(4)^2+(3)^2}$$

$$= \sqrt{16+9}$$

$$|z| = \sqrt{25} = 5$$

$$\begin{aligned}
 \sqrt{a-ib} &= \pm \left(\sqrt{\frac{|z|+a}{2}} + i \frac{b}{|b|} \sqrt{\frac{|z|-a}{2}} \right) \\
 &= \pm \left(\sqrt{\frac{5+4}{2}} + i \sqrt{\frac{5-4}{2}} \right) \\
 &= \pm \left(\sqrt{\frac{9}{2}} + i \sqrt{\frac{1}{2}} \right) \\
 &= \pm \left(\frac{3}{\sqrt{2}} + i \frac{1}{\sqrt{2}} \right)
 \end{aligned}$$

ii) $-6+8i$

தீர்வு:

$$z = -6+8i$$

$$z = a+ib$$

$$a = -6$$

$$b = 8$$

$$|z| = \sqrt{(-6)^2 + 8^2}$$

$$= \sqrt{36+64}$$

$$= \sqrt{100}$$

$$|z| = 10$$

$$\sqrt{a-ib} = \pm \left(\sqrt{\frac{|z|+a}{2}} + i \frac{b}{|b|} \sqrt{\frac{|z|-a}{2}} \right)$$

$$= \pm \left(\sqrt{\frac{10-6}{2}} + i(-1) \sqrt{\frac{10-(-6)}{2}} \right)$$

$$= \pm \left(\sqrt{\frac{42}{2}} - i \sqrt{\frac{168}{2}} \right)$$

$$= \pm \left(\sqrt{2} - i\sqrt{8} \right)$$

$$= \pm \left(\sqrt{2} - i 2\sqrt{2} \right)$$

iii) $-5-12i$

தீர்வு:

$$z = -5-12i$$

$$z = a+ib$$

$$a = -5 \Rightarrow \text{மெய்}$$

$$b = -12 \Rightarrow \text{கற்பனை}$$

$$|z| = \sqrt{(-5)^2 + (-12)^2}$$

$$= \sqrt{25+144}$$

$$= \sqrt{169}$$

$$|z| = 13$$

$$\sqrt{a-ib} = \pm \left(\sqrt{\frac{|z|+a}{2}} + i \frac{b}{|b|} \sqrt{\frac{|z|-a}{2}} \right)$$

$$= \pm \left(\sqrt{\frac{13-5}{2}} + i \sqrt{\frac{13+5}{2}} \right)$$

$$= \pm \left(\sqrt{\frac{8}{2}} + i \sqrt{\frac{18}{2}} \right)$$

$$= \pm \left(\sqrt{4} + i\sqrt{9} \right)$$

$$= \pm (2 + i3)$$

4) $|z| = 3$ எனில் $7 \leq |z + 6 - 8i| \leq 13$ எனக்காட்டுக.

தீர்வு :

$$\begin{aligned} |z + 6 - 8i| &\leq |z| + |6 - 8i| \\ &= 3 + \sqrt{6^2 + (-8)^2} \\ &= 3 + \sqrt{36 + 64} \\ &= 3 + \sqrt{100} \\ &= 3 + 10 \\ &\leq 13 \rightarrow \textcircled{1} \end{aligned}$$

$$|z + 6 - 8i| \geq \left| |z| - |6 - 8i| \right|$$

$$= \left| 3 - \sqrt{6^2 + (-8)^2} \right|$$

$$= \left| 3 - \sqrt{36 + 64} \right|$$

$$= \left| 3 - \sqrt{100} \right|$$

$$= \left| 3 - 10 \right|$$

$$= \left| -7 \right|$$

$$\geq 7 \rightarrow (2)$$

$$(1) \text{ மற்றும் } (2) \text{ லிருந்து } 7 \leq |z+6-8i| \leq 13.$$

2. z_1 மற்றும் z_2 என்ற ஏதாவது இரண்டு கலப்பணக்கருக்கள்
 $|z_1| = |z_2| = 1$ மற்றும் $z_1 z_2 \neq -1$ எனில் $\frac{z_1 + z_2}{1 + z_1 z_2}$ இரண்டு எண்
 சனக் காட்டிக்.

தீர்வு:

$$|z_1| = 1$$

$$|z_2| = 1$$

கிடைக்கும் வர்க்கப்படுத்த

$$|z_1|^2 = 1^2$$

$$|z_2|^2 = 1$$

$$z_1 \bar{z}_1 = 1$$

$$z_2 \bar{z}_2 = 1$$

$$z_1 = \frac{1}{\bar{z}_1}$$

$$z_2 = \frac{1}{\bar{z}_2}$$

$$\frac{z_1 + z_2}{1 + z_1 z_2} = \frac{\frac{1}{\bar{z}_1} + \frac{1}{\bar{z}_2}}{1 + \frac{1}{\bar{z}_1} \frac{1}{\bar{z}_2}}$$

$$= \frac{\frac{\bar{z}_2 + \bar{z}_1}{\bar{z}_1 \bar{z}_2}}{1 + \frac{1}{\bar{z}_1 \bar{z}_2}}$$

$$= \frac{\bar{z}_2 + \bar{z}_1}{\bar{z}_1 \bar{z}_2 + 1}$$

$$= \frac{\bar{z}_2 + \bar{z}_1}{\bar{z}_1 \bar{z}_2 + 1} \times \frac{\bar{z}_1 \bar{z}_2}{\bar{z}_1 \bar{z}_2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\overline{z_2 + z_1}}{\overline{z_1 z_2} + 1} \\
 &= \frac{\overline{z_1 + z_2}}{\overline{z_1 z_2} + 1} \\
 &= \frac{\overline{z_1 + z_2}}{\overline{z_1 z_2} + 1}
 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{z_1 + z_2}{1 + z_1 z_2} \text{ என்பது முடிவதும் மெய்}$$

3. $10-8i$, $11+6i$ ஆகிய புள்ளிகளில் எப்புள்ளி $1+i$ க்கு மிக அருமைமிகம் கிடக்கும்?

தீர்வு:

$$A(10-8i), B(11+6i), C(1+i)$$

$$A \text{ மற்றும் } C \text{ க்கு கிடைப்பது } = |(10-8i) - (1+i)|$$

$$= |(10-1) + i(-8-1)|$$

$$= |9-9i|$$

$$= \sqrt{9^2 + (-9)^2}$$

$$= \sqrt{81+81}$$

$$= \sqrt{162} \rightarrow 1$$

$$\begin{aligned}
 B \text{ மற்றும் } C \text{ க்கு இடைப்பட்ட தூரம்} &= |(11+6i) - (1+i)| \\
 &= |(11-1) + i(6-1)| \\
 &= |10+5i| \\
 &= \sqrt{10^2 + 5^2} \\
 &= \sqrt{100 + 25} \\
 &= \sqrt{125} \rightarrow ②
 \end{aligned}$$

$$①, ② \text{ விடந்து } \sqrt{100} > \sqrt{125} < \sqrt{162}$$

$$\sqrt{25 \times 5} < \sqrt{2 \times 81}$$

$$5\sqrt{5} < 9\sqrt{2}$$

B என்ற புள்ளி C என்ற புள்ளிக்கு அதிகாரமையில் உள்ளது.

$11+6i$ என்ற புள்ளி $1+i$ என்ற புள்ளிக்கு அதிகாரமில் உள்ளது,

5. $|z| = 1$ எனில்

6. $|z - \frac{2}{z}| = 2$ எனில் $|z|$ ன் மீச்சிறு மற்றும் மீப்பெரு மதிப்புகள் $\sqrt{3} + 1$ மற்றும் $\sqrt{3} - 1$ என அறியுங்கள்.

கீழ்

$$|z - \frac{2}{z}| = 2 \rightarrow ①$$

$$|z| = \left| z - \frac{2}{z} + \frac{2}{z} \right| \quad \left[\because \frac{2}{z} \text{ க்கு கமிக்க} \right]$$

$$\leq \left| z - \frac{2}{z} \right| + \left| \frac{2}{z} \right| \quad \left[\because \text{தூக்காண் சமனிய} \right]$$

$$= 2 + \left| \frac{2}{z} \right| \quad \left[\text{using (1)} \right]$$

$$= 2 + \frac{|2|}{|z|}$$

$$= 2 + \frac{2}{|z|}$$

$$|z| = \frac{2|z| + 2}{|z|}$$

$$|z|^2 = 2|z| + 2$$

$$|z|^2 - 2|z| = 2$$

$$|z|^2 - 2|z| + 1 = 2 + 1 \quad \left[\because \text{இருபுறம் 1 க்கு கட்டுக} \right]$$

$$[|z| - 1]^2 = 3$$

$$|z| - 1 = \pm \sqrt{3}$$

அரங்கனும் காண்

$$|z| - 1 = \pm \sqrt{3}$$

$$|z| = \pm \sqrt{3} + 1$$

$$(\sqrt{3} + 1)(-\sqrt{3} + 1)$$

$$(\sqrt{3} + 1)(1 - \sqrt{3})$$

$$\therefore \text{மீதபடு மதிப்பு} = \sqrt{3} + 1$$

$$\text{மீதிறு மதிப்பு} = (\sqrt{3} + 1)(1 - \sqrt{3})$$

7. z_1, z_2 , மற்றும் z_3 என்ற மூன்று கலப்பெண்கள்
 $|z_1| = 1, |z_2| = 2, |z_3| = 3$, மற்றும் $|z_1 + z_2 + z_3| = 1$
 என்றவாறு உள்ளது எனில், $|9z_1z_2 + 4z_1z_3 + z_2z_3| = 6$ என
 நிரூபிக்க.

தீர்வு:

$$|z_1 + z_2 + z_3| = 1 \rightarrow \textcircled{1}$$

$$|z_1| = 1$$

$$|z_2| = 2$$

$$|z_3| = 3$$

$$|z_1|^2 = 1$$

$$|z_2|^2 = 2^2$$

$$|z_3|^2 = 3^2$$

$$z_1 \bar{z}_1 = 1$$

$$z_2 \bar{z}_2 = 4$$

$$z_3 \bar{z}_3 = 9$$

$$z_1 = \frac{1}{\bar{z}_1}$$

$$z_2 = \frac{4}{\bar{z}_2}$$

$$z_3 = \frac{9}{\bar{z}_3}$$

$$|9z_1z_2 + 4z_1z_3 + z_2z_3| = \left| 9\left(\frac{1}{\bar{z}_1}\right)\left(\frac{4}{\bar{z}_2}\right) + 4\left(\frac{1}{\bar{z}_1}\right)\left(\frac{9}{\bar{z}_3}\right) + \left(\frac{4}{\bar{z}_2}\right)\left(\frac{9}{\bar{z}_3}\right) \right|$$

$$= \left| \frac{36}{\bar{z}_1 \bar{z}_2} + \frac{36}{\bar{z}_1 \bar{z}_3} + \frac{36}{\bar{z}_2 \bar{z}_3} \right|$$

$$= \left| 36 \left(\frac{\bar{z}_3 + \bar{z}_2 + \bar{z}_1}{\bar{z}_1 \bar{z}_2 \bar{z}_3} \right) \right|$$

$$= 36 \frac{|\bar{z}_1 + \bar{z}_2 + \bar{z}_3|}{|\bar{z}_1| |\bar{z}_2| |\bar{z}_3|}$$

$$= 36 \left(\frac{1}{|z_1||z_2||z_3|} \right)$$

$$= 36 \frac{1}{(1)(2)(3)}$$

$$= 36 \times \frac{1}{6}$$

$$= 6$$

- 8) z, iz மற்றும் $z+iz$ ஆகியவற்றை இணைப்புள்ளியாகக் கொண்டு அமைக்கப்படும் இக்கோணத்தின் பரப்பு 60 சதுர அலகுகள் எனில், $|z|$ ன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு:

z, iz மற்றும் $z+iz$ ஆகியவற்றை இணைப்புள்ளியாகக் கொண்டு அமைக்கப்படும் இக்கோணத்தின் பரப்பு 60 சதுர அலகுகள்.

$$z = x+iy$$

$$iz = i(x+iy)$$

$$= ix+i^2y$$

$$= ix-y$$

$$z+iz = x+iy+ix-y$$

$$= (x-y)+i(y+x)$$

$z, z+iz$ மற்றும் iz ஆகியவற்றை இணைப்புள்ளியாகக் கொண்டு அமைக்கப்படும் இக்கோணத்தின் பரப்பு A என்க.

$$A = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x-y & x+y & 1 \\ -y & x & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2} \left[x(x+y-x) - y(x-y+y) + 1(x^2 - xy + xy + y^2) \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[xy - xy + x^2 + y^2 \right]$$

$$b_0 = \frac{x^2 + y^2}{2}$$

$$100 = x^2 + y^2$$

வார்க்கமூலம் காண

$$\sqrt{100} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$10 = |z|$$

9. $z^3 + 2\bar{z} = 0$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு ஐந்து தீர்வுகள் இருக்கும் என நிரூபித.

$$z^3 + 2\bar{z} = 0$$

$$z^3 = -2\bar{z}$$

இதிலிருந்து மடிகாண

$$|z^3| = |-2\bar{z}|$$

$$|z^3| = 2|\bar{z}|$$

$$|z|^3 = 2|z|$$

$$|z|^3 - 2|z| = 0$$

$$|z| [|z|^2 - 2] = 0$$

~~$$|z| = 0 \Rightarrow z = 0 \text{ ஆகிவிட்டது}$$~~

$$|z^2| = 2$$

$$(z \bar{z})^2 = \sqrt{2}$$

$$z \bar{z} = \sqrt{2}$$

$$\bar{z} = \frac{\sqrt{2}}{z}$$

$$z^3 + 2\bar{z} = 0$$

$$z^3 + 2\left(\frac{\sqrt{2}}{z}\right) = 0$$

$$z^4 + 2\sqrt{2} = 0$$

Padasalai.Net

கலப்பைண்களின் ஁டிஜியல் ஢ற்றும் நிய஢ப்பா஢ை

஢.஢ா: 2.18

$z = 3+2i$ ண஢க் ஢காண்டு, z , iz ஢ற்றும் $z+iz$ ஃகிய஁ற்ற஢ ஃர்க்கண்: ஢ாத்தில் ஃறிக்க . ஃக்கலப்பைண்கள் ஃர் ஃடுஃ஢பக்க ஃ஁ஃகாண ஢ுக்காணத்தின் பக்க஁கா஢ ஃ஁஁஁஁ ண஢ ஢ிறு஁க .

ஃர்஁:

$$z = 3+2i$$

$$iz = i(3+2i)$$

$$= 3i+2i^2$$


$$= 3i+2(-1)$$

$$= 3i-2$$

$$z+iz = (3+2i)+(3i-2)$$

$$= 3+2i+3i-2$$

$$= 1+5i$$



$$\begin{aligned}
 |(AB)|^2 &= |(OB - OA)|^2 \\
 &= |1 + 5i - (3 + 2i)|^2 \\
 &= |1 + 5i - 3 - 2i|^2 \\
 &= |-2 + 3i|^2 \\
 &= (\sqrt{(-2)^2 + (3)^2})^2 \\
 &= (\sqrt{4 + 9})^2 \\
 &= (\sqrt{13})^2 \\
 &= 13
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 BC^2 &= |(iz) - (z + iz)|^2 \\
 &= |-2 + 3i - (1 + 5i)|^2 \\
 &= |-2 + 3i - 1 - 5i|^2 \\
 &= |-3 - 2i|^2 \\
 &= (\sqrt{(-3)^2 + (-2)^2})^2 \\
 &= (\sqrt{9 + 4})^2 \\
 &= 13
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 CA^2 &= |3 + 2i - (-2 + 3i)|^2 \\
 &= |3 + 2i + 2 - 3i|^2 \\
 &= |5 - i|^2 \\
 &= (\sqrt{(5)^2 + (-1)^2})^2 \\
 &= (\sqrt{25 + 1})^2
 \end{aligned}$$

$$CA^2 = 26$$

$$AB^2 + BC^2 = CA^2$$

$$\text{மற்றும் } AB = BC$$


$$m\angle B = 90^\circ$$

மிக்ககாணம் ABC ஆடு கடுசமபக்க சங்ககாண
மிக்ககாணமாகும்.

உதரயண: 2.5 (உட்டம்)

ஆடுகாத்தல் நிலயாண ஸுள்ளுக்கும் நகலும்
ஸுள்ளுக்கும் கிலபுல ஓடும் எப்பாடுதும் மாறிலியாக
கிடுக்குமாறு நகலும் ஸுள்ளுமின் தியமப்பாத்த ஆடு உபம்
சுண உதரயணுக்கப்படுகிறது.

நிலயாண ஸுள்ளு உட்டத்தின் ஸமயம் மற்றும்
மாறிலி சாணவு உட்டத்தின் ஓடும் ஓகும்.



z ஸ் தியமப்பாத்த $|z - z_0| = r$ ஸ்ண
தமப்பாட்ட நிலயு சங்கிறது.

கிவ்வு z_0 ஸப்பது நிலயாண ஸுள்ளு(ம்) r
ஸப்பது மிகைமாறிலி.

கிச்சமண்பாடி z_0 லிருந்து z க்கி r தூரமின்ன எல்லா கலப்பு எண்களையும் காண்பதற்கும்.

குறிப்பு :

$|z - z_0| = r$ என்பது கலப்பெண் அச்சில் வட்டத்தின் சமன்பாடு ஆகும்.

(i) $|z - z_0| < r$ ஆனது வட்டத்தின் உள்பகுதியையுள்ள புள்ளிகளைக் குறிக்கிறது.

(ii) $|z - z_0| > r$ ஆனது வட்டத்தின் வெளியுள்ள புள்ளிகளைக் குறிக்கிறது.

எ.கா :

$$|z| = r \quad [z = x + iy]$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = r$$

$x^2 + y^2 = r^2$ என்பது ஆதிமைய மையமாகவும் r ஆகி ஆரமும் கொண்ட வட்டத்தைக் குறிக்கிறது.

எ.கா : 2.19

$|3z - 5 + i| = 4$ என்ற சமன்பாடு வட்டத்தை குறிக்கிறது என்ற கார்டிக். மேலும் இதன் மையம் மு ஆரத்தைக் காண்க.

தீர்வு :

$$|z - z_0| = r$$

$$|3z - 5 + i| = 4$$

$$\left| 3z - (5 + i) \frac{3}{3} \right| = 4$$

$$3 \left| z - (5 + i) \frac{1}{3} \right| = 4$$

$$3 \left| z - \left(\frac{5 + i}{3} \right) \right| = 4$$

$$3 \left| z - \left(\frac{5}{3} + \frac{i}{3} \right) \right| = 4$$

$$|z - (\frac{5}{3} + \frac{i}{3})| = \frac{4}{3}$$

கிது $|z - z_0| = r$ என்ற வடிவில் உள்ளது.
எனவே, கிது வட்டத்தை குறிக்கின்றது.

$$\text{மையம் } z_0 = \frac{5}{3} + \frac{i}{3}$$

$$\text{ஆரம் } r = \frac{4}{3}$$

எ.கா : 2.20

$|z + 2 - i| < 2$ என்பது ஒரு வட்டத்தின் உள்பகுதியில் உள்ள புள்ளிகளைக் குறிக்கும் என காட்டுக. அவ்வட்டத்தின் மையம்(ம்) ஆரத்தைக் காண்க.

$$|z - z_0| = r$$

$$|z + (2 - i)| < 2$$

$$|z - (-2 + i)| < 2$$

$$\text{மையம் } z_0 = -2 + i \Rightarrow (-2, 1)$$

$$\text{ஆரம் } r = 2$$

எ.கா : 2.21

பின்வரும் சமன்பாடுகளில் z ன் நியமப்பாத்தையை காட்டியின் வடிவில் காண்க.

$$i) |z| = |z - i|$$

தீர்வு:

$$|z| = |z - i|$$

$$z = x + iy \text{ என்க.}$$

$$|x + iy| = |x + iy - i|$$

$$|x + iy| = |x + (y - 1)i|$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x^2 + (y - 1)^2}$$

$$\sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{x^2+(y^2+1-2y)}$$

$$\sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{x^2+y^2+1-2y}$$

இருபுறம் வர்க்கப்படுத்த

$$(\sqrt{x^2+y^2})^2 = (\sqrt{x^2+y^2+1-2y})^2$$

$$x^2+y^2 = x^2+y^2+1-2y$$

$$\cancel{x^2+y^2} - \cancel{x^2+y^2} - 1 + 2y = 0$$

$$2y - 1 = 0$$

$$ii) |2z - 3 - i| = 3$$

தீர்வு.

$$z = x + iy \text{ என்க.}$$

$$|2z - 3 - i| = 3$$

$$|2(x + iy) - 3 - i| = 3$$

$$|2x + i2y - 3 - i| = 3$$

$$|(2x - 3) + i(2y - 1)| = 3$$

$$\sqrt{(2x-3)^2 + (2y-1)^2} = 3$$

$$\sqrt{(2x)^2 + 3^2 - 2(2x)(3) + (2y)^2 + 1^2 - 2(2y)(1)} = 3$$

$$\sqrt{4x^2 + 9 - 12x + 4y^2 + 1 - 4y} = 3$$

$$(\sqrt{4x^2 + 9 - 12x + 4y^2 + 1 - 4y})^2 = 3^2$$

$$4x^2 + 9 - 12x + 4y^2 + 1 - 4y = 9$$

$$4x^2 + 9 - 12x + 4y^2 + 1 - 4y - 9 = 0$$

$4x^2 + 4y^2 - 12x - 4y + 1 = 0$ என்பது கார்ட்டீசியன் அளவில் z ன் நியமப்பாணத கூகிம்.

பயிற்சி 2.6

1/ $z = x + iy$ ண்று ஏதேனும் சூரு கைப்பெண் $\left| \frac{z-4i}{z+4i} \right| = 1$ ண்றுமாறு கைமந்தால் z ன் நியமப்பாணத மெய்சிச்சு ண்நக் காட்டுக.

தீர்வு :

$$z = x + iy$$

$$\left| \frac{z-4i}{z+4i} \right| = 1$$

$$\frac{|z-4i|}{|z+4i|} = 1$$

$$|z-4i| = |z+4i|$$

$$|x+iy-4i| = |x+iy+4i|$$

$$|x+i(y-4)| = |x+i(y+4)|$$

$$\sqrt{x^2 + (y-4)^2} = \sqrt{x^2 + (y+4)^2}$$

கூடியுமும் வர்க்கப்படுத்து

$$x^2 + (y-4)^2 = x^2 + (y+4)^2$$

$$\checkmark x^2 + y^2 - 8y + 16 = x^2 + y^2 + 8y + 16$$

$$16y = 0$$

$$y = 0$$

z ன் நியமப்பாணத மெய் சிச்சு

2.

$z = x + iy$ என்ற குகையும் ஒரு கலப்பணம் $\text{Im} \left(\frac{2z+1}{iz+1} \right) = 0$ எனுமாறு சிதைந்தால் z இயல்புபாடு $2x^2 + 2y^2 - x + 2y = 0$ எனக்காட்டுக.

தீர்வு:

$$z = x + iy$$

$$\text{Im} \left(\frac{2z+1}{iz+1} \right) = 0$$

$$\text{Im} \left(\frac{2(x+iy)+1}{i(x+iy)+1} \right) = 0$$

$$\text{Im} \left[\frac{2x + i2y + 1}{ix + i^2y + 1} \right] = 0$$

$$\text{Im} \left[\frac{(2x+1) + i2y}{(1-y) + ix} \right] = 0$$

$$\text{Im} \left[\frac{(2x+1) + i2y}{(1-y) + ix} \times \frac{(1-y) - ix}{(1-y) - ix} \right] = 0$$

$$\text{Im} \left[\frac{(2x+1)(1-y) - ix(2x+1) + i2y(1-y) + 2xy}{(1-y)^2 + x^2} \right] = 0$$

$$\frac{-x(2x+1) + 2y(1-y)}{(1-y)^2 + x^2} = 0$$

$$-2x^2 - x + 2y - 2y^2 = 0$$

(-) கால் எடுக்க

$$2x^2 + x - 2y + 2y^2 = 0$$

$$2x^2 + 2y^2 + x - 2y = 0$$

3

பின்வரும் சமன்பாடுகளில் $Z=x+iy$ ன் நியமப்பாணத்தை காட்டியதன் மூலத்தில் எடுத்துக.

i) $[\operatorname{Re}(iz)]^2 = 3$

தீர்வு :

$$Z=x+iy$$

$$[\operatorname{Re}[i(x+iy)]]^2 = 3$$

$$\operatorname{Re}[ix+i^2y]^2 = 3$$

$$\operatorname{Re}[ix-y]^2 = 3$$

$$(-y)^2 = 3$$

$$y^2 = 3$$

ii) $\operatorname{Im}[(1-i)z+1] = 0$

தீர்வு :

$$Z=x+iy$$

$$\operatorname{Im}[(1-i)z+1] = 0$$

$$\operatorname{Im}[(1-i)(x+iy)+1] = 0$$

$$\operatorname{Im}[x+iy-ix-i^2y+1] = 0$$

$$\operatorname{Im}[x-ix+iy+y+1] = 0$$

$$\operatorname{Im}[(x+y+1)+i(y-x)] = 0$$

$$y-x = 0$$

எனவே எடுத்துக்க

$$x-y = 0$$

$$\text{iii) } |z+i| = |z-1|$$

தீர்வு:

$$z = x+iy$$

$$|z+i| = |z-1|$$

$$|x+iy+i| = |x+iy-1|$$

$$|x+i(y+1)| = |(x-1)+iy|$$

$$\sqrt{x^2+(y+1)^2} = \sqrt{(x-1)^2+y^2}$$

இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்து

$$x^2+(y+1)^2 = (x-1)^2+y^2$$

$$x^2+y^2+2y+1 = x^2-2x+1+y^2$$

$$2y+1 = -2x+1$$

$$2x+2y = 0$$

$$\div 2$$

$$x+y = 0$$

$$\text{iv) } \bar{z} = z^{-1}$$

$$z = x+iy$$

$$\bar{z} = z^{-1}$$

$$\bar{z} = \frac{1}{z}$$

$$\overline{(x+iy)} = \frac{1}{x+iy}$$

$$(x-iy)(x+iy) = 1$$

$$x^2+y^2 = 1$$

4) கமயம் மற்ரும் கரம் காண்க.

$$i) |z - 2 - i| = 3$$

$$\text{தீர்வு: } |z - z_0| = r$$

$$|z - 2 - i| = 3$$

$$|z - (2 + i)| = 3$$

$$\text{கமயம் } z_0 = 2 + i \Rightarrow (2, 1)$$

$$\text{கரம் } r = 3$$

$$ii) |2z + 2 - 4i| = 2$$

$$|z - z_0| = r$$

$$|2z + 2 - 4i| = 2$$

$$2|z + 1 - 2i| = 2$$

$$|z - (-1 + 2i)| = \frac{2}{2}$$

$$|z - (-1 + 2i)| = 1$$

$$\text{கமயம் } z_0 = -1 + 2i \Rightarrow (-1, 2)$$

$$\text{கரம் } r = 1$$

$$iii) |3z - 6 + 12i| = 8$$

தீர்வு:

$$|z - z_0| = r$$

$$|3z - 6 + 12i| = 8$$

$$3|z - 2 + 4i| = 8$$

$$3|z - (2 - 4i)| = 8$$

$$|z - (2 - 4i)| = \frac{8}{3}$$

$$\text{கமயம் } z_0 = 2-4i \Rightarrow (2, -4)$$

$$\text{சுற்றம் } r = \frac{8}{3}$$

⑤ $z = x+iy$ காட்டிலியன் வழியில் எழுதுக.

$$i) |z-4| = 16$$

தீர்வு:

$$z = x+iy$$

$$|z-4| = 16$$

$$|x+iy-4| = 16$$

$$|x-4+iy| = 16$$

$$\sqrt{(x-4)^2 + y^2} = 16$$

$$\sqrt{x^2 + 4^2 + 2x(4)y^2} = 16$$

$$\sqrt{x^2 + 16 - 8x + y^2} = 16$$

இருபுறமும் வர்க்கப்படுத்த

$$x^2 + 16 - 8x + y^2 = 256$$

$$x^2 + y^2 - 8x + 16 - 256 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 8x - 240 = 0$$

$$ii) |z-4|^2 - |z-1|^2 = 16$$

தீர்வு:

$$|x+iy-4|^2 - |x+iy-1|^2 = 16$$

$$|(x-4)+iy|^2 - |(x-1)+iy|^2 = 16$$

$$(\sqrt{(x-4)^2 + y^2})^2 - (\sqrt{(x-1)^2 + y^2})^2 = 16$$

$$(x-4)^2 + y^2 = (x-1)^2 + y^2 = 16$$

$$[x^2 + 4^2 - 2x(4)] - [x^2 + 1^2 - 2x + y^2] = 16$$

$$x^2 + 16 - 8x + y^2 - [x^2 + 1 - 2x + y^2] = 16$$

$$\cancel{x^2} + 16 - 8x + \cancel{y^2} - \cancel{x^2} - 1 + 2x - \cancel{y^2} - 16 = 0$$

$$-6x - 1 = 0$$

(-) சமம் பெருக்க,

$$6x + 1 = 0$$

கோப்பு எண்களின் சூடுவ வடிவம் மற்றும் யூலர் வடிவம்:

polar and Euler form of a Complex Number

1M

கோப்பெண்களை கட்டுமல்போதும் கடிக்கும் போதும் நாம் கோப்பெண்களின் தெவ்வக ஆயத்தகாணவகளை பயன்படுத்துகிறோம்.

கோப் பெண்களை பெடுக்கும் போது அல்லது கோப் பெண்களின் அடிக்கிணை கிரணம் போது சூடுவ வடிவத்தை பயன்படுத்துகிறோம்.

100 கோப்பெண்ணின் சூடுவ வடிவம் (Polar form of a Complex number)

சூடுவ ஆயத் தகாண வடிவம் என்பது ஆகியவற்றில் $z = x + iy$ எனது புள்ளியை 2ம் தவகை இசுன் எண்மதிபு மீறும் சிகையாண தகாண்டு வகைப்படுக்கும் மீறறுபடி வடிவம்.

O - சூடுவ புள்ளி


O ஸ் கடுந்த ஆரம்பக்கும் கிடைமட்ட கோடு

சூடுவ இசுகி எண்வம் இதுபக்கிசுகிறோம்


r - சூடுவ புள்ளியில்து 2ம் தவக ஆரம்

θ - சுவவு கோணம்


(r, θ) - ஆயத்தகாணவகை



தெவ்வக ஆயத்தகாணவகை



சூடுவ ஆயத்தகாணவகை



சூடுவ ஆயத்தகாண
மீறும்
தெவ்வக ஆயத்தகாண
முறுகண
சுண்ணின்
சென்
செய்யுத சிவையது

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$z = x + iy$$

$$z = r \cos \theta + ir \sin \theta$$

சிறப்பு:

சூடுவ வடிவத்தை வசதிக்காக, நாம் $z = x + iy = r(\cos \theta + i \sin \theta) = r \operatorname{cis} \theta$ என எழுதுவோம்.

r - z ன் மீட்டர் (அ) மட்டு

θ - z ன் வீச்சு

θ - $\arg(z)$ என குறிக்கிறோம்.

(i) $z = 0$ ஆகி வீச்சு θ வரையறுக்கப்படவில்லை என்பது சூடுவ சூத்திரத்தைப் போன்றது $z \neq 0$ ஆகும்.

(ii) $z = x + iy$ ன் சூடுவ வடிவம் (r, θ)

$\bar{z} = x - iy$ ன் சூடுவ வடிவம் $(r, -\theta)$

(iii) $x = r \cos \theta \rightarrow ①$

$y = r \sin \theta \rightarrow ②$

$$①^2 + ②^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = (r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2$$

$$= r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta$$

$$= r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)$$


$$x^2 + y^2 = r^2$$

$$\boxed{\sqrt{x^2 + y^2} = r}$$

$$\frac{②}{①} \Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{r \sin \theta}{r \cos \theta}$$

$$\boxed{\frac{y}{x} = \tan \theta}$$


case (i)



z	1	i	-1	$-i$
$\text{Arg}(z)$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$-\frac{\pi}{2}$
$\arg z$	$2n\pi$	$2n\pi + \frac{\pi}{2}$	$2n\pi + \pi$	$2n\pi - \frac{\pi}{2}$

formula :

1. $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$
2. $\sin(A-B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$
3. $\cos(A-B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$
4. $\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$



Important Results:

1. $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$
2. $\arg(z_1 z_2) = \arg(z_1) + \arg(z_2)$
3. $\arg[z_1 \dots z_n] = \arg(z_1) + \arg(z_2) + \dots + \arg(z_n)$
4. $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$
5. $\arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = \arg z_1 - \arg z_2$

Euler's form :

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$$

Important Result

1. $e^{i\theta} = \exp(i\theta) = \cos\theta + i\sin\theta$
2. $z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$
3. $e^{i\theta} = \frac{1}{e^{-i\theta}}$