

பாடம் : 4

சேர்மியல் மற்றும் கணிதத் தொகுத்தறிதல்.

22 copies

534

நா. காமாட்சி, M.Sc. B.Ed. M.Phil. Ph.D.
முதுகலை ஆசிரியர் (கணிதம்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி

1. (i) ஒருவர் கிரடி விடுந்திற்காக ஒரு உணவு விடுதிக்கு சென்றார். அங்கிருந்த உணவு பட்டியலில் 10 கிந்திய மற்றும் 7 சீன உணவு வகைகள் கிடுந்தன. ஒரு கிந்திய பிலிங் ஒரு சீன உணவைவிட அவர் எத்தனை வகைகளில் தேர்ந்தெடுக்க முடியும்?

தீர்வு.

கிந்திய உணவு	சீன உணவு
10 வயிகள்	7 வயிகள்

$$\text{மொத்த வயிகள்} = 10 + 7 = 17 \text{ வயிகள்}$$

(ii) ஒரு கட்டடத்தில் 3 விதமான மகிடுந்தி மொம்மைகளும் 2 விதமான தொப் வண்டி மொம்மைகளும் உள்ளன. ஒரு கிடுந்தி ஒரு மகிடுந்தி மொம்மையையும் மற்றும் ஒரு தொப் வண்டி மொம்மையையும் எத்தனை வயிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்?

தீர்வு

மகிடுந்தி	தொப் வண்டி
3 வயிகள்	2 வயிகள்

$$\text{மொத்த வயிகள்} = 3 \times 2 = 6 \text{ வயிகள்}$$

(iii) 1, 2, 3, 4, 5 என்ற கிணக்கங்கள் திரும்ப வராத முறையால்

மயன்மடுத்தி எத்தனை கிரண்டு - கிணக்க எண்களை உருவாக்கலாம்?

தீர்வு

10 வயிகிணக்கம்	1 வயிகிணக்கம்
4 வயிகள்	5 வயிகள்

1, 2, 3, 4, 5 இவ் மயன்மடுத்தி உருவாக்கப்படும் கிரண்டு கிணக்க எண்கள் = $4 \times 5 = 20$ வயிகள்

(iv) 10 கிடுக்கைகள் உள்ள அரங்கில் முன்று நபர்கள் நுழைகிறார்கள். எத்தனை வயிகளில் அவர்கள் அந்த கிடுக்கை களில் அமரலாம்?

தீர்வு

முதல் நபர்	2வது நபர்	3வது நபர்
10 வயிகள்	9 வயிகள்	8 வயிகள்

$$\text{மொத்த வயிகள்} = 10 \times 9 \times 8 = 720 \text{ வயிகள்}$$

(v) 5 நபர்களை ஒரு வரிசையால் எத்தனை வயிகளில் அமரவைக்கலாம்?

தீர்வு

முதல் நபர்	2வது நபர்	3வது நபர்	4வது நபர்	5வது நபர்
5 வயிகள்	4 வயிகள்	3 வயிகள்	2 வயிகள்	1 வயி

$$\text{மொத்த வயிகள்} = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5! = 120$$

2) (i) ஒரு கிரண்டில் 6 வயிவான கிணக்கங்களைத் தொண்ட கட்டிச் சொல் உள்ளது. அந்த கட்டிச் சொன்ன மீட்டெடுக்க அதிபட்சம் எத்தனை முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும்?

தீர்வு. மொத்த எண்கள் 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ஆகிய 10

முதல் இலக்கம்	2வது இலக்கம்	3வது இலக்கம்	4வது இலக்கம்	5வது இலக்கம்	6வது இலக்கம்
10	9	8	7	6	5

$$\text{கட்டிச் சொன்ன மீட்டெடுக்க அதிபட்ச முயற்சிகளின் எண்ணிக்கை} = 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 151200$$

(ii) 4 வெவ்வேறு நிற தொழுகளில் 3 தொழுகளை ஒன்றின் கீழ் ஒன்றாக அமைத்து எத்தனை வெவ்வேறு விதமான சமக்கைகளை உருவாக்கலாம்?

மேல் பகுதி	நடுபகுதி	கீழ் பகுதி
4 வயிகள்	3 வயிகள்	2 வயிகள்

$$\text{மொத்த சமக்கைகள்} = 4 \times 3 \times 2 = 24 \text{ வயிகள்}$$

3) நான்கு முந்தாதகள் ஒரு வட்டம்
மந்தயத்தில் ஒதுகிறார்கள்

i) முதல் இரண்டு இடங்களை
எத்தனை வழிகளில் நிரம்பலாம்?

தீர்வு

முதல் இடம்	2ம் இடம்
4 வழிகள்	3 வழிகள்

முதல் இரண்டு இடங்களை
நிரம்பும் வழிகளின் எண்ணிக்கை
 $= 4 \times 3 = 12$ வழிகள்.

ii) அந்த மந்தயத்தை எத்தனை
வழிகளில் முடிக்கலாம்?

மொத்த வழிகள் $= 4 \times 3 \times 2 \times 1$
 $= 24$ வழிகள்.

4) 2, 4, 6, 8 என்ற இலக்கங்
களைப் பயன்படுத்தி எத்தனை
3 - இலக்க எண்களை

i) இலக்கங்கள் திரும்ப வராமல்

100வது இலக்கம்	10வது இலக்கம்	1வது இலக்கம்
4 வழிகள்	4 வழிகள்	4 வழிகள்

3 இலக்க எண்களின் மொத்த
எண்ணிக்கை $= 4 \times 4 \times 4$
 $= 64$ வழிகள்

ii) இலக்கங்கள் திரும்ப வராதவாறு
காணலாம்.

100வது இலக்கம்	10வது இலக்கம்	1வது இலக்கம்
2	3	4

3 இலக்க எண்களின் மொத்த
எண்ணிக்கை $= 2 \times 3 \times 4 = 24$

5) எத்தனை முன்று இலக்க எண்களை
3 சூனாவும் ஒன்றும் இலக்க இடத்தில்
வருமாறு

i) இலக்கங்கள் திரும்ப வரும்படியான

100வது இலக்கம்	10வது இலக்கம்	1வது இலக்கம்
9	10	1
(0 முதல் 9)	(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)	(3 மட்டும்)

மொத்த 3 இலக்க எண்கள்
 $= 9 \times 10 \times 1 = 90$ வழிகள்.

ii) இலக்கங்கள் திரும்ப வராதவாறு
காணலாம்.

100வது இலக்கம்	10வது இலக்கம்	1வது இலக்கம்
8	8	1
		(3 மட்டும்)

மொத்த 3 இலக்க எண்கள்
 $= 8 \times 8 \times 1 = 64$ வழிகள்.

6) 100 மற்றும் 500 க்கு இடையே
0, 1, 2, 3, 4, 5 என்ற இலக்கங்
களைப் பயன்படுத்தி

i) இலக்கங்கள் திரும்ப வரும்
நிலையான எத்தனை எண்களை
உருவாக்கலாம்?

100th unit	10th unit	unit
4	6	6

100 மற்றும் 500 க்கு இடையே
3 இலக்க எண்கள் மட்டுமே
இருக்கும்.

மொத்த வழிகள் $= 4 \times 6 \times 6$
 $= 144$ வழிகள்

ii) இலக்கங்கள் திரும்ப வராமல்
எத்தனை எண்களை உருவாக்கலாம்?

100வது இலக்கம்	10வது இலக்கம்	1வது இலக்கம்
4	5	4
(1, 2, 3, 4)		

மொத்த வழிகள் $= 4 \times 5 \times 4$
 $= 80$ வழிகள்

7) எத்தனை 3 - இலக்க ஒற்றைப்
படை எண்கள் 0, 1, 2, 3, 4, 5
என்ற இலக்கங்களைப் பயன்படுத்தி

(3)

நா. காமாட்சி, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D.
முதுகலை ஆசிரியர் (கணிதம்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி
திருவாரூர், காவிரியூர் (Dt)

ii) இலக்கங்கள் திரும்ப வராமல்

1000வது இலக்கம்	10வது இலக்கம்	1வது இலக்கம்
4	4 (except 0)	3 (1, 3, 4, 5)

மொத்த அழகன் = $4 \times 4 \times 3 = 48$

iii) இலக்கங்கள் திரும்ப வகுமானு காணலாம்.

1000வது இலக்கம்	10வது இலக்கம்	1வது இலக்கம்
5 அழகன்	6 அழகன்	3
(0 ஐதவா)	(0, 1, 2, 3, 4, 5)	(1, 3, 4, 5)

மொத்த அழகன் = $5 \times 6 \times 3 = 90$ அழகன்

8) கீழ்க்காணும் நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு 999 மற்றும் 10000 க்கு இடையே உள்ள எண்களை எண்ணுக.

i) எந்த நிபந்தனையும் இல்லாமல். மொத்த எண்கள் 0, 1, 2, 3, 4, ..., 9 999 க்கும் 10000 க்கும் இடையே 4 இலக்க எண்கள் மட்டுமே இருக்கும்

1000வது இலக்கம்	100வது இலக்கம்	10வது இலக்கம்	1வது இலக்கம்
9	10	10	10

மொத்த அழகன் = $9 \times 10 \times 10 \times 10 = 9000$ அழகன்

ii) எந்த இலக்கமும் திரும்ப வராமல்

1000வது இலக்கம்	100வது இலக்கம்	10வது இலக்கம்	1வது இலக்கம்
9	7	8	9

(0 ஐதவா)
மொத்த அழகன் = $9 \times 7 \times 8 \times 9 = 4536$

iii) இறுத்த மட்டம் ஏதேனும் ஒரு இலக்கம் திரும்ப வகுமானு

= (மொத்த 4 இலக்க எண்கள்)

- (எந்த இலக்கமும் திரும்ப வராமல் இருப்பது)

= $9000 - 4536 = 4464$ அழகன்

9) 0, 1, 2, 3, 4, 5 என்ற இலக்கங்களை பயன்படுத்தி 5 சிபன் வகுமும் 3-இலக்க எண்கள் கீழ்க்காணும் நிபந்தனைக்குட்பட்டு எத்தனை உள்ளன.

i) இலக்கங்கள் திரும்ப வராமல்?

1000வது இலக்கம்	100வது இலக்கம்	1வது இலக்கம்
4	4	2
(0, 5 ஐதவா)	(1, 2, 3, 4)	(0 மற்றும் 5)


மொத்த அழகன் = $4 \times 4 \times 2 = 32$

ii) இலக்கங்கள் திரும்ப வகுமானு

1000வது இலக்கம்	100வது இலக்கம்	1வது இலக்கம்
5	6	2
(0 ஐதவா)	(1, 2, 3, 4, 5, 0)	(0, 5 மட்டும்)

மொத்த அழகன் = $5 \times 6 \times 2 = 60$ அழகன்.

10). A என்ற இடத்திலிருந்து B என்ற இடத்திற்கு செல்ல B₁, B₂ என்ற இரண்டு பேருக்கு அடுத்த தடங்காணம் T₁, T₂ என்ற இரண்டு இரயன் அழகன் தடங்காணம் மேலும் A₁ என்ற வான் அழகன் தடங்காணம் உள்ளது. B என்ற இடத்திலிருந்து C என்ற இடத்திற்கு செல்ல இருந்து C என்ற இடத்திலிருந்து அடுத்த தடங்காணம் மேலும் B₁ என்ற ஒரு பேருக்கு அடுத்த தடங்காணம் மேலும் T₁, T₂ என்ற இரண்டு இரயன் அழகன் தடங்காணம் மேலும் A₁ என்ற வான் அழகன் தடங்காணம் உள்ளது. A என்ற இடத்திலிருந்து C என்ற இடத்திற்கு B என்ற இடம் வழியே ஏதேனும் தடத்தை மீண்டும் பயன் படுத்தாமல் எத்தனை அழகன் செல்லலாம்?



ஏதேனும் தடங்காணம் மீண்டும் பயன் படுத்தாமல் இருக்க (B₁, T₁) (B₁, T₂) (B₂, T₁) (B₂, T₂) (B₁, A₁) (B₂, A₁) (T₁, A₁) (T₂, A₁) (T₁, B₁) (T₂, B₁) (T₁, B₂) (T₂, B₂) (A₁, B₁) (A₁, B₂) and (A₁, T₂)

(5)

(ii) 10 மாணவர்களுக்கு 12 உயர்-
பெறாண பரிசுகளை எத்தனை
வழிகளில் பகிர்ந்தளிக்கலாம்?

மொத்த வழிகள் = 10^{12} .

14) மதிப்பினைக் காண்க.

i) $6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$
 $= 720$

ii) $4! + 5! = (4 \times 3 \times 2 \times 1)$
 $+ (5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1)$
 $= 24 + 120 = 144.$

iii) $3! - 2! = (1 \times 2 \times 3) - (1 \times 2)$
 $= 6 - 2 = 4.$

iv) $3! \times 4! = (1 \times 2 \times 3) \times (1 \times 2 \times 3 \times 4)$
 $= 6 \times 24 = 144.$

v) $\frac{12!}{9! \times 3!} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9!}{9! \times 1 \times 2 \times 3}$
 $= 220.$

vi) $\frac{(n+3)!}{(n+1)!} = \frac{(n+3)(n+2)(n+1)!}{(n+1)!}$
 $= (n+3)(n+2)$

$= n^2 + 3n + 2n + 6$
 $= n^2 + 5n + 6.$

15. மதிப்பைக் காண்க

i) $n=6, r=2.$

$$\frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{6!}{2!4!} = \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6}{1 \times 2 \times 1 \times 2 \times 3 \times 4} = 15.$$

ii) $n=10, r=3$

$$\frac{10!}{3!(10-3)!} = \frac{10!}{3!7!} = \frac{(1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10)}{(1 \times 2 \times 3 \times 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7)} = 120$$

iii) For any $n, r=2$. எந்த n .

$$\frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n(n-1)(n-2)!}{1 \times 2 (n-2)!} = \frac{n^2 - n}{2}.$$

16) n ன் மதிப்பைக் காண்க.

i) $(n+1)! = 20(n-1)!$

$(n+1) \cdot n(n-1)! = 20(n-1)!$

$n^2 + n - 20 = 0.$

$(n+5)(n-4) = 0$

$n = -5$ (எந்தியமற்றவை)

$\therefore n = 4.$

ii) $\frac{1}{8!} + \frac{1}{9!} = \frac{n}{10!}$

நா. காமாட்சி, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D.
 முதுகலை ஆசிரியர் (கணிதம்)
 அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி
 கோலந்தலாடி, தஞ்சாவூர் (TN)

$$\Rightarrow \frac{1}{8!} + \frac{1}{9!} = \frac{n}{10!}$$

$$1 + \frac{1}{9} = \frac{n}{90}$$

$$\frac{9+1}{9} = \frac{n}{90}$$

$$\frac{10}{9} = \frac{n}{90}$$

$$n = \frac{10 \times 90}{9} = 100.$$

$n = 100$

மயங்கி 4.2

i) $(n-1)P_3 : nP_4 = 1 : 10$ ன்
 n ன் காண்க.

$$\frac{(n-1)P_3}{nP_4} = \frac{1}{10}$$

$$10(n-1)P_3 = nP_4.$$

$$10 \cdot \frac{(n-1)!}{(n-1-3)!} = \frac{n!}{(n-4)!}$$

$$10 \cdot \frac{(n-1)!}{(n-4)!} = \frac{n(n-1)!}{(n-4)!}$$

$10 = n$

2. $10P_{r-1} = 2 \times 6P_r$ எனில் r இன் காண்க.

தீர்வு $10P_{r-1} = 2 \times 6P_r$

$$\frac{10!}{[10-(r-1)]!} = 2 \cdot \frac{6!}{(6-r)!}$$

$$\frac{10!}{(10-r+1)!} = 2 \cdot \frac{6!}{(6-r)!}$$

$$5 \cdot \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6!}{(11-r)!} = 2 \cdot \frac{6!}{(6-r)!}$$

$$\frac{5 \times 9 \times 8 \times 7}{(11-r)(10-r)(9-r)(8-r)(7-r)(6-r)!} = \frac{1}{(6-r)!}$$

$$5 \times 9 \times 8 \times 7 = (11-r)(10-r)(9-r)(8-r)(7-r)$$

$$7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 = (11-r)(10-r)(9-r)(8-r)(7-r)$$

$$11-r = 7$$

$$11-7 = 4$$

$$r = 4$$

3) (i) ஒரு நீச்சல் போட்டியில் 8 பேர் கலந்து கொள்கின்றனர். தங்கம் வெள்ளி மற்றும் வெண்கலம்

பரிசுகளை எத்தனை வழிகளில் வழங்க வியலும்?

தீர்வு

தங்கம்	வெள்ளி	வெண்கலம்
8	7	6

மொத்த வழிகள் = $8 \times 7 \times 6 = 336$.
(ii) ஒன்று சிவன்களிடம் 4 சட்டை, 5 பேன்சட்டை மற்றும் 6 தொப்பிகள் உள்ளன. அவற்றை அவர்கள் எத்தனை வழிகளில் அணியலாம்?

தீர்வு மொத்த வழிகள்

$$= 4P_3 \times 5P_3 \times 6P_3$$

$$= \frac{4!}{(4-3)!} \times \frac{5!}{(5-3)!} \times \frac{6!}{(6-3)!}$$

$$= \frac{4!}{1!} \times \frac{5!}{2!} \times \frac{6!}{3!}$$

$$= \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4}{1} \times \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5}{1 \times 2} \times \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6}{1 \times 2 \times 3}$$

$$= 24 \times 60 \times 120 = 1,72,800.$$

(4) SIMPLE என்ற வார்த்தையிலுள்ள அனைத்து எழுத்துகளையும் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தி எத்தனை வரிசை மாற்றங்களை உருவாக்கலாம்?

தீர்வு SIMPLE = 6 எழுத்துகள்
அனைத்து எழுத்துகளையும் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்தி உருவாக்கும் மொத்த எழுத்துக்கள்

$$= 6P_6 = \frac{6!}{(6-6)!} = \frac{6!}{0!}$$

$$= \frac{6!}{1} = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720.$$

5) ஒரு தேர்வில் 10 பரிசு வழிப்பு விருந்தினர்களுக்கு உள்வாங்கி கொடுக்கப்படும். எத்தனை வழிகளில் இந்த தேர்விற்கு விருந்தினர்களைக் கொடுக்கலாம்?

(i) மூன்று விருந்தினர்களுக்கும் நான்கு பரிசுகள் உள்வாங்கலாம்.

$$\text{மொத்த வழிகள்} = 4^{10}.$$

(ii) முதல் நான்கு விருந்தினர்களுக்கு மூன்று பரிசுகளும் மீதமுள்ள விருந்தினர்களுக்கு இரண்டு பரிசுகளும் உள்வாங்கலாம்.

முதல் நான்கு விருந்தினர்களுக்கு

$$\text{மூன்று பரிசுகள்} = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4$$

$$\text{மீதமுள்ள 6 விருந்தினர்கள்} = 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^6$$

$$\text{மொத்த வழிகள்} = 3^4 \times 5^6.$$

(7)

நா. காமாட்சி, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D.
முதுகலை ஆசிரியர் (கணிதம்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி
கோலிங்குத்தூர், தாஞ்சாவூர் (Dt)

(iii) 10 உயர்வு விண்ணாக்கி (n+1)
உயர்ப்புகள் உள்ளன.

தீர்வு. 10 விண்ணாக்கி 10 உயர்வு
களின் விடை யளித்தல்
(10+1) விண்ணாக்கிக்கு
அளிக்கும் உயர்ப்பு 11!

6) ஒரு மாணவன் 5 மலர் உயர்ப்பு
விடை யளி விண்ணாக்கிக்கு
விடை யளித்த கேள்விகளும். ஒவ்வொரு
விண்ணாக்கிக்கும் உள்ள நாண்டு
உயர்ப்புகளின் ஒன்று சரி யானது.
i) அதிகபட்சமாக எத்தனை
வெவ்வேறான விடைகளை ஒரு
மாணவனால் தர முடியும்?

தீர்வு. ஒவ்வொரு விண்ணாக்கிக்கும்
4 உயர்ப்புகளின் விடை யளிக்கலாம்
அதிகபட்ச வெவ்வேறான
விடைகள் = $4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 4^5$

ii) ஒவ்வொரு விண்ணாக்கிக்கும்
ஒன்றிற்கு மேலான உயர்ப்புகள்
சரி யானதாக கிடைக்கிறதானால்
ஒரு விடை எவ்வாறு மாற்ற
முடியும்?

ஒன்றிற்கு மேலான உயர்ப்புகள்
சரி யானதாக கிடைக்க உயர்ப்புகள் = $\frac{5}{2.5}$

7) "ARTICLE" என்ற வார்த்தையின்
உள்ள மைய எழுத்துகள் இரட்டை
கிடைக்க கிடைத்தல் உருமாறு எத்தனை
எழுத்துச் சரங்கள் உருவாக்க
முடியும்?

தீர்வு. மைய எழுத்துகள் A, I, E.
மொத்தம் '3' இரட்டை கிடைக்கலாம்
உள்ளன.

எனவே 3 மைய எழுத்துக்கள்
3 இரட்டை கிடைக்கலாம்
அமைவு உயர்ப்புகள் = $3P_3 = 3!$
= $1 \times 2 \times 3 = 6$ உயர்ப்புகள்

மீதமுள்ள 4 எழுத்துக்கள்
= $4!$ உயர்ப்புகள் = $4 \times 3 \times 2 \times 1$
= 24 உயர்ப்புகள்

மொத்த உயர்ப்புகள் = $6 \times 24 = 144$.

8) 8 மெய்க்கள் மற்றும் 6 சமண்கள்
ஒரு வரிசையால் நிற்கிறார்கள்.

i) எவரும் எந்த கிடங்கிலும் நிற்கலாம்
என்ற உடையால் எத்தனை உயர்ப்புகளில்
நிற்கலாம்?

8 மெய்க்கள் + 6 சமண்கள்
= 14 மெய்க்கள்

$\therefore 14 P_{14} = 14!$ உயர்ப்புகள்

ii) 6 சமண்களும் எடுத்தெடுத்து
உருமாறு எத்தனை உயர்ப்புகளில்
நிற்கலாம்?

$\boxed{N N N N N N}$ $\boxed{8 \text{ மெய்க்கள்}}$
6! 8!

மொத்த உயர்ப்புகள் = $6! \times 8!$

(iii) எந்த இடு சமண்களும் ஒன்றாக
நிற்காமல் எத்தனை உயர்ப்புகளில்
நிற்கலாம்?

$\underline{N} \underline{N} \underline{N} \underline{N} \underline{N} \underline{N} \underline{N} \underline{N} \underline{N} \underline{N}$
 $\underline{N} \underline{N} \underline{N}$

9 கிடங்களில் 6 சமண்கள்
மற்றும் 8 கிடங்களில் 8 மெய்க்கள்
மொத்த உயர்ப்புகள் = $9P_6 \times 8!$
= $9P_6 \times 8!$

9) "MISSISSIPPI" என்ற வார்த்தையின்
உள்ள எழுத்துகளைப் பயன்
படுத்தி எத்தனை வெவ்வேறான
வரிசை மாற்றங்களை
உருவாக்கலாம்?

தீர்வு மொத்தம் = 11 எழுத்துக்கள்
 $S = 4$ குறை | $P = 2$ குறை
 $I = 4$ குறை | $M = 1$ குறை

மொத்த வயவ்யமான வரிசை
 மாற்றங்கள் = $\frac{11!}{4!4!2!1!}$

$$= \frac{11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{1 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 2 \times 1 \times 1 \times 1}$$

$$= 34650.$$

10) $a^2 b^3 c^4$ என்ற பெருக்கலில்
 அடுக்கு இயற்கணிதம் மயன்
 மடுத்தாமல் எத்தனை வடிவங்கள்
 எழுதலாம்?

தீர்வு $a a b b b c c c c$

$a =$ கிரண்டு குறை
 $b = 3$ குறை, $c = 4$ குறை.

$$\text{Total} = 2 + 3 + 4 = 9.$$

$$\text{மொத்த வடிவங்கள்} = \frac{9!}{2!3!4!}$$

$$= \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9}{1 \times 2 \times 1 \times 2 \times 3 \times 1 \times 2 \times 3 \times 4}$$

$$= 1260.$$

11) 4 கணிதம் புத்தகங்கள், 3 இயற்பியல்
 புத்தகங்கள், 2 வேதியியல் புத்தகங்கள்
 மற்றும் 1 உயரியல் புத்தகத்தை ஆரீ
 அமலாரியல் பரேமபு புத்தகங்கள்
 ஒன்றாக வரும் வகையில் எத்தனை
 வடிவங்கள் அடுக்கலாம்?

தீர்வு மொத்த மடங்கள் = 4

மொத்த வடிவங்கள் = $4!$
 கணிதம் = $4!$, வேதியியல் = $2!$
 இயற்பியல் = $3!$, உயரியல் = $1!$

$$\text{மொத்த வடிவங்கள்} = 4! \times 4! \times 3! \times 2! \times 1!$$

$$= 24 \times 24 \times 6 \times 2 \times 1 = 6912.$$

12) "SUCCESS" என்ற வார்த்தையின்
 உள்ள எழுத்துக்களில் உள்ள 3 களும்
 ஒன்றாக வரும் வகையில் எத்தனை
 வடிவங்களில் வரிசைப்படுத்தலாம்?

தீர்வு உள்ள 3 களும் ஒன்றாக வரும்
 பிதருள்ள வடிவங்கள் $(SSS) U C C C$
 $= 5$ வடிவங்கள்

$$\text{மொத்த வடிவங்கள்} = \frac{5!}{2!1!1!}$$

$$= \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{1 \times 2} = 60$$

வடிவங்கள்

13) ஒரு நாணயம் 8 குறை
 எரண்டம் படுகின்றது.
 (1) வயவ்யமான தலைகள் மற்றும்
 துக்களைக் கொண்டு வரிசைகள்
 எத்தனை கிடுக்கும்?

தீர்வு நாணயம் சுண்டு மொது
 கிடைப்பது $\{H, T\} \Rightarrow 2$

8 நாணயங்கள் 8 குறை
 எரண்டம் படுகின்றது.

மொத்த வடிவங்கள் = 2^8
 (11) அறு தலைகள் மற்றும் இரண்டு
 துக்கள் கொண்டு வயவ்யமான
 வரிசைகள் எத்தனை கிடுக்கும்?

$$\text{தீர்வு மொத்த வடிவங்கள்} = \frac{2^8}{6!2!}$$

14) "INTERMEDIATE" என்ற
 வார்த்தையின் உள்ள எழுத்துக்களில்
 மயன் மடுத்தி கிழக்காளம்
 நியந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு
 எத்தனை எழுத்துச் சரங்களை
 உருவாக்கலாம்?

1) உயர் எழுத்துகள் மற்றும்
 மெய் எழுத்துகள் எத்தனை
 வடிவங்கள்.

நா. காமாட்சி, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D.
 முதுகலை ஆசிரியர் (கணிதம்)
 அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி
 கோவிந்தவாடி, காஞ்சிபுரம் (Dt)

(9)

நா. காமாட்சி, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D.
முதுகலை ஆசிரியர் (கணிதம்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி
கோவிந்தவாடி, காஞ்சிபுரம் (DT 1)

$$E = 3 \text{ ஓற்றை, } I = 2 \text{ ஓற்றை}$$

$$A = 1 \text{ ஓற்றை}$$

$$\text{மொத்தம்} = 12 \text{ எழுத்துகள்}$$

$$\begin{aligned} \text{மொத்த அரிசைகள்} &= \frac{12!}{3! \times 2! \times 1!} \\ &= \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{1 \times 2 \times 3 \times 1 \times 2 \times 1} \\ &= 39916800. \end{aligned}$$

(ii) என்ன உயரகூத்துகளும்
ஒன்றாக உடுமாறு.

$$\text{உயர் எழுத்துகள்} = 6$$

$$\text{மெய் எழுத்துகள்} = 6 (A, E, I)$$

$$\text{மொத்த அடிகள்} = 6 \times 6!$$

(iii) உயரகூத்துகள் ஒன்றாக
உராத வகையால்

$$2 \text{ மெ } 2 \text{ மெ } 2 \text{ மெ } 2 \text{ மெ } 2 \text{ மெ}$$

$$2 \text{ மெ } 2 \text{ மெ}$$

$$6 \text{ உயரகூத்துகளில் } 2 (TT)$$

ஒன்று உடுகிறது

$$\text{கூடியவாறு அடிகள்} = \frac{6!}{2!}$$

(iv) எந்த கிடை உயரகூத்துகளும்

ஒன்றாக உராத வகையால்

$$6 \text{ மெய்யெழுத்துகளில் } 3E's,$$

$$2I's \text{ மூன்று } 7 \text{ உறு கிடத்தின்}$$

$$\text{உள்ள அடிகள்} = 7P_6 \times \frac{1}{3!} \times \frac{1}{2!}$$

$$\text{மொத்த அடிகள்}$$

$$= \frac{6!}{2!} \times 7P_6 \times \frac{1}{3!} \times \frac{1}{2!}$$

$$= \frac{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6}{1 \times 2} \times \frac{7!}{6} \times \frac{1}{2}$$

$$= 5 \times 3 \times 2 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2$$

$$= 151200.$$

15) 1, 1, 2, 3, 3 மற்றும் 4 என்னும் இலக்கங்கள்
குறித்திதழாக அட்டையால் எழுதப்
பட்டுள்ளது. ஒரு 6-இலக்க எண்ணை
அமைக்க கிந்திக்கும் அட்டைகளையும்
வரிசைப்படுத்தும் போது.

(i) எத்தனை எவ்வெவ்வாறு 6-இலக்க
எண்களை உருவாக்கலாம்?

தீர்வு 1) 2 ஓற்றை, 2) ஒரு ஓற்றை
3) 2 ஓற்றை.

எவ்வெவ்வாறு 6-இலக்க எண்கள்

$$= \frac{6!}{2! \cdot 2!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{1 \times 2 \times 1 \times 2}$$

$$= 180 \text{ அடிகள்.}$$

(ii) இவற்றில் எத்தனை 6-இலக்க
எண்கள் கிரட்டைப் படை?

1 அடி இலக்கம் 2 உள்ளது 4

கிரட்டைப் பட்டையாக

இருக்கும். கோவிந்தவாடி, காஞ்சிபுரம் (DT 1)
மேலுள்ள 5 இலக்கம் = $\frac{5!}{2! \cdot 2!}$

∴ 6 இலக்க கிரட்டைப் படை

$$\begin{aligned} \text{எண்} &= \frac{5!}{2! \times 2!} \times 2 = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{1 \times 2 \times 1 \times 2} \times 2 \\ &= 60 \text{ அடிகள்} \end{aligned}$$

(iii) இவற்றில் எத்தனை 6 இலக்க
எண்கள் 4 இல் உட்படம்?

$$\begin{aligned} \text{தீர்வு} \quad &\text{ஒன்றாக 4 இலக்கம்} = 1 \text{ அடி} \\ &\text{மேலுள்ள 5 இலக்கம்} = \frac{5!}{2! \cdot 2!} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{மொத்த 6 இலக்க 4 இல்} \\ \text{உட்படம் எண்கள்} &= \frac{5!}{2! \cdot 2!} \times 1 \end{aligned}$$

$$= \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2}{1 \times 2 \times 1 \times 2} = 30 \text{ அடிகள்}$$

16) 'GARDEN' என்ற வார்த்தையால்
உள்ள எழுத்துகளை வரிசை
மாற்றத்திற்கு உட்படுத்திக் கொண்டு
எழுத்துச் சரங்களை அமைக்க
அதராதியால் உள்ளது போன்று
வரிசைப்படுத்தும் போது தீர்க்கப்படும்
வார்த்தைகளின் திரைக்கதை காண்க.

(i) GARDEN (ii) DANGER

தீர்வு அங்கில அகராதி வரிசையன்
மறு A, D, E, G, N, R.

A	D	E	GA	GAD	GARN	GARA	GAE
5!	5!	5!	4!	3!	3!	2!	3!
		GARDA		GARDEN			
		1!		1!			

மொத்த தரம்

$$= 5! + 5! + 5! + 4! + 3! + 3! + 2! + 3! + 1! + 1!$$

$$= 120 + 120 + 120 + 24 + 6 + 6 + 6 + 2 + 1 + 1$$

$$= 406.$$

ii) DANGER.

அங்கில அகராதி வரிசையன் மறு
A, D, E, G, N, R.

A	DA	DAE	DAG	DANA	DANE	DANGER
5!	4!	3!	3!	2!	2!	1!
						DANGER
						1!

மொத்த தரம்

$$= 120 + 24 + 6 + 6 + 2 + 2 + 1 + 1$$

$$= 162.$$

17) "THING" என்ற வார்த்தையின்
உள்ள எழுத்துகளை வரிசை
மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தி எத்தனை
எழுத்துச் சரங்களை பெறலாம்.

மேலும், கிதனை அங்கில அகராதியின்
உள்ளது போன்று வரிசைப் படுத்தும்
போது 85 எழுத்து எழுத்துச் சரம்
என்னவாக கிடைக்கும்?
தீர்வு அங்கில அகராதி வரிசையன்
மறு G, H, I, N, T.

G	H	I	NG	NGH	NGHI	NGHIT
4!	4!	4!	3!	2!	1!	1!

$$\text{தரம்} = 24 + 24 + 24 + 6 + 2 + 1 + 1$$

$$= 85.$$

∴ 85 எழுத்து எழுத்துச் சரம் NGHIT.

18) FUNNY என்ற வார்த்தையின்
உள்ள எழுத்துகளை வரிசை
மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தி எத்தனை
எழுத்துச் சரங்களை அங்கில
அகராதியின் உள்ளது போன்று
வரிசைப் படுத்தும் போது FUNNY.
என்ற வார்த்தையின் தரம் காண்க.

தீர்வு அங்கில அகராதி வரிசையன்
மறு F, N, N, U, Y.

$$F \text{ ன் தொடங்கும் வார்த்தையின்}$$

$$\text{எண்ணிக்கை} = \frac{4!}{2!} = \frac{4 \times 3 \times 2 \times 1}{1 \times 2}$$

$$= 12.$$

$$\text{ii) } F \text{ ன் தொடங்கும் வார்த்தையின்}$$

$$\text{எண்ணிக்கை} = \frac{3!}{2!} = \frac{3 \times 2}{2} = 3$$

$$\text{iii) } FUNN \text{ ன் தொடங்கும் வார்த்தையின்}$$

$$\text{எண்ணிக்கை} = 1!$$

எழுத்து வார்த்தை உள்ளது FUNNY.

$$\therefore \text{மொத்த தரம்} = 12 + 2 + 3 + 1 + 1$$

$$= 19.$$

19) 1, 2, 3, 4 மற்றும் 5 என்ற
கிணக்கங்கள் மீண்டும் திரும்ப
வராத வகையில் ஒருவாகும் எல்லா
4-கிணக்க எண்களின் கூட்டுத்
தொகை காண்க.

தீர்வு கொடுக்கப்பட்ட 5 எண்களை
தொண்டு ஒருவாகும் 4
கிணக்க எண்களின் எண்ணிக்கை

$$= {}^5P_4 = 120.$$

120 கிணக்கம்

100th	100th	10th	1
4	3	2	1

$$= 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24 \text{ ways.}$$

இதிலொன்று, 2, 3, 4, 5 எண்களும்
24 வடிவங்களில் வந்துவது
கிணக்கத்தின் வரும்

நா. காமாட்சி, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D.
முதுகலை ஆசிரியர் (கணிதம்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி
கோல்கொண்டி, கரூர் (T)

21

நா. காமாட்சி, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D.
முதுகலை ஆசிரியர் (கணிதம்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி
சேலத்தவாடி, காரைச்சேரி, (DT)

$$\begin{aligned} \text{கூடுதல்} &= (4P_3 \times 1) + (4P_3 \times 2) \\ &+ (4P_3 \times 3) + (4P_3 \times 4) + (4P_3 \times 5) \\ &= 4P_3 (1+2+3+4+5) \\ &= 4P_3 (15) \end{aligned}$$

(i) இதேபோன்று 10வது இலக்கத்தின் உள்ள எண்களின் கூடுதல்

$$= 4P_3 \times 15 \times 10 = 4P_3 \times 150.$$

(ii) 100வது இலக்கத்திலுள்ள எண்களின் கூடுதல்

$$= 4P_3 \times 15 \times 100 = 4P_3 (1500)$$

(iii) 1000வது இலக்கத்திலுள்ள எண்களின் கூடுதல்

$$= 4P_3 \times 15 \times 1000 = 4P_3 (15000).$$

மொத்த 4 இலக்க எண்கள்

$$\begin{aligned} &= 4P_3 (15) + (4P_3 \times 150) \\ &+ (4P_3 \times 1500) + (4P_3 \times 15000) \\ &= 4P_3 (15 + 150 + 1500 + 15000) \\ &= 4P_3 (16665) \\ &= 4 (16665) = 66660. \end{aligned}$$

20) 0, 2, 5, 7, 8 என்னு
இலக்கங்கள் மீண்டும் வராத
உகையான 2-இலக்கங்களின்
எண்ணிக்கை

கூடுதல் தகவல்களை காண்க.

தீர்வு

1000வது	100வது	10வது	1வது
4	5	5	5

(0, 2, 5, 7, 8).

(i) ஒன்றாவது இலக்கத்தின் மீத
மீட்டும். மீதமுள்ள 3 இலக்கங்கள்
நாண்டு எண்களை நிரப்பலாம்

$$= 4 \times 4 \times 4 = 64.$$

(ii) ஒன்றாவது இலக்க எண்களின் கூடுதல்

$$\begin{aligned} &= (64 \times 0) + (64 \times 2) + (64 \times 5) + \\ &(64 \times 7) + (64 \times 8) \\ &= 64 (0 + 2 + 5 + 7 + 8) = 64 (22) \\ &= 14408. \end{aligned}$$

(iii) இதேபோன்று 10வது இலக்க எண்களின்
கூடுதல்

$$= 14408 \times 10 = 144080$$

(iv) 100வது இலக்க எண்களின்
கூடுதல்

$$= 14408 \times 100 = 1440800.$$

(v) 1000வது இலக்கத்தை விட
நிரப்பலாம் மீதமுள்ள 3 இலக்கங்கள்
மீட்டும் எண்களை நாண்டு நிரப்பலாம்

$$= 3 \times 3 \times 3 = 27.$$

எனவே 1000வது இலக்கங்களின்
எண்ணிக்கையை கூடுதல்

$$\begin{aligned} &= 27 (2 + 5 + 7 + 8) = 27 (22) \\ &\times 1000 \\ &= 594000. \end{aligned}$$

$\therefore$ மொத்த 4 இலக்க
எண்களின் கூடுதல்

$$\begin{aligned} &= 1408 + 14080 + 140800 \\ &+ 594000 \\ &= 1408 (1+10+100) + 59400 \\ &= 1408 (111) + 59400 \\ &= 750288. \end{aligned}$$

மயங்கி 4:3

1. $nC_{12} = nC_9$ எனில் $21C_n$ இல்
காண்க.

$$nC_x = nC_y$$

$$\Rightarrow x = y \text{ (அ) } x + y = n.$$

$$\therefore 12 + 9 = n.$$

$$\boxed{n = 21}$$

$$21C_n = 21C_{21} = 1.$$

(2) $15C_{2r-1} = 15C_{2r+4}$ எனில்
 r இல் காண்க.

$$(2r-1) + (2r+4) = 15$$

$$[\because nC_x = nC_y \Rightarrow x + y = n]$$

$$4r + 3 = 15$$

$$4r = 15 - 3$$

$$4r = 12$$

$$\boxed{r = 3}$$

3) $nPr = 720$ மற்றும் $nCr = 120$ எனில் n, r ஆகக் காண்க.

தீர்வு $nPr = \frac{n!}{(n-r)!} = 720$ - ①

$nCr = \frac{n!}{r!(n-r)!} = 120$ - ②

$\frac{②}{①} \Rightarrow \frac{\frac{n!}{r!(n-r)!}}{\frac{n!}{(n-r)!}} = \frac{120}{720}$

$\Rightarrow \frac{1}{r!} = \frac{120}{720}$

$\frac{6}{120} = r!$

$8! = 6 = 3 \times 2 \times 1$

$r! = 3!$

$\boxed{r = 3}$ ① ன் மரதிலு

$\frac{n!}{(n-3)!} = 720$

$n(n-1)(n-2)(n-3)! = 720$

$n(n-1)(n-2) = 10 \times 9 \times 8$

$\boxed{n = 10}$

4) நிறுத்த. $15C_3 + (2 \times 15C_4) + 15C_5 = 17C_5$

தீர்வு $15C_3 + (2 \times 15C_4) + 15C_5$
 $= 15C_3 + 15C_4 + 15C_4 + 15C_5$
 $= 16C_4 + 16C_5 \quad (nC_r + nC_{r-1} = n+1C_r)$
 $= 17C_5 = R.H.S.$

5) நிறுத்த. $35C_5 + \sum_{r=0}^4 (39-r)C_4 = 40C_5$

$35C_5 + 39C_4 + 38C_4 + 37C_4 + 36C_4$
 $+ 35C_4$
 $= (35C_5 + 35C_4) + (39C_4 + 38C_4)$
 $+ (37C_4 + 36C_4)$

$(\because nC_r + nC_{r-1} = n+1C_r)$
 $= (36C_5 + 36C_4) + 39C_4 + 38C_4$
 $+ 37C_4$
 $= (37C_5 + 37C_4) + 39C_4 + 38C_4$
 $= (38C_5 + 38C_4) + 39C_4$
 $= 39C_5 + 39C_4$
 $= 40C_5 = R.H.S.$

6) $(n+1)C_8 : (n-3)P_4 = 57 : 16$ எனில்

n ஆகக் காண்க.

நா. காமாட்சி, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D.
 முதுகலை ஆசிரியர் (கணிதம்)
 அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி
 கோலிந்தலாடி, காரைப்பேரம் (DT)

$\frac{(n+1)C_8}{(n-3)P_4} = \frac{57}{16}$

$16(n+1)C_8 = 57(n-3)P_4$

$\frac{16 \cdot \frac{(n+1)!}{8!(n+1-8)!}}{8!(n-3-4)!} = \frac{57(n-3)!}{(n-3-4)!}$

$\frac{16(n+1)!}{8!(n-7)!} = \frac{57(n-3)!}{(n-7)!}$

$16(n+1)n(n-1)(n-2)(n-3)! = 57 \times 8!(n-7)!$

$(n+1)n(n-1)(n-2) = \frac{57 \times 8!}{16}$

$= \frac{57 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{16}$

$= 3 \times 19 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3$

$= 21 \times 20 \times 19 \times 18$

$\boxed{n = 20}$

7) நிறுத்த. $2nC_n = \frac{2^n \times 1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{n!}$

தீர்வு $2nC_n = \frac{2n!}{n!(2n-n)!}$

13

நா. காமாட்சி, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2n!}{n! n!} \\
 &= \frac{(2n)(2n-1)(2n-2) \dots 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{n! n!} \\
 &= \frac{[(2n)(2n-2) \dots 4 \cdot 2] [(2n-1)(2n-3) \dots 3 \cdot 1]}{n! n!} \\
 &= \frac{2^n (n \cdot (n-1) \dots 2 \cdot 1) (1 \cdot 3 \dots (2n-1))}{n! n!} \\
 &= \frac{2^n \cdot n! (1 \times 3 \times \dots (2n-1))}{n! n!} \\
 &= \frac{2^n (1 \times 3 \times 5 \times \dots (2n-1))}{n!} \\
 &= R.H.S.
 \end{aligned}$$

8) $1 \leq r \leq n$ எனில்
 $n \times (n-1)C_{r-1} = (n-r+1) \times n C_r$
 என நிறுத்து.

தீர்வு

$$\begin{aligned}
 &n \times (n-1)C_{r-1} \\
 &= n \times \frac{(n-1)!}{(r-1)! (n-1-(r-1))!} \\
 &= n \times \frac{(n-1)!}{(r-1)! (n-r)!}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= n \times \frac{(n-1)!}{(r-1)! (n-r)!} \\
 &= n \times \frac{(n-1)!}{(r-1)! (n-r+1)(n-r)!} \\
 &= \frac{n!}{(r-1)! (n-r+1)!} \\
 &= (n-r+1) \cdot \frac{n!}{(r-1)! (n-r+1)!} \\
 &= (n-r+1) n C_{r-1} \\
 &= R.H.S.
 \end{aligned}$$

9) (i) ஒரு கம்பு மயங்கியுள்ள நிலையில் 14 மனை
 டுமட்டு வீரர்கள் மனைமட தயார் நின்று
 உள்ளனர். 7 மனைமட்டு வீரர்களைக்
 கொண்டு எத்தனை மையேறான
 குழுக்களை சிவன் அமைக்கலாம்?

தீர்வு 14 மனைமட்டு வீரர்களிடமிருந்து
 7 மனைமட்டு வீரர்களை குழுக்களாக
 அமைக்க முறை = $14 C_7$ வழிகள்

$$\begin{aligned}
 &= \frac{14!}{7! (14-7)!} = \frac{14!}{7! 7!} \\
 &= \frac{14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7!}{7! 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7} \\
 &= 3432.
 \end{aligned}$$

(ii) ஒரு விருந்தில் 15 பேர்கள் உள்ளனர்
 எந்த கிடை நபர்களைத் தேர்ந்தெடுக்க
 கூடுதலாகக் கொள்கிறார்கள் எனக்
 கொண்பன், சிந்த விருந்தில் எத்தனை
 கூடுதலாகக் கொள்கும்?

தீர்வு கூடுதலாகக் கொள்பவர்களின்
 எண்ணிக்கை = $15 C_2 = \frac{15 \times 14}{1 \times 2}$
 $= 105$

(iii) ஒரு வட்டத்தின் மீதுள்ள 20 புள்ளி-
 கள் வழியே எத்தனை நாண்களை
 வரைய முடியும்?

தீர்வு: ஒரு நாண் வரைய இரண்டு
 புள்ளிகள் தேவை.
 எடுத்த வழிகள் = $20 C_2$
 $= \frac{20 \times 19}{1 \times 2} = 190$

(iv) ஒரு வட்டம் நிறுத்தும் இடத்தில்
 ஒரு வட்ட மையம் மகிழ்ந்துகள்
 100 நிறுத்தப் பட்டுள்ளன. சிந்த
 மகிழ்ந்துகளை மாசு கட்டுமட்டுக்
 கிடைகள் எவ்வாறு எதிர்ப்படுகின்றன
 என்மறு சேதனை எதிர்ப்படுகின்றன
 5 மகிழ்ந்துகளைத் தேர்ந்தெடுக்க
 வேண்டும். எத்தனை மறுமகிழ்ந்து
 எடுத்த மகிழ்ந்துகளை தேர்ந்-
 தெடுக்கலாம்?

தீர்வு எடுத்த வழிகள் = $100 C_5$
 $= \frac{100 \times 99 \times 98 \times 97 \times 96}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5}$

$$= 451725120.$$

(v) 3 சிவன்கள், 2 மென்கள் மற்றும் 1 திருநங்கை சங்கையாங்களை 5 சிவன்கள், 2 மென்கள் மற்றும் 2 திருநங்கைகளில் இருந்து எத்தனை வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்?

தீர்வு மொத்த சிவன்கள் = 3
மென்கள் = 4

திருநங்கைகள் = 1.

$$\text{மொத்த வழிகள்} = {}^5C_3 \times {}^4C_2 \times {}^1C_1$$

$$= \frac{5 \times 4}{1 \times 2} \times \frac{4 \times 3}{1 \times 2} \times 2 = 120.$$

[6] கீழ்க்காணும் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை உள்ள கணங்களின் உட்கணங்களின் எண்ணிக்கையை காண்க.

தீர்வு $nC_0 + nC_1 + nC_2 + \dots + nC_n = 2^n$

(i) 4 உறுப்புகள்

$${}^4C_0 + {}^4C_1 + {}^4C_2 + {}^4C_3 + {}^4C_4$$

$$4 + 4 + \left(\frac{4 \times 3}{1 \times 2} \right) + 4 + 1$$

$$= 4 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16.$$

(ii) 5 உறுப்புகள்

$${}^5C_0 + {}^5C_1 + \dots + {}^5C_5 = 2^5$$

$$= 32$$

(ii) n உறுப்புகள்

$$nC_0 + nC_1 + nC_2 + \dots + nC_n = 2^n$$

(i) ஒரு சிறக்கட்டளையால் 25 உறுப்பினர் உள்ளனர் (i) இவர்களில் 3 அதிகாரிகளை எத்தனை வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்?

தீர்வு மொத்த வழிகள் = ${}^{25}C_3$
 $= \frac{25 \times 24 \times 23}{1 \times 2 \times 3} = 2300.$

(ii) ஒரு தலைவர், ஒரு உப தலைவர் மற்றும் ஒரு செயலரை எத்தனை வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்?

தீர்வு தேவையான வழிகள் = ${}^{25}P_3$
 $= 25 \times 24 \times 23 = 13800.$

12) ஒரு குழுவில் உள்ள 10 நபர்களில் ஒரு தலைவர் மற்றும் ஒரு செயலர் உள்ளடக்கி 6 நபர்களை எத்தனை வழிகளில் தேர்வு செய்யலாம்?

தீர்வு ஒரு குழுவில் ஒரு தலைவர் மற்றும் ஒரு செயலர் கிரண்டு பேர் கட்டாயம் இருக்க. வழிகள் ${}^{10}C_2$
மீதமுள்ள $10 - 2 = 8$ பேரில் 4 பேரை தேர்ந்தெடுக்கும் வழிகள் = 8C_4 .

தீர்வு: கர்மாட்சி, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D.
முதுகலை ஆசிரியர் (கணிதம்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி
கோலத்தூர், காள்கிராமம் (DT)

மொத்த வழிகள் = ${}^{10}C_2 \times {}^8C_4$
 $= \frac{10 \times 9}{1 \times 2} \times \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{1 \times 2 \times 3 \times 4}$
 $= 3150$ வழிகள்.

13) 12 மையவேறான 4த்தங்களில் 5 4த்தங்களை கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு எத்தனை வழிகளில் தேர்ந்தெடுக்கலாம்?

ய் கிரண்டு குறிப்பிட்ட 4த்தங்களை எம்மொகூலே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

தீர்வு மொத்தம் = 12
எம்மொகூலும் உள்ள 4த்தகம் = 2
மீதமுள்ள 4த்தகம் = $12 - 2 = 10.$

மீதி 3 4த்தகம் 10 நபருக்கு தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

தேவையான வழிகள் = ${}^{10}C_3$
 $= \frac{10 \times 9 \times 8}{1 \times 2 \times 3} = 120$ வழிகள்

(ii) கிரண்டு குறிப்பிட்ட 4த்தங்களை எம்மொகூலே தேர்ந்தெடுக்கக் கூடாது.

(15)

நா. காமாட்சி, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D.
முதுகலை ஆசிரியர் (கணிதம்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி
சோலித்தவாசுலாத்தூர் (DI)

$$\text{தேவையான ஷரீர்கள்} = 10C_5 \\ = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} = 252.$$

14) 5 ஆசிரியர்கள் மற்றும் 20 மாணவர்கள் களில் இருந்து 2 ஆசிரியர்கள் மற்றும் 3 மாணவர்களைக் கொண்டு ஒரு குழு அமைக்கப்படுகின்றது. எத்தனை ஷரீர்கள் கிடைக்கக்கூடியன? மேலும் கிடைக்கக்கூடிய ஷரீர்களைக் கொண்டு உட்பட எத்தனை குழுக்களைக் காணலாம்?

i) அக்குழுவினில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசிரியர் உள்ளவாறு.

$$\text{தேவையான ஷரீர்கள்} = 20C_3 \times 5C_2 \\ = \frac{20 \times 19 \times 18}{1 \times 2 \times 3} \times \frac{5 \times 4}{1 \times 2} = 11400.$$

அக்குழுவினில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசிரியர் இருந்தால்
= 1 ஆசிரியர் & 3 மாணவர்கள்

$$= 4C_1 \times 20C_3 \\ = \frac{4 \times 20 \times 19 \times 18}{3 \times 2 \times 1}$$

$$= 4560.$$

ii) அக்குழுவினில் குறிப்பிட்ட மாணவன் உட்படவாறு

$$\text{தேவையான ஷரீர்கள்} = 19C_3 \times 5C_2 \\ = \frac{19 \times 18 \times 17}{1 \times 2 \times 3} \times \frac{5 \times 4}{1 \times 2} = 9690.$$

15) ஒரு மாணவன் ஒரு தேர்வல் 9 வினாக்களில் 2 வினாக்களுக்கு கணக்கு விடைபயன்க்க வேண்டும். எந்த விடத்தையும் உடனே 5 வினாக்களுக்கு விடைபயன்க்க வேண்டும். எத்தனை ஷரீர்களில் அந்த வினாக்களுக்கு ஒரு மாணவன் விடைபயன்க்கலாம்?

$$\text{தீர்வு} \quad \text{மொத்த வினாக்கள்} = 9.$$

$$\text{கட்டாய வினாக்கள்} = 2.$$

$$\text{மீதமுள்ள வினாக்கள்(3)} = 9 - 2 = 7.$$

$$\text{மொத்த ஷரீர்கள்} = 7C_3 = \frac{7 \times 6 \times 5}{1 \times 2 \times 3} = 35.$$

16) 52 சீட்டுகள் கொண்ட ஒரு சீட்டுக் கட்டளையிலிருந்து 5 சீட்டுகளைத் தேர்வு செய்து, ஒவ்வொரு சீட்டிலும் எம்மாஜும் சேன்று ரஸிகன் உள்ளவாறு எத்தனை சீட்டிகள் கிடைக்கும் எனக் காண்க.

$$\text{தீர்வு} \quad \text{மொத்த சீட்டுகள்} = 52.$$

$$\text{ரஸிகனின் எண்ணிக்கை} = 4$$

$$\text{மீதமுள்ள சீட்டுகள்} = 48.$$

$$\text{தேவையான ஷரீர்கள்} \\ = 4C_3 \times 48C_2 \\ = \frac{4 \times 48 \times 47}{1 \times 2} = 4512$$

17) 7 இந்தியர்கள் மற்றும் 5 அமெரிக்கர்களில் இருந்து இந்தியர்கள் அதிக அளவில் கிடைக்கும்படியான 5 பேர்களைக் கொண்டு எத்தனை விதமான குழுக்களை அமைக்கலாம்?

தீர்வு	இந்தியர்கள்	அமெரிக்கர்கள்	குழு
4	1	${}^7C_4 \times {}^5C_1$	
3	2	${}^7C_3 \times {}^5C_2$	
5	0	${}^7C_5 \times {}^5C_0$	

$$\text{மொத்த ஷரீர்கள்} \\ = (7C_4 \times 5C_1) + (7C_3 \times 5C_2) \\ + (7C_5 \times 5C_0) \\ = \left[\frac{7 \times 6 \times 5}{1 \times 2 \times 3} \times 5 \right] + \left[\frac{7 \times 6 \times 5}{1 \times 2 \times 3} \times \frac{5 \times 4}{1 \times 2} \right] \\ + \left[\frac{7 \times 6 \times 5}{1 \times 2} \times 1 \right]$$

$$= 175 + 350 + 21$$

$$= 546.$$

18) 8 சிண்கள் மற்றும் 4 மெண்களில் இருந்து 7 பேர் கொண்ட குழு அமைக்கப் படுகின்றது. கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் அமைப்பை எத்தனை குழுக்களை அமைக்கலாம்?

1) சரியாக 3 மெண்கள் இருக்கோவா
தீர்வு: 9 மாத் சிண்கள் = 8

மொத்த மெண்கள் = 4.

தேவையான பேர்கள் = 7.

$$\text{தேவையான அங்கங்கள்} = 8C_4 \times 4C_3$$

$$= \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{1 \times 2 \times 3 \times 4} \times \frac{4 \times 3 \times 2}{1 \times 2 \times 3} = 280$$

2) குறைந்தபட்சம் 3 மெண்கள் இருக்கோவா.

தேவையான அங்கங்கள்

$$= (4C_3 \times 8C_4) + (4C_4 \times 8C_3)$$

$$= \left(4 \times \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{1 \times 2 \times 3 \times 4}\right) + \left(1 \times \frac{8 \times 7 \times 6}{1 \times 2 \times 3}\right)$$

$$= 280 + 56 = 336.$$

3) அதிகபட்சம் 3 மெண்கள் இருக்கோவா.

தேவையான அங்கங்கள்

$$= (8C_4 \times 4C_3) + (8C_5 \times 4C_2)$$

$$+ (8C_6 \times 4C_1) + (8C_7 \times 4C_0)$$

$$= \left[\frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{1 \times 2 \times 3 \times 4} \times 4\right] + \left(\frac{8 \times 7 \times 6}{1 \times 2 \times 3} \times \frac{4 \times 3}{1 \times 2}\right)$$

$$+ \left(\frac{8 \times 7}{1 \times 2} \times 4\right) + (8 \times 1)$$

$$= 280 + 336 + 112 + 8 = 736.$$

19) ஒரு சிண்கள் 4 மெண்கள் மற்றும் 3 சிண்கள் என 7 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். அவரது மனைவிகளை 3 மெண்கள் மற்றும் 4 சிண்கள் என 7 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். ஒரு கிரவு அருகிற் 3 மெண்கள் மற்றும் 3 சிண்கள் அழைக்கப் படுபவரது சிண்களை உறுப்பினர்கள் 3 பேர் மற்றும் அவரது மனைவியை உறுப்பினர்கள் 3 பேர் என்றவாறு அருகிற் கலந்து கொள்ள எத்தனை அங்கங்கள் அமைக்கலாம்?

தீர்வு:	H	W	H	W	H	W	H	W
மெண்கள்	0	3	1	2	2	1	3	0
சிண்கள்	3	0	2	1	1	2	0	3

தேவையான அங்கங்கள்

$$= (4C_3)(4C_3) + (4C_2)(3C_1)(3C_1)(4C_2)$$

$$+ (4C_1)(3C_2)(3C_2)(4C_1) + (3C_3)(3C_3)$$

$$= (4)C_4 + (6 \times 3 \times 3 \times 6) + (4 \times 3 \times 3 \times 4) + (1 \times 1)$$

$$= 16 + 324 + 144 + 1 = 485.$$

20) ஒரு மெட்யுயம் கிரண்டு வெள்ளம் பந்துகள், தின்று கருப்புப் பந்துகள் மற்றும் நான் கு சிவப்புப் பந்துகள் உள்ளன. மெட்யுயம் இருந்து தின்று பந்துகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் போது, சிவற்றின் குறைந்தபட்சம் ஒரு கருப்பு பந்து இருக்கோவா எத்தனை அங்கங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலாம்?

தீர்வு	வெள்ளம் பந்து (2)	கருப்பு பந்து (3)	சிவப்பு பந்து (4)
நா. காமாட்சி, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D.	2	1	0
முதுகலை ஆசிரியர் (கணிதம்)	0	1	2
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி	1	1	1
தேவையான அங்கங்கள்	1	2	0
	0	2	1
	0	3	0

தேவையான அங்கங்கள்

$$= (2C_2 \times 3C_1 \times 4C_0) + (2C_0 \times 3C_1 \times 4C_2)$$

$$+ (2C_1 \times 3C_1 \times 4C_1) + (2C_1 \times 3C_2 \times 4C_0)$$

$$+ (2C_0 \times 3C_2 \times 4C_1) + (2C_0 \times 3C_3 \times 4C_0)$$

$$= (1 \times 3 \times 1) + (1 \times 3 \times 6) + (2 \times 3 \times 4)$$

$$+ (2 \times 3 \times 1) + (1 \times 3 \times 4) + (1 \times 1 \times 1)$$

$$= 3 + 18 + 24 + 6 + 12 + 1$$

$$= 64 \text{ அங்கங்கள்.}$$

(17)

21) "EXAMINATION" என்ற அளத்தையின் உள்ள எழுத்துகளைக் கொண்டு எத்தனை 4 எழுத்துச் சரங்களை உருவாக்கலாம்?

தீர்வு எழுத்து எழுத்துக்கள் = 11

A → 2 இடங்கள், I → 2 இடங்கள்

N → 2 இடங்கள். வித்தியாசமானவை = 7

(i) A, I, N 2 இடங்கள் உருவாகும்.

2 இடங்கள், 2 இடங்கள் = 3C2

$$= \frac{3 \times 2}{1 \times 2} = 3$$

(ii) 2 இடங்கள், 2 இடங்கள் உருவாகும்

$$= 3C1 \times 7C2 = 3 \times \frac{7 \times 6}{1 \times 2} = 63$$

(iii) எல்லா மூலம் (4) வித்தியாசமானவை

$$= 8C4 = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5}{1 \times 2 \times 3 \times 4} = 70.$$

எழுத்து எழுத்துச் சரங்கள்

$$= 3 + 63 + 70 = 136.$$

22). எந்த சின்ன 4 அளத்தையும் ஒரே கோட்டில் அமைப்பதற்கு 15 அளத்தின் உள்ள எழுத்துகளைக் கொண்டு எத்தனை சரங்களை உருவாக்கலாம்?

தீர்வு ஒரு சரங்கை

அமைப்பது 3, ஒரே கோட்டில்

அமைப்பது 4 அளத்தின் தேவை.

$$\begin{aligned} \text{தேவையான அளத்தின்} &= 15C3 \\ &= \frac{15 \times 14 \times 13}{1 \times 2 \times 3} = 455 \end{aligned}$$

23) 15 அளத்தின் 7 அளத்தின் ஒரு கோட்டில் மற்ற 8 அளத்தின் மற்றொரு கோட்டில் அமைப்பதற்கு எத்தனை சரங்களை உருவாக்கலாம்?

தீர்வு ஒரு கோட்டில் உருவாகும் சரங்கின்

தேவையான அளத்தின்

$$\begin{aligned} &= (7C2 \times 8C1) + (7C1 \times 8C2) \\ &= \left(\frac{7 \times 6}{1 \times 2} \times 8 \right) + \left(7 \times \frac{8 \times 7}{1 \times 2} \right) \\ &= 168 + 196 = 364. \end{aligned}$$

24) ஒரு தளத்தில் 11 அளத்தின் உள்ள இவற்றில் 4 அளத்தின் தவிர மற்ற எந்த 3 அளத்தையும் ஒரே கோட்டில் அமைப்பதற்கு எத்தனை சரங்களை உருவாக்கலாம்?

தீர்வு (i) இவ்வுள்ளத்தில் ஒரு சரங்கை அளத்தின் உள்ள அமைப்பது கொடுக்க

ஒரு கோடு உருவாகும் இரண்டு அளத்தின் தேவை.

$$\begin{aligned} \text{தேவையான அளத்தின்} &= 11C2 \\ &= \frac{11 \times 10}{1 \times 2} = 55. \end{aligned}$$

4 அளத்தின் ஒரே கோட்டில் அமைப்பது உருவாகும்

$$= 4C2 = \frac{4 \times 3}{1 \times 2} = 6.$$

எழுத்து எழுத்துச் சரங்கள் = 55 - 6 + 1

$$= 50 \text{ அளத்தின்.}$$

(ii) இவ்வுள்ளத்தில் ஒரு கோட்டில் அமைப்பது கொடுக்கலாம்? தீர்வு ஒரு கோட்டில் உருவாகும் சரங்கின்

ஒரு கோட்டில் உருவாகும் (4)	தேவையான அளத்தின் (7)
4C1	7C2
4C2	7C1
4C3	7C3

$$\begin{aligned} \text{தேவையான அளத்தின்} &= (4C1 \times 7C2) \\ &+ (4C2 \times 7C1) + (4C3 \times 7C3) \end{aligned}$$

$$= \left(\frac{2}{4} \times \frac{7 \times 6}{1 \times 2} \right) + \left(\frac{2}{4} \times \frac{3}{1 \times 2} \times 7 \right)$$

$$+ \left(1 \times \frac{7 \times 6 \times 5}{1 \times 2 \times 3} \right)$$

$$= 84 + 42 + 35 = 161 \text{ மதிப்பு.}$$

25) 90 சீமை மட்டங்கள் கொண்டு
மல கொணர்த்தித் தாத்தனை
மக்களின் உண்மை?

தீர்மானம் n மக்களின் கொணர்
மல கொணர்த்தித் தாத்தனை
கொணர் தாத்தனைக் கொணர் $= \frac{n(n-3)}{2}$

$$\frac{n(n-3)}{2} = 90$$

$$n^2 - 3n = 180$$

$$n^2 - 3n - 180 = 0$$

$$(n-15)(n+12) = 0$$

$$n = 15 \text{ (அ)} \quad n = -12 \text{ (சொத்தியல்பற்றாது)}$$

$\therefore$ சீமைமல மக்களின்
தாத்தனைக் கொணர் 90.

மயங்கி 4'4

1. கணிதத் தொகுத்தித் தாத்தனை
 $n \geq 1$ க்கு
 $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$
தாத்தனைக் கொணர்.

$$\text{தீர்மானம் } P(n): 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 = (k+1)^2 \left(\frac{(k+2)}{2} \right)^2$$

$$\text{ii) } n=1 \quad P(1): 1^3 = \left(\frac{1(1+1)}{2} \right)^2$$

$$1 = \left[\frac{1(2)}{2} \right]^2$$

$$1 = 1.$$

$P(1)$ உண்மை

iii) $P(k)$ உண்மை தாத்தனைக் கொணர்.

$$1^3 + 2^3 + \dots + k^3 = \left(\frac{k(k+1)}{2} \right)^2 \quad \text{--- (1)}$$

iv) $P(k+1)$ உண்மை தாத்தனைக் கொணர்
தாத்தனைக் கொணர்

$$(1+2) \quad 1^3 + 2^3 + \dots + k^3 + (k+1)^3 = \left(\frac{(k+1)(k+2)}{2} \right)^2$$

$$\text{LHS} \quad 1^3 + 2^3 + \dots + k^3 + (k+1)^3$$

$$= \left(\frac{k(k+1)}{2} \right)^2 + (k+1)^3$$

$$= (k+1)^2 \left[\frac{k^2}{4} + (k+1) \right]$$

$$= (k+1)^2 \left[\frac{k^2 + 4k + 4}{4} \right]$$

தீர்மானம், M.Sc. B.Ed. M.Phil. Ph.D.
முதுகலை ஆசிரியர் (கணிதம்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி
கோவிலத்தூர், காரைக்கலை

$P(k+1)$ உண்மை.

$\therefore$ கணிதத் தொகுத்தித் தாத்தனைக் கொணர்
மல $P(n)$ என் n க்கு உண்மை.

2) கணிதத் தொகுத்தித் தாத்தனைக் கொணர்
 $n \geq 1$ க்கு $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$
தாத்தனைக் கொணர்.

$$\text{தீர்மானம் } P(n): 1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}$$

$$n=1 \quad P(1): 1^2 = \frac{1(2-1)(2+1)}{3}$$

$$1 = 1$$

$P(1)$ உண்மை

$P(k)$ உண்மை தாத்தனைக் கொணர்.

$$1^2 + 3^2 + \dots + (2k-1)^2 = \frac{k(2k-1)(2k+1)}{3}$$

$P(k+1)$ உண்மை தாத்தனைக் கொணர்

$$1^2 + 3^2 + \dots + (2k-1)^2 + (2(k+1)-1)^2 = \frac{(k+1)(2(k+1)-1)(2(k+1)+1)}{3}$$

(14)

$$(ie) 1^2 + 3^2 + \dots + (2k-1)^2 + (2k+1)^2$$

$$= \frac{(k+1)(2k+1)(2k+3)}{3}$$

$$\text{LHS:- } 1^2 + 3^2 + \dots + (2k-1)^2 + (2k+1)^2$$

$$= \frac{k(2k-1)(2k+1)}{3} + (2k+1)^2$$

$$= \frac{k(2k-1)(2k+1) + 3(2k+1)^2}{3}$$

$$= \frac{(2k+1)[2k^2 - k + 3(2k+1)]}{3}$$

$$= \frac{(2k+1)(2k^2 - k + 6k + 3)}{3}$$

$$= \frac{(2k+1)(2k^2 + 5k + 3)}{3}$$

$$= \frac{(2k+1)(k+1)(2k+3)}{3}$$

$$= \text{RHS}$$

$P(k+1)$ உணர்தல் உண்மை

கண்காணித்த தகவல்களின் மூலம் $P(n)$ என்பது இயல்பு எண்களாகும் உண்மை.

3) கீழ்க்கண்டவற்றை முதல் n இரட்டை எண்களின் கூடுதல் $n^2 + n$ என இருபடிக்க.

தீர்வு $P(n): n^2 + n$. இரட்டை எண்

$$n=1, \quad 2(1) = 1^2 + 1$$

$$2 = 1 + 1 = 2$$

$P(1)$ உணர்தல் உண்மை.

$P(k)$ உண்மை எனக் கொள்ள

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2k = k^2 + k \quad \text{--- (1)}$$

$P(k+1)$ உண்மை என இருபடிக்க வேண்டும்

$$2 + 4 + 6 + \dots + 2k + 2(k+1) = (k+1)^2 + (k+1)$$

$$= (k+1)[k+1+1] = (k+1)(k+2)$$

$$\text{LHS } 2 + 4 + 6 + \dots + 2k + (2k+2)$$

$$= k^2 + k + 2k + 2$$

$$= k(k+1) + 2(k+1)$$

$$= (k+1)(k+2) = \text{RHS}$$

$P(k+1)$ உணர்தல் உண்மை.

கண்காணித்த தகவல்களின் மூலம் $P(n)$

என்பது இயல்பு எண்களாகும் உண்மை.

4) கண்காணித்த தகவல்களின் மூலம்

$$n \geq 1 \text{ க்கு } 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1)$$

$$= \frac{n(n+1)(n+2)}{3} \text{ என இருபடிக்க}$$

தீர்வு:- $P(n):$

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$n=1.$$

$$P(1): \quad 1(1+1) = \frac{1(1+1)(1+2)}{3}$$

$$2 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3}$$

$$2 = 2$$

$P(1)$ உணர்தல் உண்மை

$P(k)$ உண்மை எனக் கொள்ள

$$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + k(k+1)$$

$$= \frac{k(k+1)(k+2)}{3} \quad \text{--- (1)}$$

$P(k+1)$ உண்மை என இருபடிக்க

$$(1) 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + k(k+1)$$

$$+ (k+1)(k+2) = \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{3}$$

$$\text{LHS } 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + \dots + k(k+1) + (k+1)(k+2)$$

$$= \frac{k(k+1)(k+2)}{3} + \frac{(k+1)(k+2)}{1}$$

$$= (k+1)(k+2) \left(\frac{k}{3} + 1 \right)$$

$$= (k+1)(k+2) \left(\frac{k+3}{3} \right)$$

$$= \text{RHS}$$

$P(k+1)$ உணர்தல் உண்மை.

கண்காணித்த தகவல்களின் மூலம் $P(n)$

என்பது இயல்பு எண்களாகும் உண்மை.

$P(n)$ உணர்தல் உண்மை.

5. கண்காணித்த தகவல்களின் மூலம்

மயணிப்படுத்தி $n \geq 2$ எனக் கொள்ள

எந்த இயல்பு எண்ணாகும்

$$\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

$$= \frac{n+1}{2n} \text{ என இருபடிக்க}$$

தரவு $P(n): (1 - \frac{1}{2^2})(1 - \frac{1}{3^2}) \dots (1 - \frac{1}{n^2})$

$$= \frac{n+1}{2n}$$

$n=2$

$$P(2): 1 - \frac{1}{2^2} = \frac{2+1}{2(2)}$$

$$1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{3}{4}$$

$P(2)$ சரிபார்க்க.

$P(k)$ சரிபார்க்க என்னக் கொள்க.

$$(1 - \frac{1}{2^2})(1 - \frac{1}{3^2}) \dots (1 - \frac{1}{k^2}) = \frac{k+1}{2k+2}$$

$P(k+1)$ சரிபார்க்க என்னக் கொள்க

$$(1 - \frac{1}{2^2})(1 - \frac{1}{3^2}) \dots (1 - \frac{1}{k^2})(1 - \frac{1}{(k+1)^2}) = \frac{k+2}{2(k+1)+2} = \frac{k+3}{2k+4}$$

LHS

$$(1 - \frac{1}{2^2})(1 - \frac{1}{3^2}) \dots (1 - \frac{1}{k^2})(1 - \frac{1}{(k+1)^2})$$

$$= \frac{k+2}{2k+2} (1 - \frac{1}{(k+1)^2})$$

$$= \frac{k+2}{2k+2} \left(\frac{(k+1)^2 - 1}{(k+1)^2} \right)$$

$$= \frac{(k+2)}{2k+2} \left(\frac{k^2 + 4k + 4 - 1}{(k+1)^2} \right)$$

$$= \frac{k^2 + 4k + 3}{2(k+1)(k+2)} = \frac{(k+3)(k+1)}{2(k+1)(k+2)}$$

$$= \frac{k+3}{2(k+2)} = RHS.$$

$P(k+1)$ சரிபார்க்க என்னக் கொள்க

கணிதத் தொகுத்தறிதல் விதிப்படி $P(n)$ என்க இயல் என்னக் கொள்க $P(k)$ சரிபார்க்க என்னக் கொள்க.

b) கணிதத் தொகுத்தறிதல் படிப்படி $n \geq 2$ எனக் கொண்டு எந்த ஒரு இயல் எண்ணுக்கும்.

$$\frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \frac{1}{1+2+3+4} + \dots + \frac{1}{1+2+3+\dots+n}$$

$$= \frac{(n-1)}{n+1} \text{ எனக் கொள்க.}$$

நிபுட்க

$$n=2 \quad \frac{1}{1+2} = \frac{2-1}{2+1}$$

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

$P(2)$ சரிபார்க்க என்னக் கொள்க

$P(k)$ சரிபார்க்க

$$\frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \dots + \frac{1}{1+2+3+\dots+(k+1)} = \frac{k}{k+2}$$

$P(k+1)$ சரிபார்க்க என்னக் கொள்க

$$\frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \dots + \frac{1}{1+2+3+\dots+(k+1)}$$

$$+ \frac{1}{1+2+3+\dots+(k+2)} = \frac{k+1}{k+3}$$

LHS

$$\frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \dots + \frac{1}{1+2+3+\dots+(k+1)}$$

$$+ \frac{1}{1+2+3+\dots+(k+2)}$$

$$= \frac{k}{k+2} + \frac{1}{(1+2+3+\dots+(k+2))}$$

$$= \frac{k}{k+2} + \frac{1}{\frac{(k+2)(k+3)}{2}}$$

$$= \frac{k}{k+2} + \frac{2}{(k+2)(k+3)}$$

$$= \frac{1}{(k+2)} \left(k + \frac{2}{k+3} \right)$$

$$= \frac{1}{k+2} \left(\frac{k^2 + 3k + 2}{k+3} \right)$$

$$= \frac{1}{(k+2)} \frac{(k+2)(k+1)}{(k+3)}$$

$$= \frac{(k+1)}{(k+3)} = RHS.$$

நா. காமாட்சி, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D.
முதுகலை ஆசிரியர் (கணிதம்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி
கோலிந்தவாடி, காஞ்சிபுரம் (DT)

(21)

$P(k+1)$ உணர்து உண்மை

கணித தொகுத்தறிதல் விதிப்படி

$P(n)$ உணர்து n ன் என்ன
இயல் எண்களுக்கும் உண்மை.

7) கணிதத் தொகுத்தறிதலைப்
மயன்மத்தி எந்த ஒரு இயல்
எண் n -க்கும்

$$\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

$$= \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$$

என நிரூபிக்க.

தீர்வு

$$n=1 \quad P(1): \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{1(4)}{4(2)(3)}$$

$1=1$

$P(1)$ உணர்து உண்மை

$n=k$. $P(k)$ உண்மை எனக்
தொள்க.

$$\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$$

$$= \frac{k(k+3)}{4(k+1)(k+2)}$$

$P(k+1)$ உண்மை என நிரூபிக்க
வேண்டும்.

$$\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{k(k+1)(k+2)}$$

$$+ \frac{1}{(k+1)(k+2)(k+3)}$$

$$= \frac{(k+1)(k+4)}{4(k+2)(k+3)}$$

$$\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{k(k+1)(k+2)} +$$

$$\frac{1}{(k+1)(k+2)(k+3)}$$

$$= \frac{k(k+3)}{4(k+1)(k+2)} + \frac{1}{(k+1)(k+2)(k+3)}$$

$$= \frac{1}{(k+1)(k+2)} \left[\frac{k(k+3)}{4} + \frac{1}{k+3} \right]$$

$$= \frac{1}{(k+1)(k+2)} \left[\frac{k(k+3)^2 + 1}{4(k+3)} \right]$$

$$= \frac{1}{(k+1)(k+2)} \left[\frac{k(k^2 + 6k + 9) + 1}{4(k+3)} \right]$$

$$= \frac{1}{(k+1)(k+2)} \left[\frac{k^3 + 6k^2 + 9k + 1}{4(k+3)} \right]$$

$$= \frac{(k+1)(k+4)}{4(k+1)(k+2)(k+3)}$$

$$= \frac{(k+1)(k+4)}{4(k+2)(k+3)} = R.H.S.$$

$P(k+1)$ உணர்து உண்மை
கணித தொகுத்தறிதல் விதிப்படி
 $P(n)$ உணர்து n ன் என்ன இயல்
எண்களுக்கும் உண்மையாகும்.

8) கணிதத் தொகுத்தறிதலைப்
மயன்மத்தி எந்த ஒரு இயல்
எண் n -க்கும் $\frac{1}{2 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 8} + \frac{1}{8 \cdot 11} + \dots$

$$+ \frac{1}{(3n-1)(3n+2)} = \frac{n}{6n+4}$$

என நிரூபிக்க.

$$\frac{1}{2 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 8} + \frac{1}{8 \cdot 11} + \dots + \frac{1}{(3n-1)(3n+2)}$$

$$= \frac{n}{6n+4}$$

$$n=1 \quad \frac{1}{2 \cdot 5} = \frac{1}{6(1)+4}$$

$$\frac{1}{2 \cdot 5} = \frac{1}{10} = \frac{1}{2 \cdot 5}$$

$P(1)$ உணர்து உண்மை.
 $n=k$ உண்மை எனக் தொள்க.

$$\frac{1}{2 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 8} + \dots + \frac{1}{(3k-1)(3k+2)} = \frac{k}{6k+4}$$

$P(k+1)$ உண்மை எனக் தொள்க.

$$\frac{1}{2 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 8} + \dots + \frac{1}{(3k-1)(3k+2)} +$$

$$\frac{1}{(3(k+1)-1)(3(k+1)+2)} = \frac{(k+1)}{6(k+1)+4}$$

$$= \frac{k+1}{6k+10}$$

மா. காமராட்சி, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D.
முதுகலை ஆசிரியர் (கணிதம்)
திரைக் மேல்நிலைப்பள்ளி
கோயிலத்தூர், கரஞ்சிரம் (Dt)

$$\begin{aligned}
 \text{LHS: } & \frac{1}{2 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 8} + \dots + \frac{1}{(3k-1)(3k+2)} + \frac{1}{(3k+2)(3k+5)} \\
 &= \frac{k}{6k+4} + \frac{1}{(3k+2)(3k+5)} \\
 &= \frac{k}{2(3k+2)} + \frac{1}{(3k+2)(3k+5)} \\
 &= \frac{1}{(3k+2)} \left[\frac{k}{2} + \frac{1}{3k+5} \right] \\
 &= \frac{1}{(3k+2)} \left[\frac{3k^2 + 5k + 2}{2(3k+5)} \right] \\
 &= \frac{1}{(3k+2)} \frac{(3k+2)(k+1)}{2(3k+5)} \\
 &= \frac{k+1}{6k+10} = \text{RHS}
 \end{aligned}$$

$P(k+1)$ இணங்கு உண்மை.
 எனில் கீழ்க்கண்ட 'n' க்கு
 $P(n)$, கண்காணகத்திற்கு
 உத்தரவு உண்மையாகிறது.

9) கண்காணகத்திற்கு உத்தரவு
 $1! + (2 \times 2!) + (3 \times 3!) + \dots + (n \times n!) = (n+1)! - 1$
 என நிரூபிக்க.

தீர்வு $n=1$ $1! = (1+1)! - 1$

$$1 = 2! - 1 = 2 - 1 = 1$$

$1 = 1$
 $P(1)$ இணங்கு உண்மை.

ii) $P(k)$ உண்மை எனக் கொள்க.

$$1! + (2 \times 2!) + \dots + (k \times k!) = (k+1)! - 1.$$

iii) $P(k+1)$ உண்மை என நிரூபிக்க.

$$1! + (2 \times 2!) + \dots + (k \times k!) + [(k+1) \times (k+1)!] = (k+2)! - 1.$$

$$\begin{aligned}
 \text{LHS } & 1! + (2 \times 2!) + \dots + (k \times k!) + [(k+1) \times (k+1)!] \\
 &= ((k+1)! - 1) + [(k+1) \times (k+1)!] \\
 &= (k+1)! [1 + k+1] - 1 \\
 &= (k+1)! (k+2) - 1 \\
 &= (k+2)! - 1 = \text{RHS}
 \end{aligned}$$

$P(k+1)$ இணங்கு உண்மை

கண்காணகத்திற்கு உத்தரவு
 நன் எனக் கொள் கியல் எண்கள்க்கு
 $P(n)$ இணங்கு உண்மையாகிறது.

10) கண்காணகத்திற்கு உத்தரவு
 $x^n - y^n$ இணங்கு $x+y$ இன் உருபம்
 என நிரூபிக்க.

தீர்வு $x^n - y^n$ இணங்கு $(x+y)$ இன்
 உருபம்

i) $n=1$

$$x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$$

இது $(x+y)$ இன் உருபம்

$P(1)$ இணங்கு உண்மை

ii) $P(k)$ உண்மை எனக் கொள்க

$$x^{2k} - y^{2k} = m(x+y) \quad \text{--- (1)}$$

iii) $P(k+1)$ உண்மை என நிரூபிக்க

$$\begin{aligned}
 & x^{2(k+1)} - y^{2(k+1)} \\
 &= x^{2k+2} - y^{2k+2} \\
 &= x^{2k} \cdot x^2 - (y^{2k} \cdot y^2) \\
 &= (x^{2k} + m(x+y)) \cdot x^2 - (y^{2k} + m(x+y)) \cdot y^2 \\
 &= x^2 x^{2k} + m x^2 (x+y) - y^2 y^{2k} - m y^2 (x+y) \\
 &= x^2 (x^{2k} - y^{2k}) + m x^2 (x+y) - m y^2 (x+y) \\
 &= x^2 (x^{2k} - y^{2k}) + m x^2 (x+y) - m y^2 (x+y) \\
 &= (x+y) [x^{2k} (x-y) + m x^2] \\
 & \text{இது } (x+y) \text{ இன் உருபம்} \\
 & P(k+1) \text{ இணங்கு உண்மை}
 \end{aligned}$$

நா. காமாட்சி, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D.
 முதுகலை ஆசிரியர் (கணிதம்)
 அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி
 கோலிந்தவாடி, காஞ்சிபுரம் (TN)

கணிதத் தொகுத்தறிதல் உதவிப்பு
என்பா கியல் எண் n ற்கு
 $P(n)$ சான்று உண்மையாகிறது.

12) கணிதத் தொகுத்தறிதல் தொண்டியல்
மய $n \geq 1$ க்கு $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 > n^3/3$
என நிரூபிக்க.

தீர்வு $n=1$. $1^2 > \frac{1^3}{3}$

$1 > \frac{1}{3}$ சித்த உண்மை

$P(1)$ சான்று உண்மை

$P(k)$ உண்மை எனக் கொள்க
 $1^2 + 2^2 + \dots + k^2 > k^3/3$.

$P(k+1)$ உண்மை என நிரூபிக்க
வேண்டுமே
 $1^2 + 2^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2 > \frac{(k+1)^3}{3}$.

LHS $1^2 + 2^2 + \dots + k^2 + (k+1)^2$
 $> \frac{k^3}{3} + (k+1)^2$

$= \frac{k^3 + 3(k^2 + 2k + 1)}{3}$

$= \frac{k^3 + 3k^2 + 6k + 3}{3}$

$= \frac{(k+1)^3}{3}$

$P(k+1)$ சான்று உண்மை.

கணிதத் தொகுத்தறிதல் உதவிப்பு
என்பா கியல் எண் n ற்கு $P(n)$
சான்று உண்மையாகிறது.

12) தொகுத்தறிதல் மயன் படுத்த
என்பா கியல் எண்கள் n க்கு
 $n^3 - 7n + 3$ சான்று 3 சின்ன வகுபடு
என நிரூபிக்க.

தீர்வு $n=1$.

$1^3 - 7(1) + 3 = 1 - 7 + 3 = -3$

இது 3 சின்ன வகுபடு

$P(1)$ சான்று உண்மை

$P(k)$ உண்மை என எடுத்துக்கொள்க.

$k^3 - 7k + 3 = 3m$. — ①.

$P(k+1)$ உண்மை என நிரூபிக்க
வேண்டுமே.

$(k+1)^3 - 7(k+1) + 3$

$= k^3 + 3k^2 + 3k + 1 - 7k - 7 + 3$

$= (k^3 - 7k + 3) + (3k^2 + 3k - 6)$

$= 3m + 3(k^2 + k - 2)$

இது 3 சின்ன வகுபடு.

$P(k+1)$ சான்று உண்மை

$\therefore$ கணிதத் தொகுத்தறிதல் உதவிப்பு
என்பா கியல் எண்களுக்கு n ற்கு
 $P(n)$ உண்மையாகிறது.

13) தொகுத்தறிதல் மயன் படுத்த
என்பா கியல் எண்கள் n க்கு
 $5^{n+1} + 4 \times 6^n$ இது 20 சின்ன வகுக்க
கிடைக்கும் மீதி 9 என நிரூபிக்க.
தீர்வு $n=1$

$5^{1+1} + (4 \times 6^1) = 5^2 + 24$

$= 25 + 24 = 49 = 2(20) + 9$.

மீதி 9 கிடைக்கிறது

$\therefore P(1)$ உண்மையாகிறது

$P(k)$ உண்மை எனக் கொள்க.

$5^{k+1} + (4 \times 6^k)$ இது 20 சின்ன
வகுத்தால் மீதி 9 கிடைக்கும்

$5^{k+1} + (4 \times 6^k) = m(20) + 9$

$5^{k+1} = 20m + 9 - 4(6^k)$ — ①

$P(k+1)$ உண்மை என நிரூபிக்க
வேண்டுமே

$5^{k+2} + (4 \times 6^{k+1})$

$5^{k+1} \cdot 5 + 4 \cdot (6^k \cdot 6)$

$= [20m + 9 - 4(6^k)] \cdot 5 + 24(6^k)$

$= 20m + 9 - 4(6^k) + 24(6^k)$

$= 20m + 9 + 20(6^k)$

$= 20(m + 6^k) + 9$

→ 10 மில் உடுத்தால் மதி 9 கிடைக்கும்
 $P(k+1)$ உண்மை உண்மை
 கணித தொகுத்தறிதன் வரிப்படி
 $P(n)$, சரிவா கியல் எண்கள்க்கும்
 'n' ிற்கும் உண்மை யாகும்.

14) தொகுத்தறிலைப் பயன்படுத்தி
 எல்லா கியல் எண்கள் n க்கும்
 $10^n + (3 \times 4^{n+2}) + 5$ ஆனால் 9 ஆல்
 உகுமல் என நிரூபிக்க.

தீர்வு $n=1$
 $10^1 + (3 \times 4^3) + 5 = 10 + 3(64) + 5$
 $= 207$ இது 9 ஆல் உகுமல்
 $P(1)$ உண்மை.

(ii) $P(k)$ உண்மை எனக் கொள்க.
 $10^k + (3 \times 4^{k+2}) + 5$ 9 ஆல்
 உகுமல். $10^k = 9m - (3 \times 4^{k+2}) - 5$

(iii) $P(k+1)$ உண்மை என நிரூபிக்க
 வேண்டும்.

$$\begin{aligned} & 10^{k+1} + (3 \times 4^{k+3}) + 5 \\ &= 10^k \cdot 10 + (3 \cdot 4^{k+2}) \cdot 4 + 5 \\ &= 10(9m - 5 - 3 \times 4^{k+2}) + 12 \cdot 4^{k+2} + 5 \\ &= 90m - 50 - 30 \cdot 4^{k+2} + 12 \cdot 4^{k+2} + 5 \\ &= 90m - 45 - 18(4^{k+2}) \end{aligned}$$

$$= 9 [10m - 5 - 2(4^{k+2})]$$

இது 9 ஆல் உகுமல்.
 கணித தொகுத்தறிதன் வரிப்படி
 n ன் எல்லா கியல் எண்கள்க்கும்
 $P(n)$ ஆனால் உண்மை.

15) கணிதத் தொகுத்தறிதன் வரிப்படி
 $\sin \alpha + \sin(\alpha + \frac{\pi}{6}) + \sin(\alpha + \frac{2\pi}{6}) + \dots + \sin(\alpha + \frac{(n-1)\pi}{6}) = \frac{\sin \alpha + \frac{(n-1)\pi}{12}}{\sin \frac{\pi}{12}} \cdot \sin \frac{n\pi}{12}$

தீர்வு $n=1$.

$$\sin \alpha = \frac{\sin \alpha \sin \frac{\pi}{12}}{\sin \frac{\pi}{12}} = \sin \alpha$$

$P(1)$ ஆனால் உண்மை.

(i) $P(k)$ உண்மை எனக் கொள்க

$$\sin \alpha + \sin(\alpha + \frac{\pi}{6}) + \dots + \sin(\alpha + \frac{(k-1)\pi}{6}) = \frac{\sin(\alpha + \frac{(k-1)\pi}{12})}{\sin \frac{\pi}{12}} \cdot \sin \frac{k\pi}{12}$$

(ii) $P(k+1)$ உண்மை என நிரூபிக்க வேண்டும்.

$$\sin \alpha + \sin(\alpha + \frac{\pi}{6}) + \dots + \sin(\alpha + \frac{(k-1)\pi}{6}) + \sin(\alpha + \frac{k\pi}{6}) = \frac{\sin(\alpha + \frac{k\pi}{12})}{\sin \frac{\pi}{12}} \cdot \sin \frac{(k+1)\pi}{12}$$

$$\text{LHS} \sin \alpha + \sin(\alpha + \frac{\pi}{6}) + \dots + \sin(\alpha + \frac{(k-1)\pi}{6}) + \sin(\alpha + \frac{k\pi}{6})$$

$$= \frac{\sin(\alpha + \frac{(k-1)\pi}{12})}{\sin \frac{\pi}{12}} \cdot \sin \frac{k\pi}{12} + \sin(\alpha + \frac{k\pi}{6})$$

$$= \frac{1}{\sin \frac{\pi}{12}} \left[\sin(\alpha + \frac{k\pi}{12} - \frac{\pi}{12}) \cdot \sin \frac{k\pi}{12} + \sin(\alpha + \frac{k\pi}{6}) \right]$$

$$= \frac{1}{\sin \frac{\pi}{12}} \left[\left(\sin(\alpha + \frac{k\pi}{12}) \cos \frac{\pi}{12} - \cos(\alpha + \frac{k\pi}{12}) \sin \frac{\pi}{12} \right) \sin \frac{k\pi}{12} + \sin(\alpha + \frac{k\pi}{6}) \right]$$

$$\therefore \sin(A-B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B.$$

$$= \frac{1}{\sin \frac{\pi}{12}} \left[(\sin(\alpha + \frac{k\pi}{12}) \cos \frac{\pi}{12} \sin \frac{k\pi}{12} - \cos(\alpha + \frac{k\pi}{12}) \sin \frac{k\pi}{12} \sin \frac{\pi}{12}) + \sin(\alpha + \frac{k\pi}{6}) \sin \frac{\pi}{12} \right]$$

கிரைஸ் உதயன் டிஜிட்டுவாக்கி உருக்க.

$$= \frac{1}{\sin \frac{\pi}{12}} \left[(\sin(\alpha + \frac{k\pi}{12}) \cos \frac{\pi}{12} \sin \frac{k\pi}{12}) + \frac{\sin \frac{\pi}{12}}{2} \left[2 \sin(\alpha + \frac{k\pi}{6}) \sin \frac{k\pi}{12} \right] \right]$$

$$= \frac{1}{\sin \frac{\pi}{12}} \left[(\sin(\alpha + \frac{k\pi}{12}) \cos \frac{\pi}{12} \sin \frac{k\pi}{12}) + \frac{\sin \frac{\pi}{12}}{2} \left[2 \sin(\alpha + \frac{k\pi}{6}) - [\sin(\alpha + \frac{k\pi}{12} + \frac{k\pi}{12}) - \sin(\alpha + \frac{k\pi}{12} - \frac{k\pi}{12})] \right] \right]$$

$$= \frac{1}{\sin \frac{\pi}{12}} \left[(\sin(\alpha + \frac{k\pi}{12}) \cos \frac{\pi}{12} \sin \frac{k\pi}{12}) + \frac{\sin \frac{\pi}{12}}{2} \left[2 \sin(\alpha + \frac{k\pi}{6}) - \sin(\alpha + \frac{k\pi}{6}) + \sin \alpha \right] \right]$$

$$= \frac{1}{\sin \frac{\pi}{12}} \left[(\sin(\alpha + \frac{k\pi}{12}) \cos \frac{\pi}{12} \sin \frac{k\pi}{12}) + \frac{\sin \frac{\pi}{12}}{2} (\sin(\alpha + \frac{k\pi}{6}) + \sin \alpha) \right]$$

$$= \frac{1}{\sin \frac{\pi}{12}} \left[\sin(\alpha + \frac{k\pi}{12}) \cos \frac{\pi}{12} \sin \frac{k\pi}{12} + \frac{\sin \frac{\pi}{12}}{2} (2 \sin(\frac{\alpha + \frac{k\pi}{6} + \alpha}{2}) \cos(\frac{\alpha + \frac{k\pi}{6} - \alpha}{2})) \right]$$

$$\because \sin C + \sin D = 2 \sin\left(\frac{C+D}{2}\right) \cos\left(\frac{C-D}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{\sin \frac{\pi}{12}} \left[\sin(\alpha + \frac{k\pi}{12}) \cos \frac{\pi}{12} \sin \frac{k\pi}{12} + \sin \frac{\pi}{12} \sin(\alpha + \frac{\pi}{12}) \cos \frac{k\pi}{12} \right]$$

நா. காமாட்சி, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D.
முதுகலை ஆசிரியர் (கணிதம்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி
கோவிந்தவாடி, காஞ்சிபுரம் (Dt)

$$= \frac{1}{\sin \frac{\pi}{12}} \sin(\alpha + \frac{k\pi}{12}) \left[\cos \frac{\pi}{12} \sin \frac{k\pi}{12} + \sin \frac{\pi}{12} \cos \frac{k\pi}{12} \right]$$

$$= \frac{\sin(\alpha + \frac{k\pi}{12}) \sin(k+1)\frac{\pi}{12}}{\sin \frac{\pi}{12}} \because \sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$$

= R.H.S.

P(k+1) க்கு உண்மை

$\therefore$ கணித உதாஹரணம் மூலம் P(n) உண்மை எனக் கொள்ளலாம்.

Formula

$$1. n! = n(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

$$2) n! = n(n-1)!$$

$$3) 0! = 1, 1! = 1$$

$$4) nPr = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$5) nCr = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$$6) nCx = nCy \Rightarrow x = y \text{ (or) } x+y = n$$

$$7) nCr = \frac{nPr}{r!}$$

நா. காமாட்சி, M.Sc., B.Ed., M.Phil., Ph.D.
முதுகலை ஆசிரியர் (கணிதம்)
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி
கோவிந்தவாடி, காஞ்சிபுரம் (Dt)

மாதிரி 5: 1. ௫-வது தரத்திலிருந்து, ௧௦-வது தரத்திற்கு வரையில் உள்ள எல்லா எண்களும்.

மாதிரி 5-1

$$1) (i) \left(2x^2 - \frac{3}{x}\right)^3$$

$$= {}^3C_0 (2x^2)^3 - {}^3C_1 (2x^2)^2 \left(\frac{3}{x}\right)^1 + {}^3C_2 (2x^2)^1 \left(\frac{3}{x}\right)^2 - {}^3C_3 \left(\frac{3}{x}\right)^3$$

$$= (1)(8x^6) - 3(4x^4)\left(\frac{3}{x}\right) + 3(2x^2)\left(\frac{9}{x^2}\right) - 1\left(\frac{27}{x^3}\right)$$

$$= 8x^6 - 36x^3 + 54 - \frac{27}{x^3}$$

$$(ii) (2x^2 - 3\sqrt{1-x^2})^4 + (2x^2 + 3\sqrt{1-x^2})^4$$

$$(2x^2 - 3\sqrt{1-x^2})^4 = {}^4C_0 (2x^2)^4 - {}^4C_1 (2x^2)^3 (3\sqrt{1-x^2})$$

$$+ {}^4C_2 (2x^2)^2 (3\sqrt{1-x^2})^2 - {}^4C_3 (2x^2) (3\sqrt{1-x^2})^3 + {}^4C_4 (3\sqrt{1-x^2})^4$$

$$(2x^2 + 3\sqrt{1-x^2})^4 = {}^4C_0 (2x^2)^4 + {}^4C_1 (2x^2)^3 (3\sqrt{1-x^2})$$

$$+ {}^4C_2 (2x^2)^2 (3\sqrt{1-x^2})^2 + {}^4C_3 (2x^2) (3\sqrt{1-x^2})^3 + {}^4C_4 (3\sqrt{1-x^2})^4$$

$$(2x^2 - 3\sqrt{1-x^2})^4 + (2x^2 + 3\sqrt{1-x^2})^4$$

$$= 2 \left[{}^4C_0 (2x^2)^4 + {}^4C_2 (2x^2)^2 (3\sqrt{1-x^2})^2 + {}^4C_4 (3\sqrt{1-x^2})^4 \right]$$

$$= 2 \left[16x^8 + 6(4x^4)(9(1-x^2)) + 81(1-x^2)^2 \right]$$

$$= 2 \left[16x^8 - 216x^4(1-x^2) + 81(1+x^4-2x^2) \right]$$

$$= 2 \left[16x^8 - 216x^4 + 216x^6 + 81 + 81x^4 - 162x^2 \right]$$

$$= 32x^8 - 512x^6 + 674x^4 - 324x^2 + 162$$

N. கனகசபதி (PG Asst)
கோவைத் துறை,
கோவை (TN)

$$2) மதிப்பிடுக. i) (102)^4 = (100+2)^4$$

$$= {}^4C_0 (100)^4 + {}^4C_1 (100)^3 (2) + {}^4C_2 (100)^2 (2^2)$$

$$+ {}^4C_3 (100) (2^3) + {}^4C_4 (2^4)$$

$$= 100000000 + 4(2)(1000000) + 6(4)(10000)$$

$$+ 4(8)100 + 16$$

$$= 100000000 + 8000000 + 240000 + 3200 + 16$$

$$= 108243216$$

$$ii) 99^4 = (100-1)^4$$

$$= {}^4C_0 (100)^4 - {}^4C_1 (100)^3 (1) + {}^4C_2 (100)^2 (1^2)$$

$$- {}^4C_3 (100) (1)^3 + {}^4C_4 (1^4)$$

$$= 100000000 - 4(1000000) + 6(10000)$$

$$- 4(100) + 1$$

$$= 100000000 - 4000000 + 60000 - 400 + 1$$

$$= 100060001 - 4000400 = 96059601$$

$$iii) 9^7 = (10-1)^7$$

$$= {}^7C_0 (10)^7 - {}^7C_1 (10)^6 (1) + {}^7C_2 (10)^5 - {}^7C_3 (10)^4$$

$$+ {}^7C_4 (10)^3 - {}^7C_5 (10)^2 + {}^7C_6 (10) - {}^7C_7 (1)$$

$$= 10000000 - 7000000 + 2100000 - 350000$$

$$+ 35000 - 2100 + 70 - 1$$

$$= 12135070 - 7352101 = 4782969$$

$$3) திணிவு (1.01)^{1000000} = (1+0.01)^{1000000}$$

$$= {}^{1000000}C_0 + {}^{1000000}C_1 (0.01)^1$$

$$+ \dots + {}^{1000000}C_{1000000} (0.01)^{1000000}$$

$$= 1 + 10000 + \dots + (0.01)^{1000000}$$

$$= 10001 + (\text{+ve values})$$

$$> 10000$$

$$\therefore (1.01)^{1000000} > 10000.$$

4) $(x^2 + \frac{1}{x^3})^{10}$ ன் x^{15} ன் கெணக்கம்
வாது?

$$T_{r+1} = nC_r x^{n-r} a^r$$

$$= 10C_r (x^2)^{10-r} \left(\frac{1}{x^3}\right)^r$$

$$= 10C_r (x^{20-2r}) x^{-3r}$$

$$= 10C_r x^{20-5r}$$

$$20-5r = 15$$

$$20-15 = 5r$$

$$5 = 5r$$

$$r = 1$$

பா.காமராசு (PG ASSI)
GHS, கோயிந்தவாடி
காங்கிரஸ் (மா)

$$\therefore T_{r+1} = 10C_1 = 10$$

$$T_2 = 10$$

5) $(x^2 - \frac{1}{x^3})^6$ ன் x^4 , x^2 ன்
கெணக்கம் காண்க.

$$T_{r+1} = nC_r x^{n-r} a^r$$

$$= 6C_r (x^2)^{6-r} \left(-\frac{1}{x^3}\right)^r$$

$$= 6C_r x^{12-2r} (-1)^r x^{-3r}$$

$$= 6C_r (-1)^r x^{12-5r}$$

$$12-5r = 6$$

$$12-6 = 5r$$

$$6 = 5r$$

$$\frac{6}{5} = r \text{ (கெணக்கம்)}$$

7 கெணக்கம் காண்க
 x^6 ன் கெணக்கம் காண்க.

(ii) x^2 ன் கெணக்கம் காண்க

$$12-5r = 2$$

$$12-2 = 5r$$

$$10 = 5r$$

$$r = 2$$

$$x^2 \text{ ன் கெணக்கம்} = 6C_2 (-1)^2 = \frac{6 \times 5}{1 \times 2}$$

$$= 15$$

6) $(2x^3 - \frac{1}{3x^2})^5$ ன் x^4 ன் கெணக்கம் காண்க?

$$T_{r+1} = nC_r x^{n-r} a^r$$

$$= 5C_r (2x^3)^{5-r} \left(\frac{-1}{3x^2}\right)^r$$

$$= 5C_r (-1)^r 2^{5-r} 3^{-r} x^{15-5r}$$

$$15-5r = 0$$

$$15 = 5r$$

$$r = \frac{15}{5} = 3$$

$$r = 3$$

நினைவூட்டம்

$$5C_3 (-1)^3 2^{5-3} 3^{-3}$$

$$= \frac{5 \times 4 \times 3}{1 \times 2 \times 3} (-1) 2^2 \frac{1}{27}$$

$$= -\frac{40}{27}$$

8) 3^{600} ன் கெணக்கம் காண்க

$$3^{600} = (3^2)^{300} = 9^{300}$$

$$= (10-1)^{300}$$

$$= 300C_0 - 300C_1 (10) + 300C_2 (10)^2$$

$$- 300C_3 (10)^3 + \dots + 300C_{299} (10)^{299} - 300C_{300} (10)^{300}$$

$$= 0$$

9) $(1+x^3)^{50} (x^2 + \frac{1}{x})^5$ ன்
 x^4 ன் கெணக்கம் காண்க.

(3)

$$= [50C_0 + 50C_1 x^3 + 50C_2 (x^3)^2 + \dots + 50C_{50} (x^3)^{50}]_3$$

$$\times [50C_0 (x^3)^5 + 50C_1 (x^3)^4 \left(\frac{1}{x}\right) + 50C_2 (x^3)^3 \left(\frac{1}{x}\right)^2 + 50C_3 (x^3)^2 \left(\frac{1}{x}\right)^3$$

$$+ 50C_4 (x^3) \left(\frac{1}{x}\right)^4 + 50C_5 \left(\frac{1}{x}\right)^5]$$

$$= (1 + 50x^3 + 50C_2 x^6 + \dots + x^{100}) \times$$

$$(x^{10} + 5x^7 + 10x^4 + 10x + 5x^{-2} + x^{-5})$$

$$= (1 \times 10) + (50 \times 10) + 5(50C_2) + 50C_3 \times 1$$

$$= 10 + 500 + 6125 + 19600 = 26235$$

9) எவ்வளவு மிகை முழுதான் n க்கும் $9^{n+1} - 8n - 9$ அன்மது 64 அன்மது உருபடும் என நிரூபிக்க.

தீர்வு $9^{n+1} - 8n - 9$ அன்மது 64 அன்மது உருபடும்.

$$9^{n+1} = (8+1)^{n+1} = (1+8)^{n+1}$$

$$= 1 + (n+1)8 + \frac{n(n+1)}{1 \cdot 2} 8^2 + \dots + 8^{n+1}$$

$$= 1 + 8n + 8 + nC_2 8^2 + nC_3 8^3 + \dots + 8^{n+1}$$

$$9^{n+1} - 8n - 9 = nC_2 8^2 + nC_3 8^3 + \dots + 8^{n+1}$$

$$= 8^2 (nC_2 + nC_3 (8) + \dots + 8^{n-1})$$

$$9^{n+1} - 8n - 9 = 64 (nC_2 + nC_3 (8) + \dots + 8^{n-1})$$

உ $9^{n+1} - 8n - 9$ அன்மது 64 அன்மது உருபடும்.

தேவகாமாட்சி (P&ASST)
64485, கோலிந்தவாடி
காங்கிரஸ் (மா)

10) n ஆகிய வற்றை மட்ட மிகை முழுதான் எனின் $(x+y)^n$ ன் விரிவின் மைய உறுப்புகளின் தொகைகள் சமம் என நிறுபக.

தீர்வு $(x+y)^n$ ன் நடு உறுப்பு $T_{\frac{n-1}{2}}$ மேலும் $T_{\frac{n+1}{2}}$ ஆக.

$$\text{கூணகம் முறைப} \quad nC_{\frac{n+1}{2}} = nC_{\frac{n-1}{2}}$$

$$nC_{\frac{n+1}{2}} = nC_{n - (\frac{n-1}{2})}$$

$$nC_r = nC_{n-r}$$

$$= nC_{\frac{2n-n+1}{2}} = nC_{\frac{n+1}{2}} \therefore \text{கூணகங்கள் சமமாகும்.}$$

11) n ஆகிய மிகை முழுதான் மற்றும் x எனின்மது கூறையற்ற முழுதான் எனின் $(1+x)^n$ ன் விரிவின் x^r மற்றும் x^{n-r} உறுப்புகளின் தொகைகள் சமம் என நிறுபக.

$$\text{தீர்வு} \quad (1+x)^n \text{ ன் } T_{r+1} = nC_r (-1)^{n-r} x^r$$

$$T_{r+1} = nC_r x^r$$

$$x^r \text{ ன் கூணகம்} = nC_r$$

$$T_{(n-r)+1} \text{ அன்மது } x^{n-r} \text{ ன் தொகை உள்மது}$$

$$T_{(n-r)+1} = nC_{n-r}$$

$$\therefore nC_r = nC_{n-r} \text{ கூணகங்கள் சமம்.}$$

12) a மற்றும் b எனின்மது வையேறு முழுக்கள் எனின் n எவ்வளவு மிகை முழுதான் $a^n - b^n$ ன் ஆகிய காரணி $(a-b)$ என நிறுபக.

தீர்மானம் $a^n = (a-b+b)^n$
 $= nC_0(a-b)^n + nC_1(a-b)^{n-1}(b)$
 $+ nC_2(a-b)^{n-2}(b^2) + \dots$
 $+ nC_{n-1}(a-b)b^{n-1} + nC_n(b^n)$
 $= (a-b)^n + nC_1(a-b)^{n-1}(b)$
 $+ \dots + nC_{n-1}(a-b)b^{n-1} + b^n$

$a^n - b^n = (a-b) \left[(a-b)^{n-1} + nC_1(a-b)^{n-2}b + \dots + nC_{n-1}b^{n-1} \right]$

RHS சமனது $(a-b)$ சமன் அடுகிறது
 $a^n - b^n$ சமனது $(a-b)$ சமன் அடுகிறது

13) $(a+b)^n$ ன் விரிவாக்கம் 4 அங்குசு
 13 அங்குசு உறுப்புகளின் தொகைக்களை
 கீழ்க் காண்க

தீர்மானம் $(a+b)^n$ ன் மொத்த உறுப்புகள்
 $T_{n+1} = nC_n a^n b^0$

4 அங்குசு $T_{3+1} = nC_3 a^{n-3} b^3$

13 அங்குசு $T_{12+1} = nC_{12} a^{n-12} b^{12}$

4 அங்குசு உறுப்பு தொகை = 13^{வது} ன் தொகை

$nC_3 = nC_{12}$

$3+12 = n$

$n = 15$

14) $(a+x)^n$ ன் விரிவாக்கம் தரப்படுத்தியான சூத்திரம்
 உறுப்புகளின் ம.க.உறுப்புகள் தொகைக்களின்
 விகிதம் 1:7:42 எனில் n யாவது?

தீர்மானம் $(a+x)^n$ விரிவாக்கம் $r, r+1, r+2$
 அங்கு உறுப்புகளின் தொகைக்கள் முறையாக
 nC_{r-1}, nC_r, nC_{r+1}

$nC_{r-1} : nC_r : nC_{r+1} = 1:7:42$

$\frac{nC_{r-1}}{nC_r} = \frac{1}{7}$ & $\frac{nC_r}{nC_{r+1}} = \frac{7}{42}$
 -① -②

① $\Rightarrow \frac{n!}{(n-r+1)! (r-1)!} \cdot \frac{r!}{n!} = \frac{1}{7}$

$\frac{(n-r)! r!}{(n-r)! (r+1)!} = \frac{1}{7}$

$7(n-r)! r! = (n-r+1)! (r+1)!$

$7(n-r)! r! = (n-r)! (n-r+1) (r+1)!$

$7r! = (r+1)! (n-r+1)$

$7r = r+1 + (n-r+1)$ ②

$n - 8r + 1 = 0$

④

② $\Rightarrow \frac{nC_r}{nC_{r+1}} = \frac{7}{42} = \frac{1}{6}$

$\frac{n!}{(n-r)! r!} \cdot \frac{r!}{n!} = \frac{1}{6}$

$\frac{(n-r-1)! (r+1)!}{(n-r)! r!} = \frac{1}{6}$

$\frac{6(n-r-1)! (r+1)!}{(n-r)! r!} = (n-r)! r!$

$6(n-r-1)! (r+1) = (n-r)! r!$

$6(n-r-1) = n-r$

$6r+6 = n-r$

$n - 7r + 6 = 0$ ④

③ & ④

$n = 8r - 1$

$n = 7r + 6$

$\therefore 8r - 1 = 7r + 6$

$8r - 7r = 6 + 1$

$r = 7$

$n = (8(7) - 1) = 56 - 1$

$n = 55$

(5)

15) $(1+x)^n$ இன் விரிவின் 5வது, 6வது மற்றும் 7வது உறுப்புகளின் தொகுக்கின் வகு கூட்டுத் தொடர் என்னிள் என் உறுப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு $(1+x)^n$ விரிவின் 5வது, 6வது, 7வது உறுப்புகளின் தொகுக்கின் முறையே nC_4, nC_5, nC_6 ஆகும்.
 nC_4, nC_5, nC_6 AP இன் உறுப்புகள்

$$nC_5 = \frac{nC_4 + nC_6}{2}$$

$$2(nC_5) = nC_4 + nC_6$$

$$2 = \frac{nC_4}{nC_5} + \frac{nC_6}{nC_5}$$

$$2 = \frac{5}{n-4} + \frac{n-5}{6} \quad \left[\because \frac{nC_k}{nC_{k-1}} = \frac{n-k+1}{k} \right]$$

$$2 = \frac{30 + (n-5)(n-4)}{6(n-4)}$$

$$12(n-4) = 30 + n^2 - 4n - 5n + 20$$

$$12n - 48 = 50 + n^2 - 9n$$

$$n^2 - 9n + 50 - 12n + 48 = 0$$

$$n^2 - 21n + 98 = 0$$

$$(n-14)(n-7) = 0$$

$$n = 14, 7$$

மற்றும் 7, 14 ஆகும்

$$16) C_0^2 + C_1^2 + \dots + C_n^2 = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \text{ என நிரூபிக்க.}$$

$$\text{தீர்வு } (1+x)^n = nC_0 + nC_1 x + nC_2 x^2 + \dots + nC_n x^n$$

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^n = nC_0 + nC_1 \frac{1}{x} + nC_2 \left(\frac{1}{x}\right)^2 + \dots + nC_n \left(\frac{1}{x}\right)^n$$

$$(1+x)^n \left(1 + \frac{1}{x}\right)^n = \left[nC_0 + nC_1 x + nC_2 x^2 + \dots + nC_n x^n \right] \times \left[nC_0 + nC_1 \left(\frac{1}{x}\right) + \dots + nC_n \left(\frac{1}{x}\right)^n \right]$$

என் தனித்த உறுப்பின் தொகுக்கை காண

$$= (1+x)^n \left(1 + \frac{1}{x}\right)^n = (1+x)^n \left(\frac{1+x}{x}\right)^n$$

$$= \frac{(1+x)^{2n}}{x^n}$$

$$= (1+x)^{2n} \text{ இன் விரிவின் } x^n \text{ இன்}$$

$$(nC_0)^2 + (nC_1)^2 + \dots + (nC_n)^2 =$$

$$\text{LHS} = \frac{2n!}{n! (2n-n)!} = \frac{2n!}{(n!)^2}$$

$$= \text{RHS}$$

மற்றும் 5.2

1. தொடர் முறைகளின் மூலம் உறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் முதல் 6 உறுப்புகளைக் காண்க. மேலும் அந்த தொடர் முறைகள், கூட்டுத் தொடர்முறை, பெருக்குத் தொடர்முறை, கிடைசுத் தொடர்முறை கூட்டு - பெருக்குத் தொடர்முறை இவற்றின் எதுவுமில்லை என உறுப்பிப்படுத்துக.

$$\text{தீர்வு i) } \frac{1}{2^{n+1}} \quad a_n = \frac{1}{2^{n+1}}$$

$$a_1 = \frac{1}{2^{1+1}} = \frac{1}{4} ; a_2 = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

$$a_3 = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16} ; a_4 = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32}$$

$$a_5 = \frac{1}{2^6} = \frac{1}{64} ; a_6 = \frac{1}{2^7} = \frac{1}{128}$$

முதல் 6 உறுப்புகள்

$$\frac{1}{2^2}, \frac{1}{2^3}, \frac{1}{2^4}, \frac{1}{2^5}, \frac{1}{2^6}, \frac{1}{2^7} \dots$$

இது ஒரு பெருக்குத் தொடர்

$$\text{ii) } a_n = \frac{(n+1)(n+2)}{(n+3)(n+4)}$$

$$a_1 = \left(\frac{2 \times 3}{4 \times 5} \right) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$$

N கிராமல் (PGASST)
 G14SS, கோவைத்தாறு,
 காஞ்சிபுரம் (T.M.)

(7)

(ii) தேர் 6 உறுப்புகள் கொண்டே

$$a_n = \begin{cases} 1, & n=1 \\ 2, & n=2 \\ a_{n-1} + a_{n-2} & ; n \geq 3 \end{cases}$$

$$a_1 = 1 \quad a_2 = 2$$

$$a_3 = a_{3-1} + a_{3-2} = a_2 + a_1 = 2 + 1 = 3$$

$$a_4 = a_{4-1} + a_{4-2} = a_3 + a_2 = 3 + 2 = 5$$

$$a_5 = a_4 + a_3 = 5 + 3 = 8$$

$$a_6 = a_5 + a_4 = 8 + 5 = 13$$

தேர் 6 உறுப்புகள்

1, 2, 3, 5, 8, 13.

$$(iii) a_n = \begin{cases} n & n=1, 2, 3 \\ a_{n-1} + a_{n-2} + a_{n-3} & n \geq 3 \end{cases}$$

$$a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3$$

$$a_4 = a_3 + a_2 + a_1 = 3 + 2 + 1 = 6$$

$$a_5 = a_4 + a_3 + a_2 = 6 + 3 + 2 = 11$$

$$a_6 = a_5 + a_4 + a_3 = 20$$

தேர் 6 உறுப்புகள் கொண்டே

1, 2, 3, 6, 11, 20.

3) பின்வரும் தொடர் தொடர்வரிசை
எவ்வ உறுப்புகளைக் காண்க.

(i) 2, 2, 4, 4, 6, 6.

ஒற்றை வகை = 2, 4, 6

இருவகை வகை = 2, 4, 6

$$a_n = \begin{cases} n+1 & \text{if } n \text{ ஒற்றை வகை} \\ n & \text{if } n \text{ இருவகை வகை} \end{cases}$$

(ii) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}$

தொடர் 1, 2, 3, 4, 5... in A.P

$$a_n = a + (n-1)d \\ = 1 + (n-1)(1) = 1 + (n-1) \\ = n$$

வகை 2, 3, 4, 5, 6 இது A.P

$$2 \text{ வகை } a_n = a + (n-1)d \\ = 2 + (n-1)(1) \\ = 2 + n - 1 = n + 1$$

 n^{th} term = n வகை உறுப்பு

$$= \frac{n}{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

(iii) $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \frac{7}{8}, \frac{9}{10}, \dots$

தொடர் 1, 3, 5, 7, 9

$$a=1 \quad d=3-1=2$$

$$a_n = a + (n-1)d = 1 + (n-1)(2) \\ = 1 + 2n - 2 = 2n - 1$$

N.கொலாபு (சு.சு.)

கொலாபு (சு.சு.)

கொலாபு (சு.சு.)

வகை 2, 4, 6, 8, 10

$$a=2 \quad d=2$$

$$a_n = a + (n-1)d \\ = 2 + (n-1)2 \\ = 2 + 2n - 2 = 2n$$

$$n^{\text{th}} \text{ உறுப்பு} = \frac{2n-1}{2n}$$

$$= \frac{2n}{2n} - \frac{1}{2n} = 1 - \frac{1}{2n}$$

 $\forall n \in \mathbb{N}$

(iv) 6, 10, 4, 12, 2, 14, 0, 16, -2...

ஒற்றை இவர்களை காண்க

6, 4, 2, 0

$$a=6 \quad d=4-6=-2$$

$$a_n = a + (n-1)d \\ = 6 + (n-1)(-2) \\ = 6 - 2n + 2 = 8 - 2n$$

இருவகை இவர்களை காண்க

10, 12, 14, ...

$$a=10 \quad d=12-10=2$$

$$a_n = a + (n-1)d \\ = 10 + (n-1)(2) \\ = 10 + 2n - 2 = 8 + 2n$$

$$n^{\text{th}} \text{ உறுப்பு} = \begin{cases} 8-2n, & n \text{ ஒற்றை} \\ 8+2n, & n \text{ இருவகை} \end{cases}$$

4) ஒரு வரிசையின் மெடுக்கத் தொடர் முறையால் உள்ள சூன்றி உறுப்புகளின் மெடுக்கின் 5832 இரண்டாவது எண்ணுடன் 6ஆவது சூன்றியவது எண்ணுடன் 9ஆவது கூட்டக் கிடைக்கும் எண்கள் மெடுக்கத்தொடர் முறையாக இருக்கும் எண்களின் மெடுக்கத் தொடர் முறையால் அந்த சூன்றி எண்களைக் கூறுக.

தீர்வு சூன்றி எண்கள்

$$a, a, ar \text{ எண்கள்.}$$

$$\frac{a}{x} \times a \times ar = 5832$$

$$a^3 = 2^3 \times 9^3$$

$$a = 2 \times 9$$

$$a = 18.$$

$\frac{18}{x}, 18+6, 18x+9$ எண்மறை கூட்டுத் தொடரின் உள்ளது

$$2b = a + c$$

$$2(24) = \frac{18}{x} + 18x + 9$$

$$48x = 18 + 18x^2 + 9x$$

$$18x^2 + 9x + 18 - 48x = 0$$

$$18x^2 - 39x + 18 = 0$$

$$6x^2 - 13x + 6 = 0$$

$$(3x-2)(2x-3) = 0$$

$$x = \frac{2}{3} \text{ or } x = \frac{3}{2}.$$

6.பின் உள்ள எண்கள்

$$\frac{18}{\frac{2}{3}}, 18, 18\left(\frac{2}{3}\right) = 18\left(\frac{3}{2}\right), 18, \frac{36}{3}$$

$$= 27, 18, 12.$$

5) $\frac{3}{1^2 2^2}, \frac{5}{2^2 \times 3^2}, \frac{7}{3^2 4^2}$ என்ற தொடரின் n வது உறுப்பை இது உறுப்புகளின் மாதிரியாகக் காட்டுக.

தீர்வு வித எடுத்தி 3, 5, 7... A.பின் உள்ளது

$$a_n = a + (n-1)d = 3 + (n-1)2$$

$$= 3 + 2n - 2 = 1 + 2n.$$

$$b_n = 1^2 2^2, 2^2 3^2, 3^2 4^2 \dots$$

$$a_n = [n(n+1)]^2$$

$$n \text{வது உறுப்பு} = \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$$

$$= \frac{2n+1+n^2-n^2}{n^2(n+1)^2} = \frac{(n+1)^2 - n^2}{n^2(n+1)^2}$$

$$= \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}.$$

N.கொண்டி (சூ.சூ.)
கொவிந்த வர
காஞ்சிமரம் (மன)

6) ஒரு மெடுக்கத் தொடரின் k வது உறுப்பு, t_k எனின்குள் என்னவாக இருக்க வேண்டும் t_{n-k}, t_n, t_{n+k} எண்மறை மெடுக்கத்தொடர் தொடர் என நிரூபிக்க.

தீர்வு

$$t_n = ar^{n-1}$$

$$t_k = ar^{k-1}$$

$$t_{n-k} = ar^{n-k-1}$$

$$t_{n+k} = ar^{n+k-1}$$

$$\text{மொது உறுப்பு} = \frac{t_n}{t_{n-k}}$$

$$= \frac{ar^{n-1}}{ar^{n-k-1}} = r^{n-1-n+k+1} = r^k$$

$$\text{மொது உறுப்பு} = \frac{t_{n+k}}{t_n}$$

$$= \frac{ar^{n+k-1}}{ar^{n-1}} = r^{n+k-1-n+1} = r^k.$$

மொது உறுப்புகள் சமம்

$\therefore$ என்னவென இவ்வகை மெடுக்கத் தொடரின் உள்ளது.

(9)

7) a, b, c எண்மன யுரு மெருக்குத்
தொடர் முறையாக இருந்து
 $a^{1/x} = b^{1/y} = c^{1/z}$ எனவும் இருக்க
அனைத்து x, y, z எண்மன யுரு
கூட்டுத்தொடர் முறையாகும் என்கிறது.

தீர்வு $a^{1/x} = b^{1/y} = c^{1/z} = k$.

$$\left. \begin{array}{l} a^{1/x} = k \\ a = k^x \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} b^{1/y} = k \\ b = k^y \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} c^{1/z} = k \\ c = k^z \end{array} \right|$$

a, b, c அளவு G.P

$$\frac{b}{a} = \frac{c}{b} \Rightarrow b^2 = ac$$

$$(k^y)^2 = k^x \cdot k^z$$

$$k^{2y} = k^{x+z}$$

$$2y = x+z$$

$$y+y = x+z$$

$$y-x = z-y$$

மொது அத்தியாயம் சமம்

$\therefore x, y, z$ அளவு A.Pயின்

இருக்கும்.

8. இரு எண்களின் கூட்டுத்
சராசரியானது மெருக்குச் சராசரி
யை விட 10 அதிகமாகவும்,
கிடைச் சராசரியை விட 16 அதிக
மாகவும் இருக்குமானால் அந்த
இரு எண்களைக் காண்க.

தீர்வு a, b எண்மன இரு எண்கள்

$$A = \frac{a+b}{2}, G = \sqrt{ab}, H = \frac{2ab}{a+b}$$

$$A - G = 10 \quad A - H = 16$$

$$G = A - 10 \quad H = A - 16$$

$$G^2 = AH$$

$$(A-10)^2 = A(A-16)$$

$$A^2 + 100 - 20A = A^2 - 16A$$

$$100 = 20A - 16A$$

$$100 = 4A \quad \text{N.கொண்டி (சு.அ.)}$$

$$\boxed{A = 25} \quad \text{கொவிந்தயாழி,}$$

$$\text{கொச்சியாழம் (மொ.)}$$

$$\frac{a+b}{2} = 25$$

$$a+b = 50 \quad \text{--- ①}$$

$$G = A - 10 = 25 - 10 = 15$$

$$\sqrt{ab} = 15$$

$$ab = 225$$

$$b = \frac{225}{a} \quad \text{① ன் மறதியுட}$$

$$a + \frac{225}{a} = 50$$

$$a^2 + 225 = 50a$$

$$a^2 - 50a + 225 = 0$$

$$(a-45)(a-5) = 0$$

$$a = 5, 45$$

$$a = 5 \text{ எனில் } b = \frac{225}{5} = 45$$

$$a = 45 \text{ எனில் } b = \frac{225}{45} = 5$$

இரு எண்கள் 5, 45 ஆகும்

9) $(x-a)x^2 + (x-p)x + (p-a) = 0$
என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள்
சமமானவை எனில் P, q, r
எண்மன யுரு கூட்டுத் தொடர்
முறையாக இருக்கும் என்கிறது.

தீர்வு $(x-a)x^2 + (x-p)x + (p-a) = 0$

$$a = x-a, b = x-p, c = p-a$$

$\therefore$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$(x-p)^2 - 4(x-a)(p-a) = 0$$

$$x^2 + p^2 - 2xp - 4(pq - q^2 - xp + x^2) = 0$$

$$x^2 + p^2 - 2xp - 4pq + 4q^2 + 4xp - 4x^2 = 0$$

$$(x+p-2q)^2 = 0$$

$$x+p-2q = 0$$

$$x+p = 2q$$

$$[\because (a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca]$$

$\therefore P, q, r$ அளவு A.Pயின்
உள்ளது.

10) ஒரு மரகதக் குத் தோட்டின்
P, q மற்றும் r உறு உறுப்புகள்
முறையே a, b, c என்ன
(q-r) log a + (r-p) log b + (p-q) log c
= 0 என நிறுத்து.

தீர்வு A = முதல் உறுப்பு
R = மரகத உறுப்பு

$$a = AR^{p-1} \Rightarrow p \text{ உறு உறுப்பு}$$

$$\log a = \log A + (p-1) \log R$$

$$q \text{ உறு உறுப்பு} \Rightarrow a = AR^{q-1}$$

$$\log a = \log A + (q-1) \log R$$

$$r \text{ உறு உறுப்பு} \Rightarrow a = AR^{r-1}$$

$$\log a = \log A + (r-1) \log R$$

$$\text{LHS} (q-r) \log a + (r-p) \log b + (p-q) \log c$$

$$= (q-r) [\log A + (p-1) \log R]$$

$$+ (r-p) [\log A + (q-1) \log R]$$

$$+ (p-q) [\log A + (r-1) \log R]$$

$$= \log A [q-r + r-p + p-q]$$

$$+ \log R [p(q-1) - p(r-1) - q(r-1) + r(p-1) + p(r-1) - r(q-1) + q(p-1)]$$

$$= \log A (0) + \log R (0) = 0.$$

புறக்கி 5.3

1. ஒரு கூட்டுக் குத் தோட்டின் முதல் 10 உறுப்புகளின் கூடுதல் 52 மற்றும் முதல் 15 உறுப்புகளின் கூடுதல் 77 எனில் முதல் 20 உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.

$$\text{தீர்வு } S_n = \frac{n}{2} [2a + (n-1)d]$$

$$S_{10} = 52$$

$$52 = \frac{10}{2} (2a + 9d)$$

$$52 = 10a + 45d \quad \text{--- ①}$$

$$S_{15} = 77$$

$$77 = \frac{15}{2} (2a + 14d)$$

$$77 = 15a + 105d \quad \text{--- ②}$$

$$\text{①} \times 15 \Rightarrow 150a + 675d = 780$$

$$\text{②} \times 10 \Rightarrow -150a - 1050d = -770$$

$$-375d = 10$$

$$d = \frac{10}{-375} = -\frac{2}{75} \quad \text{① ன் மதிப்பு}$$

$$10a + 45 \left(-\frac{2}{75}\right) = 52$$

$$10a - \frac{6}{5} = 52$$

$$10a = 52 + \frac{6}{5} = \frac{260+6}{5}$$

$$10a = \frac{266}{5}$$

$$a = \frac{266}{50} = \frac{133}{25}$$

$$S_{20} = \frac{20}{2} \left(2 \left(\frac{133}{25} \right) + 19 \left(-\frac{2}{75} \right) \right)$$

$$= 10 \left[\frac{266}{25} - \frac{38}{75} \right]$$

N.காமராசு (கு.உ)

கோவிரத்தாறு,

காங்கிரஸ் (மா)

$$= 10 \left(\frac{798 - 38}{75} \right) = 10 \left(\frac{760}{75} \right)$$

$$S_{20} = \frac{304}{3}$$

$$2) \frac{1^3}{1} + \frac{1^3+2^3}{1+3} + \frac{1^3+2^3+3^3}{1+3+5} \text{ என்ன}$$

தோட்டின் முதல் 17 உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.

$$\text{தீர்வு } T_n = \frac{1^3+2^3+\dots+n^3}{1+3+5+\dots+(2n-1)}$$

$$= \frac{\left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2}{n^2}$$

$$= \frac{n^2(n+1)^2}{4 \times n^2} = \frac{(n+1)^2}{4}$$

$$= \frac{n^2+2n+1}{4}$$

(11)

S_n எனது முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் $S_n = \sum_{k=1}^n T_k$

$$= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^n (k^2 + 2k + 1)$$

$$= \frac{1}{4} \left(\sum_{k=1}^n k^2 + 2 \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n 1 \right)$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{2n(n+1)}{2} + n \right]$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{n(2n^2 + n + 2n + 1) + 6n(n+1) + 6n}{6} \right]$$

$$= \frac{1}{24} [2n^3 + 3n^2 + n + 6n^2 + 6n + 6n]$$

$$= \frac{1}{24} [2n^3 + 9n^2 + 13n]$$

$$= \frac{n}{24} [2n^2 + 9n + 13]$$

$$S_{17} = \frac{17}{24} [2(17)^2 + 9(17) + 13]$$

$$= \frac{17}{24} [578 + 153 + 13]$$

$$= \frac{17}{24} [744] = 17(31) = 527.$$

3) பின்னரும் எதிர்பார்க்கலின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க

$$(i) 8 + 88 + 888 + \dots$$

$$= 8(1 + 11 + 111 + \dots)$$

$$= \frac{8}{9}(9 + 99 + 999 + \dots)$$

$$= \frac{8}{9}[(10-1) + (100-1) + (1000-1) + \dots]$$

$$= \frac{8}{9}[(10 + 10^2 + 10^3 + \dots + 10^n) - (1 + 1 + \dots + 1)]$$

$$= \frac{8}{9} \left[\frac{10(10^n - 1)}{10 - 1} - n \right] \quad [\because S_n = a \frac{r^n - 1}{r - 1}]$$

$$= \frac{8}{9} \left(\frac{10^{n+1} - 10}{9} - n \right)$$

$$= \frac{8}{9} \left(\frac{10^{n+1} - 10 - 9n}{9} \right)$$

$$= \frac{8(10^{n+1} - 10 - 9n)}{81}$$

(ii) $6 + 66 + 666 + \dots$ N.காஸாட்சி (கு.26) கோவிந்தவாழ் காங்கிரஸ் (100)

$$S = 6(1 + 11 + 111 + \dots)$$

$$= \frac{6}{9}(9 + 99 + 999 + \dots)$$

$$= \frac{6}{9}[(10-1) + (100-1) + (1000-1) + \dots]$$

$$= \frac{6}{9} \left[\frac{10(10^n - 1)}{10 - 1} - n \right] \quad [\because S_n = a \frac{r^n - 1}{r - 1}]$$

$$= \frac{6}{9} \left(\frac{10(10^n - 1)}{9} - n \right)$$

$$= \frac{6}{9} \left(\frac{10(10^n - 1) - 9n}{9} \right)$$

$$= \frac{6(10(10^n - 1) - 9n)}{81}$$

4) $1 + (1+4) + (1+4+4^2) + (1+4+4^2+4^3) + \dots$ எனது எதிர்பார்க்கலின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க.

$$T_n = 1 + 4 + 4^2 + 4^3 + \dots$$

$$= \frac{1(4^n - 1)}{4 - 1} = \frac{4^n - 1}{3}$$

முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல்

$$S_n = \sum_{k=1}^n T_k = \sum_{k=1}^n \frac{4^k - 1}{3}$$

$$= \frac{1}{3} \left[\sum_{k=1}^n 4^k - \sum_{k=1}^n 1 \right]$$

$$= \frac{1}{3} \left[\frac{4(4^n - 1)}{4 - 1} - n \right]$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{4(4^n - 1)}{3} - n \right)$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{4(4^n - 1) - 3n}{3} \right) = \frac{4(4^n - 1) - 3n}{9}$$

5) $1, \frac{4}{3}, \frac{7}{9}, \frac{10}{27} \dots$ என்ற தொடர்
 குறையுள்ள வகை உறுப்பு மந்தம்
 முதல் உறுப்புகளின் கூடுதல்களைக் காண்க.

தீர்வு தொடர் $1, 4, 7, 10 \dots$

$$a = 1 \quad d = 4 - 1 = 3$$

மூலம் $\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27} \dots$

$$r = \frac{1}{3}$$

தொடர் குறையுள்ள வகை
 $a, (a+d)r, (a+2d)r^2 \dots$

இது A.G.P. கூடுதல்

$$T_n = [a + (n-1)d] r^{n-1}$$

$$= (1 + (n-1)3) \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$

$$= (1 + 3n - 3) \frac{1}{3^{n-1}}$$

$$= \frac{3n-2}{3^{n-1}}$$

S_n என்ற தொடர் குறையுள்ள
 கூடுதல் என்ன

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{3k-2}{3^{k-1}}$$

$$= \sum_{k=1}^n (3k-2)$$

$$\sum_{k=1}^n 3k-1$$

$$= 3 \sum_{k=1}^n k - 2 \sum_{k=1}^n (1)$$

$$\frac{3^0 + 3^1 + 3^2 + \dots + 3^{n-1}}$$

$$= \frac{3 \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) - 2n}{1 \left(\frac{3^n - 1}{3 - 1} \right)}$$

$$= \frac{3(n^2 + n) - 4n}{\frac{3^n - 1}{2}}$$

N. காமாட்சி (மு.உ.)
 கோவிந்த் பாபு
 காஞ்சி புத்தம் (மா.)

$$= \frac{3n^2 + 3n - 4n}{3^n - 1} = \frac{3n^2 - n}{3^n - 1}$$

$$= \frac{n(3n-1)}{3^n - 1}$$

6) $\sqrt{3} + \sqrt{75} + \sqrt{243} + \dots$ என்ற தொடரின்
 n உறுப்புகளின் கூடுதல் $435\sqrt{3}$
 எனில், n-ன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு $S_n = 435\sqrt{3}$

$$\sqrt{3} + \sqrt{75} + \sqrt{243} + \dots$$

$$\sqrt{3} + 5\sqrt{3} + 9\sqrt{3} + \dots$$

$$a = \sqrt{3} \quad d = 5\sqrt{3} - \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

$$S_n = \frac{n}{2} (2a + (n-1)d)$$

$$435\sqrt{3} = \frac{n}{2} (2\sqrt{3} + (n-1)4\sqrt{3})$$

$$435\sqrt{3} = \frac{n}{2} (2\sqrt{3} + 4n\sqrt{3} - 4\sqrt{3})$$

$$435\sqrt{3} = \frac{n}{2} (4n\sqrt{3} - 2\sqrt{3})$$

$$435\sqrt{3} = \frac{n}{2} (2\sqrt{3}) (2n-1)$$

$$435 = 2n^2 - n$$

$$2n^2 - n - 435 = 0$$

$$2n^2 - 30n + 29n - 435 = 0 \quad \begin{matrix} 870 \\ \wedge \\ -30 \quad 29 \\ 2 \quad 2 \end{matrix}$$

$$(n-15)(2n+29) = 0$$

$$n = 15 \quad n = -\frac{29}{2} \text{ (ஏமாருகிறது)}$$

$$\boxed{n=15}$$

7) ஒரு கூட்டுத் தொடர் குறையுள்ள
 $(m+n)$ உறுப்பு மற்றும் $(m-n)$ உறுப்பு
 உறுப்புகளின் கூடுதல் n உறுப்பு
 உறுப்பைப் போல் இருக்கலாம்
 என நிரூபிக்க

தீர்வு $T_n = a + (n-1)d$

$$T_{m+n} = a + (m+n-1)d$$

$$T_{m+n} = a + (m-n-1)d$$

$$T_{m+n} \neq T_{m-n}$$

(13)

$$\begin{aligned}
 &= 2a + d(m+n-1 + m-n-1) \\
 &= 2a + d(2m-2) \\
 &= 2(a + d(m-1)) \\
 &= 2T_m.
 \end{aligned}$$

T_m, T_{m+n}, T_{m-n} ஆனது A.P.யின் உறுப்புகள்.

8) ஒருவர் 3250 என்ற தொகையை முதன் மாதம் 20 ம் அடுத்துடுத்த வங்கியை மாதமும் 15 சதிகம் படுத்தியும் செலுத்தி வருகின்றார். என்னி அவர் அடுத்தத் தொகையை முழுமையாக திருப்பச் செலுத்த எத்தனை மாதங்கள் வரும்?

தீர்வு N காலாடில் (மு.அ.)

கொடுத்த வாய்

கொடுத்திருக்கிறார்

$$S_n = 3250$$

$$a = 20 \quad d = 15$$

$$\frac{n}{2} (2a + (n-1)d) = 3250$$

$$\frac{n}{2} (2(20) + (n-1)15) = 3250$$

$$n(40 + 15n - 15) = 6500$$

$$15n^2 + 40n - 15n - 6500 = 0$$

$$15n^2 + 25n - 6500 = 0$$

$$3n^2 + 5n - 1300 = 0$$


$$\begin{aligned}
 (n-20)(3n+65) &= 0 & 8700 \\
 n=20 & \quad 3n = -65 & -60 \quad 65 \\
 & \quad n = -\frac{65}{3} & \frac{3}{3} \quad \frac{65}{3}
 \end{aligned}$$

$$n = 20$$

தொகையை திருப்பச் செலுத்த 20 மாதங்களாகும்.

9) ஒரு மந்தயத்தில் 20 மந்தங்கள் வந்தவாறானும் 4 ம் கிடைவெளியின் வரே நேர்க்கோட்டின் மையக்கம் படுகின்றன. முதல் மந்திற்கும் தொடக்கம் புள்ளிக்கும் உள்ள கிடைவெளி 24 ம். ஒரு கோட்டியாளர் ஒரு நேரத்தின் ஒரு மந்த் வீதம் என்ன மந்த் களையும் தொடக்கம் புள்ளிக்கு தொண்டு மந்த் செங்கல் எவ்வளவு தூரம் வட மேண்டும்.

தீர்வு



முதல் மந்த் கடக்கும் தூரம்

$$= 24 + 24 = 48 \text{ m.}$$

$$2 \text{ மந்த் மந்த்} = 2(24 + 4) = 56$$

$$3 \text{ மந்த் மந்த்} = 2(24 + 4 + 4) = 64$$

தொகுமானது 48, 56, 64, ...

$$a = 48, d = 56 - 48 = 8$$

$$n = 20.$$

$$\begin{aligned}
 S_n &= \frac{n}{2} (2a + (n-1)d) \\
 &= \frac{20}{2} (2(48) + (20-1)8) \\
 &= 10 (96 + 19(8)) \\
 &= 10 (96 + 152) = 10(248) \\
 &= 2480 \text{ m.}
 \end{aligned}$$

10) நுண்ணியர் மளர்ச்சியின் வந்தவாறானும் மணி நேரத்தின் 6 மணி நுண்ணியர்களின் எண்ணிக்கை -யானது அதன் முதலைய மணி நேரத்தின் உள்ளது போல கிடைக்காக்கிறது. ஆரம்பத்தில் 30 நுண்ணியர்கள் இருக்குமானால் 2 மந்த், 4 மந்த் மற்றும் 6 மந்த் மணி நேர முதலில் எத்தனை நுண்ணியர்கள் இருக்கும்.

தீர்வு இது ஒரு G.P. ஆகும்.

$$a = 30 \quad r = 2.$$

இரண்டு மணி நேர முதலில் மாதிரியானவர்கள் எண்ணிக்கை

$$t_3 = a r^2 = 30(4) = 120$$

4 மந்த் மணி நேரம்

$$t_5 = a r^4 = 30(2^4)$$

$$= 30(2^4) = 30(16) = 480$$

$$n\text{வது வருடம் } t_{n+1} = a \cdot 2^n$$

$$= 30(2^1)$$

11) ஒரு உங்கியன் சசலுத்தப்பட்ட
 500 ரூபாய் 10% வட்டி
 உட்படி உத்தத்தின் 10 வருஷங்கள்
 எவ்வளவு மொத்த
Formule

$$A = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^n$$

தீர்வு $P = 500$ $R = 10\%$

$$A = P + \frac{PR}{100}$$

$$= P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^n$$

1வது வருடம்

$$A = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)$$

2வது வருடம்

$$A = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^2$$

10வது வருட முடியும்

$$A = P \left(1 + \frac{R}{100}\right)^{10}$$

$$= 500 \left(1 + \frac{10}{100}\right)^{10}$$

N.காமராசு (மு.க)
 கோலிந்த வரது
 காங்கிரஸ் (மா)

$$= 500 \left(\frac{110}{100}\right)^{10} = 500 (1.1)^{10}$$

12) ஒரு நகரத்தின் மைரஸ் நோயாளிகள்
 ஏற்பட்ட சகாதார கேட்டினர் மக்களின்
 இயல்பு உட்கொண்ட மாதிரி கம்பப்படுத்தும்
 ஆவ்வாடு நாளை அந்த நோய்
 தாக்கு மைரஸ் கிடுக்கன் ஒரு 6P
 முறையாக மரபு உருகிறது. இந்த
 தொற்று கிடுக்கன் ஆவ்வாடு நாளை
 அதன் முந்தைய நாளை மோன்
 கிடுக்கமாக மருகுகிறது. அதன்
 நாளை அதன் எண்ணிக்கை
 5 எண் அந்த கிடுக்கனின்
 எண்ணிக்கை அந்த நாளை
 150000 க்கு அதிகமாக இருக்கும்
 என்ன காரணம்.

தீர்வு: $a = 5$

G.P. வரிசை 5, 10, 20, 40, ... 150000

$$a \cdot 2^{n-1} > 150000$$

$$a(2^{n-1}) > 150000$$

$$5(2^{n-1}) > 150000$$

$$2^{n-1} > 30000$$

$$2^{n-1} > 2^4 \times 1875$$

$$\frac{2^{n-1}}{2^4} > 1875$$

$$2^{n-5} > 1875$$

$$\log \text{ எடுக்க இருக்கிறது}$$

$$(n-5) \log 2 > \log 1875$$

$$n-5 > \frac{\log 1875}{\log 2}$$

$$n-5 > \frac{3.2730}{0.3010}$$

$$n-5 > 10.873$$

$$n > 10.873 + 5$$

$$n > 15.873$$

$$n = 15$$

∴ 15வது நாளை 150000 க்கு
 அதிகமாக இருக்கும்

பயன்பி $[5.4]$

$$1. \frac{1}{5+x} = (5+x)^{-1}$$

$$= 5^{-1} \left(1 + \frac{x}{5}\right)^{-1} \left(\because \left|\frac{x}{5}\right| < 1\right)$$

$$= \frac{1}{5} \left(1 - \left(\frac{x}{5}\right) + \left(\frac{x}{5}\right)^2 - \left(\frac{x}{5}\right)^3 + \dots\right)$$

$$= \frac{1}{5} \left(1 - \frac{x}{5} + \frac{x^2}{25} - \frac{x^3}{125} - \dots\right)$$

∴ இது ஏற்கனவேதாக $\left|\frac{x}{5}\right| < 1$

⇒ $|x| < 5$ இருக்க வேண்டும்

(15)

$$(i) \frac{2}{(3+4x)^2} = \frac{2}{3^2(1+\frac{4x}{3})^2}$$

$$= \frac{2}{9} (1 + \frac{4x}{3})^{-2}$$

$$= \frac{2}{9} (1 - 2(\frac{4x}{3}) + 3(\frac{4x}{3})^2 - \dots)$$

$$= \frac{2}{9} (1 - \frac{8x}{3} + 3(\frac{4x}{3})^2 - \dots)$$

$\therefore$ இந்த வரிசை சந்தர்ப்பமாக
கிடைக்க $|\frac{4x}{3}| < 1 \Rightarrow |x| < \frac{3}{4}$
வேண்டும்

$$(ii) (5+x)^{2/3} = 5^{2/3} (1 + \frac{x}{5})^{2/3}$$

$$(1+x)^{p/q} = 1 + \frac{p}{q}x + \frac{p(p-1)}{2!}x^2$$

$$+ \frac{p(p-1)(p-2)}{3!}x^3 + \dots$$

$$5^{2/3} (1 + \frac{x}{5})^{2/3}$$

$$= 5^{2/3} [1 + \frac{2}{3}(\frac{x}{5}) + \frac{2(2-1)}{2!}(\frac{x}{5})^2 + \dots]$$

$$= 5^{2/3} (1 + \frac{2x^2}{15} + \frac{2}{3}(\frac{-1}{3})(\frac{x^4}{25}) + \dots)$$

$$= 5^{2/3} (1 + \frac{2x^2}{15} - \frac{x^4}{225} + \dots)$$

இதது வரிசை சந்தர்ப்பமாக கிடைக்க $|\frac{x^2}{5}| < 1$
 $\Rightarrow |x^2| < 5$ என கிடைக்க வேண்டும்

$$(iv) (x+2)^{-2/3} = 2^{-2/3} (1 + \frac{x}{2})^{-2/3}$$

$$= \frac{1}{2^{2/3}} (1 - \frac{2}{3}(\frac{x}{2}) + \frac{(-2/3)(-2/3-1)}{2!}(\frac{x}{2})^2 + \dots)$$

$$= \frac{1}{2^{2/3}} (1 - \frac{x}{3} + \frac{(-2/3)(-5/3)}{2}(\frac{x^2}{4}) + \dots)$$

$$= \frac{1}{2^{2/3}} (1 - \frac{x}{3} + \frac{5x^2}{36} + \dots)$$

இது சந்தர்ப்பமாக கிடைக்க $|\frac{x}{2}| < 1$
 $\Rightarrow |x| < 2$ வேண்டும்

2) Find $\sqrt[3]{1001}$ தோராயமாக.

$$\sqrt[3]{1001} = (1000+1)^{1/3}$$

$$= 1000^{1/3} (1 + \frac{1}{1000})^{1/3}$$

$$= (10^3)^{1/3} (1 + 0.001)^{1/3}$$

$$= 10 (1 + \frac{0.001}{3} + \frac{1/3(-1/3)}{2!}(0.001)^2 + \dots)$$

$$= 10 (1 + 0.00033 + \dots)$$

$$= 10 (1.00033)$$

$$\approx 10.0033 \text{ (தோராயமாக)}$$

3) x ஒரு தோராயமான அளவாக
மற்ற எண் எண்ணின் $\sqrt[3]{x^3+6} - \sqrt[3]{x^3+3}$
ஊர் கிரிம்கமத் தோராயமாக
 $\frac{1}{x^2}$ என நிரூபிப்பது.

$$\sqrt[3]{x^3+6} - \sqrt[3]{x^3+3}$$

$$= (x^3)^{1/3} (1 + \frac{6}{x^3})^{1/3} - (x^3)^{1/3} (1 + \frac{3}{x^3})^{1/3}$$

$$= x (1 + \frac{6}{x^3})^{1/3} - x (1 + \frac{3}{x^3})^{1/3}$$

$$= x (1 + \frac{1}{3}(\frac{6}{x^3}) + \dots)$$

$$- x (1 + \frac{1}{3}(\frac{3}{x^3}) + \dots)$$

$$= x (1 + \frac{2}{x^3} + \dots) - x (1 + \frac{1}{x^3} + \dots)$$

$$= x + \frac{2}{x^2} - x - \frac{1}{x^2} - \dots$$

$$= \frac{1}{x^2} \text{ (தோராயமாக)}$$

4) x பக்கச்சிறியது எண்ணின்

$\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$ எண் படி தோராயமாக

$1-x+x^2/2$ என நிரூபிப்பது.

$$\sqrt{\frac{1-x}{1+x}} = (1-x)^{1/2}$$

$$= (1-x)^{1/2} (1+x)^{-1/2}$$

$$= \left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{1/2(-1/2-1)}{2!}x^2 + \dots\right)$$

$$\left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{(-1/2)(-1/2-1)}{2!}x^2 + \dots\right)$$

$$= \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{1/2(-1/2)}{2}x^2 + \dots\right)$$

$$\left(1 - \frac{x}{2} + \frac{(-1/2)(-3/2)}{2}x^2 + \dots\right)$$

$$= \left(1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} \dots\right) \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} \dots\right)$$

$$= 1 - \frac{x}{2} + \frac{3}{8}x^2 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^2}{4} + \dots$$

$$= 1 - x + \frac{2x^2}{8} + \frac{x^2}{4} + \dots$$

$$= 1 - x + \frac{x^2}{2} \text{ (தொடர்மமாக)}$$

5) பின்வரும் மறுக்கற்றித் தொடரின் முதல் 6 உறுப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு e^{5x}

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$e^{5x} = 1 + \frac{5x}{1!} + \frac{(5x)^2}{2!} + \frac{(5x)^3}{3!} + \dots$$

$$= 1 + 5x + \frac{25x^2}{2} + \frac{125x^3}{6} + \dots$$

$$(ii) e^{-2x} = 1 - \frac{2x}{1!} + \frac{(2x)^2}{2!} - \frac{(2x)^3}{3!} + \dots$$

$$= 1 - 2x + \frac{4x^2}{2} - \frac{8x^3}{6} + \dots$$

$$= 1 - 2x + 2x^2 - \frac{4x^3}{3} + \dots$$

$$(iii) e^{1/2x} = 1 + \frac{1/2x}{1!} + \frac{(1/2x)^2}{2!} + \frac{(1/2x)^3}{3!} + \dots$$

$$= 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{48} + \dots$$

6) பின்வரும் மடக்கைத் தொடர்களின்

முதல் 4 உறுப்புகளைக் காண்க
N.காமாட்சி (பி.ஆ)
கோவைத் திரை,
காஞ்சிபுரம் (மா)

$$(i) \log(1+4x)$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

$$|x| < 1.$$

$$\log(1+4x) = 4x - \frac{(4x)^2}{2} + \frac{(4x)^3}{3} - \frac{(4x)^4}{4} + \dots$$

$$= 4x - \frac{16x^2}{2} + \frac{64x^3}{3} - \frac{256x^4}{4} + \dots$$

$$= 4x - 8x^2 + \frac{64x^3}{3} - 64x^4 + \dots$$

இது சந்தர்ப்பமாக இருக்க
 $|4x| < 1 \Rightarrow |x| < \frac{1}{4}$ வேண்டும்

$$(i) \log(1-2x) = (-2x) - \frac{(2x)^2}{2} - \frac{(2x)^3}{3} - \frac{(2x)^4}{4} - \dots$$

$$(\because \log(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \dots)$$

$$= -2x - 4\frac{x^2}{2} - 8\frac{x^3}{3} - 16\frac{x^4}{4} - \dots$$

$$= -2x - 2x^2 - 8\frac{x^3}{3} - 4x^4 - \dots$$

இது சந்தர்ப்பமாக இருக்க
 $|2x| < 1 \Rightarrow |x| < \frac{1}{2}$ வேண்டும்

$$(iii) \log\left(\frac{1+3x}{1-3x}\right)$$

$$= \log(1+3x) - \log(1-3x)$$

$$= \left(3x - \frac{(3x)^2}{2} + \frac{(3x)^3}{3} - \frac{(3x)^4}{4} + \dots\right)$$

$$- \left(-3x - \frac{(3x)^2}{2} - \frac{(3x)^3}{3} - \frac{(3x)^4}{4} - \dots\right)$$

$$= 3x - \frac{9x^2}{2} + \frac{27x^3}{3} - \frac{81x^4}{4} + \dots$$

$$+ 3x + \frac{9x^2}{2} + \frac{27x^3}{3} + \frac{81x^4}{4} + \dots$$

$$= 2\left(3x + \frac{27x^3}{3} + \dots\right)$$

இது சந்தர்ப்பமாக இருக்க $|3x| < 1$
 $\Rightarrow |x| < \frac{1}{3}$ வேண்டும்

(17)

∴ இது ஏற்கனவேதான் கிடைக்க
 $|3x| < 1 \Rightarrow |x| < \frac{1}{3}$ என்க.

$$(iv) \log\left(\frac{1-2x}{1+2x}\right)$$

$$\begin{aligned} &= \log(1-2x) - \log(1+2x) \\ &= \left(-2x - \frac{(2x)^2}{2} - \frac{(2x)^3}{3} - \frac{(2x)^4}{4} - \dots\right) \\ &\quad - \left(2x - \frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^3}{3} - \frac{(2x)^4}{4} + \dots\right) \\ &= -2x - \frac{(2x)^2}{2} - \frac{(2x)^3}{3} - \frac{(2x)^4}{4} - \dots \\ &\quad - 2x + \frac{(2x)^2}{2} - \frac{(2x)^3}{3} + \frac{(2x)^4}{4} - \dots \\ &= -2\left(2x + \frac{8x^3}{3} + \dots\right) \\ &\text{இந்த வரிசை ஏற்கனவேதான்.}\end{aligned}$$

$$7) y = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \dots \text{எனில்}$$

$$x = y - \frac{y^2}{2!} + \frac{y^3}{3!} - \frac{y^4}{4!} + \dots$$

எனவே நிறுத்துக

$$\text{தீர்வு } y = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \dots$$

$$-y = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4}$$

$$-y = \log(1-x)$$

$$e^{-y} = 1-x$$

$$x = 1 - e^{-y}$$

$$= 1 - \left(1 - \frac{y}{1!} + \frac{y^2}{2!} - \frac{y^3}{3!} + \dots\right)$$

$$= 1 - 1 + \frac{y}{1!} - \frac{y^2}{2!} + \frac{y^3}{3!} - \dots$$

$$x = y - \frac{y^2}{2!} + \frac{y^3}{3!} - \dots$$

8) P மற்றும் q ஆகியவற்றின் போது P-2
 சிறியது எனில் $\sqrt{\frac{P}{q}} = \frac{(n+1)P + (n-1)q}{(n-1)P + (n+1)q}$ என

நிறுத்துக. இதன் மூலம் $\sqrt{\frac{15}{16}}$ ன் மதிப்பைக்
 காண்க.

தீர்வு

$$P = 2+h.$$

N.கொள்க சி (பு. 26)

கொள்கதவாடி,

கொள்கதவம் (மா)

$$\text{RHS: } \frac{(n+1)P + (n-1)q}{(n-1)P + (n+1)q}$$

$$= \frac{(n+1)(2+h) + (n-1)2}{(n-1)(2+h) + (n+1)2}$$

$$= \frac{n2 + 2 - nh + h + n2 - 2}{n2 - 2 + nh - h + n2 + 2}$$

$$= \frac{2n2 + (n+1)h}{2n2 + (n-1)h}$$

$$= 1 + \frac{\left(\frac{n+1}{2n}\right) \frac{h}{2}}{1 + \left(\frac{n-1}{2n}\right) \cdot \frac{h}{2}}$$

$$= \left[1 + \frac{n+1}{2n} \left(\frac{h}{2}\right)\right] \left[1 + \left(\frac{n-1}{2n}\right) \frac{h}{2}\right]$$

$$= 1 + \frac{n+1}{2n} \left(\frac{h}{2}\right) - \frac{n-1}{2n} \left(\frac{h}{2}\right)$$

$$= 1 + \frac{h}{2(2n)} (n+1 - n+1)$$

$$= 1 + \frac{h}{2(2n)} (2)$$

$$= 1 + \frac{h}{n2}$$

$$\therefore \sqrt{\frac{15}{16}} = \frac{(8+1)15 + (8-1)16}{(8-1)(15) + (8+1)(16)}$$

$$= \frac{9(15) + 7(16)}{7(15) + 9(16)}$$

$$= \frac{135 + 112}{105 + 144} = \frac{247}{249}$$

$$= 0.99196 \text{ (தேர்வுகள்)}$$

9) $\frac{3-4x+x^2}{e^{2x}}$ ன் வரிவன்
 x^4 ன் வகைவைத் காண்.

தீர்வு $\frac{3-4x+x^2}{e^{2x}} = (3-4x+x^2)e^{-2x}$
 $= (3-4x+x^2) \left(1 - \frac{2x}{1!} + \frac{(2x)^2}{2!} - \frac{(2x)^3}{3!} + \dots\right)$
 $= (3-4x+x^2) \left(1 - 2x + \frac{4x^2}{2} - \frac{8x^3}{6} + \frac{16x^4}{24} + \dots\right)$

x^4 ன் வகை

$$= 3\left(\frac{2}{3}\right) - 4\left(\frac{-4}{3}\right) + 1(2)$$

$$= 2 + \frac{16}{3} + 2 = \frac{6+16+6}{3} = \frac{28}{3}$$

10) வரிவன் காண்.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \left(\frac{1}{9^{n-1}} + \frac{1}{9^{2n-1}} \right)$$

தீர்வு

$$S_{\infty} = 1\left(1 + \frac{1}{9}\right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{9^3} \right)$$

$$+ \frac{1}{2^2} \left(\frac{1}{9^2} + \frac{1}{9^5} \right) + \dots$$

$$= \left(1 + \frac{1}{9}\right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{9^3} \right) + \frac{1}{2^2} \left(\frac{1}{9^2} + \frac{1}{9^5} \right) + \dots$$

$$= \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{9} \right) + \frac{1}{2^2} \left(\frac{1}{9^2} \right) + \dots \right] + \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{9^3} \right) + \frac{1}{2^2} \left(\frac{1}{9^5} \right) + \dots \right)$$

$$= \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{9} \right) + \frac{1}{2^2} \left(\frac{1}{9^2} \right) + \dots \right)$$

$$+ \frac{1}{9} \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{9^2} \right) + \frac{1}{2^2} \left(\frac{1}{9^4} \right) + \dots \right)$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{1}{18}} + \frac{1}{9} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{81 \times 2}} \right)$$

($a=1, r=\frac{1}{18}$) ($a=1, r=\frac{1}{81 \times 2}$)

$$= \frac{1}{\frac{18-1}{18}} + \frac{1}{9} \left(\frac{1}{\frac{162-1}{162}} \right)$$

$$= \frac{18}{17} + \frac{1}{9} \left(\frac{162}{161} \right) \quad \left(S_{\infty} = \frac{a}{1-r} \right)$$

$$= \frac{18}{17} + \frac{162}{1449} = \frac{26082 + 2754}{17 \times 1449}$$

$$= \frac{28836}{24633} = 1.170$$

N.காமராசு (உ.அ.)
 கோவைத் தலைவர்
 கண்காணிப்பு (மா)

Formula

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\log(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \dots$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$$

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2} x^2 + \frac{n(n-1)(n-3)}{1 \cdot 2 \cdot 3} x^3 + \dots$$

$$5) (1+x)^{-n} = 1 - nx + \frac{n(n+1)}{2!} x^2 - \frac{n(n+1)(n+2)}{3!} x^3 + \dots$$

$$6) (1-x)^n = 1 - nx + \frac{n(n-1)}{2!} x^2 - \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} x^3 + \dots$$

$$7) (x+a)^n = x^n + n C_1 x^{n-1} a + n C_2 x^{n-2} a^2 + \dots + n C_r x^{n-r} a^r + \dots + a^n$$

$$8) T_{n+1} = n C_r x^{n-r} a^r$$

$$9) 1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$10) 1^2+2^2+\dots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$11) 1^3+2^3+\dots+n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$$

பாடம் : 9 வகை வகை கண்காட்சி (சான்றிதழ்) ① மத்திய தொழில் கல்வித் துறை

பயிற்சி 9.1

1. 1 முதல் 6 வரை உள்ள கண்காட்சி கண்காட்சி கண்காட்சி கண்காட்சி (calculator) பயன்படுத்தி அட்டவணைப் பூர்த்தி செய்து அதன் மூலம் சான்றிதழ் மதிப்பைக் கண்காட்சி

(i) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-x-2}$

x	1.9	1.99	1.999	2.001	2.01	2.1
f(x)	0.344	0.3344	0.3344	0.333	0.3322	0.322

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-x-2} = 0.3$

2) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4}$

x	1.9	1.99	1.999	2.001	2.01	2.1
f(x)	0.2564	0.2506	0.25	0.2499	0.2498	0.2439

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} = 0.25$

3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{3}}{x}$

x	-0.1	-0.01	-0.001	0.01	0.1
f(x)	0.29	0.288	0.289	0.288	0.286

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{3}}{x} = 0.288$

4) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{1-x} - 2}{x+3}$

x	-3.1	-3.01	-3.0	-2.999	-2.99	-2.9
f(x)	-0.248	-0.249	0	-0.25	-0.25	-0.2515

$\therefore \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt{1-x} - 2}{x+3} = -0.25$

5) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

x	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
f(x)	0.998	0.999	0.9999	0.9999	0.999	0.998

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x}$

x	-0.1	-0.01	-0.001	0.001	0.01	0.1
f(x)	0.0000152	0.00000152	0.000000152	0.000000152	0.00000152	0.0000152

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$

7) 7 முதல் 15 வரை உள்ள கண்காட்சிகளுக்கு வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி சான்றிதழ் மதிப்பைக் கண்காட்சி செய்து அதன் மூலம் சான்றிதழ் மதிப்பைக் கண்காட்சி

7) $\lim_{x \rightarrow 3} (4-x)$


N. Kamatchi (PG Asst)
GHS, Govindavadi
Kanchipuram (Dist)



$\lim_{x \rightarrow 3^-} (4-x) = 4-3 = 1$

$\lim_{x \rightarrow 3^+} (4-x) = 4-3 = 1$

$\lim_{x \rightarrow 3} (4-x) = 1$




$\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2+2) = 1^2+2 = 3$

$\lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2+2) = 1^2+2 = 3$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} x^2+2 = 3$

9) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ கிடைக்க $f(x) = \begin{cases} 4-x, & x \neq 2 \\ 0, & x = 2 \end{cases}$



$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2$

$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 2$

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$

10) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ கிடைக்க $f(x) = \begin{cases} x^2+2, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$




$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1^2+2 = 3$


$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3$

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$

11)



12)



13) $\lim_{x \rightarrow 1} \sin \pi x$

$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$


$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$

14) $\lim_{x \rightarrow 0} \sec x$


$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$


$\lim_{x \rightarrow 0} \sec x = 1$



$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$




15) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x$



$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = \infty$; $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan x$ என்னவென்று இன்ன

16) $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 2 \\ 8-2x & 2 < x \leq 4 \\ 4 & x > 4 \end{cases}$ $f(x)$ என்றதன் மூலம்


உருவகம் x_0 ன் சந்திப்பைக் காண்க $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ என்றதன் மூலம் காண்கN. Kamatchi
G.H.S.S, Govindavadi
Kanchipuram. $\therefore$ தொடக்கம் $x = 4$ ன்

தொடக்கம் காண்க

$\therefore \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$

 $\therefore x = 4$ ன் தொடக்கம் காண்க
மூலம் இன்ன. $\therefore x_0 = 4$ என்ற தொடக்கம் காண்க
மூலம் காண்க $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ என்றதன் மூலம்

17) $f(x) = \begin{cases} \sin x & x < 0 \\ 1 - \cos x & 0 \leq x \leq \pi \\ \cos x & x > \pi \end{cases}$

 $f(x)$ என்றதன் மூலம் x_0 ன் தொடக்கம் காண்க $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ என்றதன் மூலம் காண்க.


இங்கு $\lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x)$

 $\therefore x_0 = \pi$ என்ற தொடக்கம் காண்க $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ என்றதன் மூலம் காண்க18) தொடக்கம் காண்க $x = 4$ ன் தொடக்கம் காண்க(i) $f(0)$ என்றதன் மூலம் காண்க

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 4, f(2) = 6$

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 8$

(3)




N. Kamatchi
G. HSS, Govindavadi
Kanchipuram.

$$11) f(-2)=0, f(2)=0$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 0$$

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ என்ற எண்ண மதிப்பு இல்லை



$$19) \lim_{x \rightarrow 8} f(x) = 25 \text{ என்ற குறியிட 6}$$

முறையாக மொடுகளைச் சுருக்கமாக
விளக்கம்.
x இன் மதிப்பு 8 க்கு இடம்பெருகும்
8 க்கு அருகே, 8 ஐ தருகிற
மொடு, f(x) இன் மதிப்பு 25 க்கு மிக
அருகில் வரும் என்பது கிதன்
குறிப்பிடுகிறது.

$$(i) \lim_{x \rightarrow 8^-} f(x) = 25$$

$$\lim_{x \rightarrow 8^+} f(x) = 25$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 8} f(x) = 25$$

20) $f(2)=4$ எனில் x இன் மதிப்பு 2 ஐ
தருகிறதும் மொடு $f(x)$ இன் எண்ண
மதிப்பை மற்ற ஓரேஜை முடிய தரும்
கியவா?

ஆக சார்பின் குறியிடப்பட புள்ளியின்
எண்ண மதிப்பானது அச்சார்பு அம்புள்ள
- யின் உறையறுக்கப்பட்டதை சார்த்து
அமைவதில்லை.

i. $f(2)=4$ என $x=2$ ன் சார்பு f
உறையறுக்கப்பட்டு இருந்தாலும், $x=2$ ன்
அச்சார்பின் எண்ண மதிப்பை மற்ற
முடிய தரும் கியவா.

21) x இன் மதிப்பு 4 ஐ தருகிறதும் மொடு
 $f(x)$ இன் எண்ண மதிப்பு 4 எனில்
 $f(2)$ இன் மற்ற ஓரேஜை முடிய தரும்
கியவா? விடைக்கான விளக்கம் தரு.

தீர்வு ஒரு சார்பிற்கு எண்ண மதிப்பு
குறியிடப்பட புள்ளியின் கிடுக்க வேண்டும்
எனின் அச்சார்பு, அம்புள்ளியின்
அண்ணமம் படுதியின் உறையறுக்கம்
பட்டிருந்தால் போதுமானது. அக்குறியி
பிட்ட புள்ளியின் உறையறுக்கம் பட்ட
வேண்டிய அவசியமில்லை.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4 \text{ என இருந்தாலும்}$$

(அ-த) $x=2$ ன் சார்பிற்கு எண்ண
மதிப்பு இருந்தாலும், $f(2)$ உறையறுக்க
பட்டிருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

$$22) f(3^-) \text{ மற்றும் } f(3^+) \text{ கண்டு, அமர்ந்தால்}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3} \text{ க்கு மதிப்பு கிடுக்க}$$

மொறான் அந்த மதிப்பைக் காண்க.

$$\text{தீர்வு } f(3^-) = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x^2-9}{x-3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{(x+3)(x-3)}{(x-3)} = 3+3=6$$

$$f(3^+) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2-9}{x-3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{(x+3)(x-3)}{(x-3)} = 3+3=6$$

$$f(3^-) = f(3^+) \text{ என்பதால்}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3} = 6 \text{ ஆகும்}$$

$$23) f(x) = \begin{cases} \frac{x-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$$

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ இன் மதிப்பு உண்டா
என்பதை சரிபார்க்க.

$$\text{தீர்வு } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(x-1)}{(x-1)} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-(x-1)}{(x-1)} = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$$

என்கதி $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ ன் உதிகி
கொண்ட கவனமுட.

உதார்த்த 9.2

$$\begin{aligned} 1) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 2^4}{x - 2} \\ &= 4(2^4 - 1) = 4(2^3) \\ &= 4 \times 8 = 32 \end{aligned}$$

Formula $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = na^{n-1}$

$$\begin{aligned} 2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1}, m, n \rightarrow \infty \text{ என்னும் } \\ = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1} \\ = \frac{m(1)^{m-1}}{n(1)^{n-1}} = \frac{m}{n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \lim_{\sqrt{x} \rightarrow 3} \frac{x^2 - 81}{\sqrt{x} - 3} \\ = \lim_{\sqrt{x} \rightarrow 3} \frac{x^4 - 3^4}{\sqrt{x} - 3} \\ = 4(3)^{4-1} = 4(3^3) \\ = 4(27) = 108 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \quad x > 0 \\ x+h = y \text{ என்க } h = y - x \\ h \rightarrow 0 \text{ என்க } y \rightarrow x \\ = \lim_{y \rightarrow x} \frac{\sqrt{y} - \sqrt{x}}{y - x} = \lim_{y \rightarrow x} \frac{y^{1/2} - x^{1/2}}{y - x} \\ = \frac{1}{2} (x)^{1/2-1} = \frac{1}{2} x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x+4} - 3}{x - 5} \\ x+4 = y \text{ என்க } \therefore x = y - 4 \\ x - 5 = y - 4 - 5 \\ x - 5 = y - 9 \\ x \rightarrow 5 \text{ என்க } y \rightarrow 9 \\ \therefore \lim_{y \rightarrow 9} \frac{\sqrt{y} - 9^{1/2}}{y - 9} = \lim_{y \rightarrow 9} \frac{y^{1/2} - 9^{1/2}}{y - 9} \\ = \frac{1}{2} 9^{1/2-1} = \frac{1}{2} 9^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{9}} \\ = \frac{1}{2(3)} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1/x - 1/2}{x - 2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^{-1} - 2^{-1}}{x - 2} \\ &= (-1) 2^{-1-1} = (-1) 2^{-2} = \frac{-1}{2^2} \\ &= \frac{-1}{4} \end{aligned}$$

N. Kamatchi (PG Asst)
G.H.S.S, Govindavadi
Kanchipuram (Dt)

$$\begin{aligned} 7) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - x^2}{1 - \sqrt{x}} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1 + x^2 - 1}{1 - \sqrt{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1 - (x^2 - 1)}{1 - \sqrt{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{1 - \sqrt{x}} - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{1 - \sqrt{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(1 - \sqrt{x})}{(1 - \sqrt{x})} + \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1^2}{\sqrt{x} - 1} \\ &= -1 + \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1^2}{x^{1/2} - 1^{1/2}} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ என்க } \frac{m}{n} \right) \\ &= -1 + \frac{2}{1/2} = -1 + 4 \\ &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+1} - 1}{\sqrt{x^2+16} - 4} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sqrt{x^2+1} - 1}{x^2}}{\frac{\sqrt{x^2+16} - 4}{x^2}} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+1} - 1}{x^2} \cdot \frac{x^2}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2+16} - 4}{x^2}} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l|l} x^2+1 = y & x^2+16 = z \\ x^2 = y-1 & x^2 = z-16 \\ x \rightarrow 0 \Rightarrow y \rightarrow 1 & x \rightarrow 0 \Rightarrow z \rightarrow 16 \end{array}$$

(5)

$$= \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^{1/2} - 1^{1/2}}{y - 1} = \frac{1/2 (1)^{1/2-1}}{1/2 (16)^{1/2-1}}$$

$$= \frac{1}{16^{-1/2}} = 16^{1/2} = \sqrt{16} = 4.$$

9) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}$

$1+x = y$ எனில் $x = y - 1$
 $x \rightarrow 0$ எனில் $y \rightarrow 1$

$$= \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^{1/2} - 1^{1/2}}{y - 1} = \frac{1/2 (1)^{1/2-1}}{1/2 (1)^{1/2-1}} = \frac{1}{2}$$

10) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{7+x^3} - \sqrt{3+x^2}}{x-1}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{7+x^3} - 2 - \sqrt{3+x^2} + 2}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{7+x^3} - 2}{x-1} - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3+x^2} - 2}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{7+x^3} - 2}{x^3 - 1} - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3+x^2} - 2}{x^2 - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^3-1} - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1}$$

$7+x^3 = y$ எனில் $x \rightarrow 1$ எனில் $y \rightarrow 8$
 $y-8 = 7+x^3-8 = x^3-1$

$3+x^2 = z$ எனில் $x \rightarrow 1$ எனில் $z \rightarrow 4$
 $z-4 = x^2+3-4 = x^2-1$

$$= \lim_{y \rightarrow 8} \frac{y^{1/3} - 8^{1/3}}{y-8} - \lim_{z \rightarrow 4} \frac{z^{1/2} - 4^{1/2}}{z-4}$$

$$= \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{x-1}} - \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1}}$$

$$= \frac{1/3 (8)^{1/3-1}}{1/2 (4)^{1/2-1}} - \frac{1/2 (4)^{1/2-1}}{1/2 (1)^{1/2-1}}$$

$$= 8^{-2/3} - 4^{-1/2} = \frac{1}{8^{2/3}} - \frac{1}{4^{1/2}}$$

$$= \frac{1}{(2^3)^{2/3}} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2}$$

$$= -\frac{1}{4}.$$

11) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 - \sqrt{x+2}}{\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{4-x}}$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 - \sqrt{x+2}}{x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{x-2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[3]{4-x} - \sqrt[3]{2}}{x-2}$$

N. Kamatchi (PG Asst)
 GHS, Govindavadi,
 Kanchipuram (Dt)

5) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 - \sqrt{x+2}}{\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{4-x}}$

$x+2 = y$ எனில் $x \rightarrow 2 \Rightarrow y \rightarrow 4$
 $x = y - 2$
 $x-2 = y-4$

ii) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+2} - 2}{x-2}$

$4-x = z$ எனில் $4-z = x$
 $x \rightarrow 2 \Rightarrow z \rightarrow 2$
 $x-2 = 4-z-2 = 2-z = -(z-2)$

$$= \lim_{y \rightarrow 4} \frac{y^{1/2} - 4^{1/2}}{y-4} - \lim_{z \rightarrow 2} \frac{z^{1/3} - 2^{1/3}}{z-2}$$

$$= \frac{1/2 (4)^{1/2-1}}{1/3 (2)^{1/3-1}} = -\frac{3}{2} \frac{4^{-1/2}}{2^{-2/3}}$$

$$= -\frac{3}{2} \frac{(2^{2/3})}{4^{1/2}} = \frac{-3}{2 \times 2} (2^2)^{1/3}$$

$$= \frac{-3}{4} (4^{1/3}) = \frac{-3}{4} \times \sqrt[3]{4}$$

12) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x^2} \cdot x$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x$$

$1+x^2 = y$ எனில் $x \rightarrow 0$ எனில் $y \rightarrow 1$

$$= \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^{1/2} - 1^{1/2}}{y-1} \times 0$$

13) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x} - 1}{x^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x} - 1}{-x} \cdot \frac{1}{-x}$$

$$1-x=y \text{ எனில் } -x=y-1$$

$$x \rightarrow 0 \text{ எனில் } y \rightarrow 1$$

$$= \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^{1/2} - 1^{1/2}}{y-1} \times \left(\frac{-1}{0} \right)$$

$$= \frac{1}{2} (1)^{1/2-1} (-\infty)$$

$$= -\infty$$

$x \rightarrow 0$ எனில் $f(x) \rightarrow -\infty$
எனவே $f(x)$ இல்லை.

$$14) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x-1}-2}{x-5}$$

$$x-1=y \text{ எனில் } x=y+1$$

$$x-5=y+1-5=y-4$$

$$\text{எனவே } x \rightarrow 5 \text{ எனில் } y \rightarrow 4$$

$$= \lim_{y \rightarrow 4} \frac{y^{1/2} - 4^{1/2}}{y-4} = \frac{1}{2} (4)$$

$$= \frac{1}{2} (4)^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2 \times 2}$$

$$= \frac{1}{4}$$

$$15) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x-b}-\sqrt{a-b}}{x^2-a^2} \quad (a > b)$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x-b}-\sqrt{a-b}}{(x+a)(x-a)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x-b}-\sqrt{a-b}}{x-a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x+a}$$

$$x-b=y \text{ எனில் } x=y+b$$

$$x-a=y+b-a$$

$$= y-(a-b)$$

$$x \rightarrow a \text{ எனில் } y \rightarrow a-b$$

$$= \lim_{y \rightarrow (a-b)} \frac{y^{1/2} - (a-b)^{1/2}}{y-(a-b)} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x+a}$$

$$= \frac{1}{2} (a-b)^{1/2-1} \cdot \frac{1}{a+a}$$

$$= \frac{1}{2} (a-b)^{-1/2} \cdot \frac{1}{2a} = \frac{1}{4a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a-b}}$$

$$= \frac{1}{4a\sqrt{a-b}}$$

உதாரணை 7.3

1. கீழ்க் கருவிகளைக் கொண்டு, கீழ்க்கண்ட
எதிர்வினைகளின் எதிர்வினைகளைக் காண்க.

$$(a) \quad x = -2 \text{ ன் } f(x) = \frac{x^2-4}{(x^2+4x+4)(x+3)}$$

தீர்வு

$$f(x) = \frac{x^2-4}{(x^2+4x+4)(x+3)}$$

$$= \frac{(x-2)(x+2)}{(x+2)^2(x+3)} = \frac{x-2}{(x+2)(x+3)}$$

$$f(-2^-) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(-2-h)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(-2-h)-2}{(-2-h+2)(-2-h+3)}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-4-h}{-h(1-h)} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{4+h}{h(1-h)}$$

$$= \frac{4}{0} = \infty$$

$$f(-2^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f(-2+h)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(-2+h)-2}{(-2+h+2)(-2+h+3)}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-4+h}{h(1+h)} = \frac{-4}{0} = -\infty$$

(b) $x = \frac{\pi}{2}$ எனில் $f(x) = \tan x$
தீர்வு $f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$

$$f\left(\frac{\pi}{2}^-\right) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f\left(\frac{\pi}{2}-h\right)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}-h\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2}-h\right)}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\cosh}{\sinh} = \frac{1}{0} = \infty$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}^+\right) = \lim_{h \rightarrow 0^+} f\left(\frac{\pi}{2}+h\right)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2}+h\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2}+h\right)}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\cosh}{-\sinh} = \frac{-1}{0} = -\infty$$

N. Kamatchi (PG Assistant)
GHS, Govindavadi,
Kanchipuram (DT).

(7)

$$2) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2(x^2 - 6x + 9)} \text{ ஸ்திரிதரணம்}$$

$$\text{fncy } f(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2(x^2 - 6x + 9)}$$

$$= \frac{(x+3)(x-3)}{x^2(x-3)^2}$$

$$= \frac{x+3}{x^2(x-3)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+3}{x^2(x-3)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+3}{x^2} \times \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3}$$

$$= \frac{6}{9} \times \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3}$$

$$f(x) \rightarrow \infty \text{ as } x \rightarrow 3^+ \text{ ஸ்திரிதரணம்}$$

$$x \rightarrow 3^- \text{ ஸ்திரிதரணம் } f(x) \rightarrow -\infty$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 3} f(x) \text{ ஸ்திரிதரணம் ஸ்திரிதரணம்}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x-2} - \frac{2x+11}{x^2+x-6}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{x-2} - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+11}{x^2+x-6}$$

$$= \frac{3}{\infty} - \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2/x + 11/x^2}{1 + 1/x - 6/x^2}$$

(x ஸ்திரிதரணம்)

$$= 0 - 0 = 0$$

$$4) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + x}{x^4 - 3x^2 + 1}, \text{ x}^4 \text{ ஸ்திரிதரணம்}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x + 1/x^3}{1 - 3/x^2 + 1/x^4} = \frac{0+0}{1-0+0} = \frac{0}{1}$$

$$= 0$$

$$5) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4 - 5x}{x^2 - 3x + 1}$$

$$x^2 \text{ ஸ்திரிதரணம்}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 5/x}{1 - 3/x + 1/x^2}$$

$$= \infty \therefore \text{ ஸ்திரிதரணம் ஸ்திரிதரணம் ஸ்திரிதரணம்}$$

$$6) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1+x-3x^3}{1+x^2+3x^3}, \text{ x}^3 \text{ ஸ்திரிதரணம்}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x^3 + 1/x^2 - 3}{1/x^3 + 1/x + 3} = \frac{0+0-3}{0+0+3} = \frac{-3}{3}$$

$$= -1$$

$$7) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{2x^2-1} - \frac{x^2}{2x+1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^4 + x^3 - 2x^4 + x^2}{4x^3 + 2x^2 - 2x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + x^2}{4x^3 + 2x^2 - 2x - 1}$$

N. Karmatchi (PG Asst)
GHS, Govindavadi,
Kanchipuram (T)

$$x^3 \text{ ஸ்திரிதரணம்}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 1/x}{4 + \frac{2}{x} - \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x^3}} = \frac{1}{4}$$

$$8) \text{ ஸ்திரிதரணம்}$$

$$(i) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+2+3+\dots+n}{3n^2+7n+2} = \frac{1}{6}$$

$$\text{LHS} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2(3n^2+7n+2)}$$

$$n^2 \text{ ஸ்திரிதரணம்}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+n}{6n^2+14n+4}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+1/n}{6 + \frac{14}{n} + \frac{4}{n^2}} = \frac{1}{6}$$

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2+2^2+\dots+(3n)^2}{(1+2+\dots+5n)(2n+3)} = \frac{9}{25}$$

$$\text{LHS} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{6}(3n+1)(6n+1)}{\frac{1}{2}5n(5n+1)(2n+3)}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2(3+1/n)(6+1/n)}{5n^2(5+1/n)(2+3/n)}$$

$$= \frac{3 \times 6}{5 \times 5 \times 2} = \frac{9}{25}$$

(iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$
 மொத்த கிடைக்கிறது.
 $= 1$

$$t_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

$$\text{HHS: } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum t_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \frac{1}{n+1} = 1 - 0 = 1$$

9) மீன் உள் அறிவாயலின் முக்கிய பிரச்சனை நிரோஸ்களின் உள் முட்டையிடத் தகுதியான மீன்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிட்டு இந்த தகவலையும் மயன் மருத்த கிணம் மருத்த களத்தின் அழற்சுக்குள் சூழலும் மீன் பிழியுக்குத் தகுந்த மீன்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுவதாகும். எனவே முட்டையிடும் விவசாயம் உள் மீன்களின் எண்ணிக்கை மூலம் R எனவே மீன் பிழியுக்குத் தகுந்த மீன்களின் எண்ணிக்கையாகும். பிழிபட்டன் வேளாண் கிணம் மருத்தச் சார்பு $R(S) = \frac{S}{\alpha S + \beta}$ இங்கு α, β எண்மன மூலக மாறிலிகள் இத்தச் சார்பு கிணம் மருத்த விவசாயம் கிருகம் மீன்களின்

தண்ணீர்களை தேவையான அளவு
அதிகரிக்கப் போது அனுபவடைத் தெந்தெந்த
மீன்களின் தண்ணீர்களை தேவையான
பொறியியாக அமைப்பும் அண்மிக்க.

Soln $R(s) = \frac{s}{\alpha s + \beta}$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} R(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s}{\alpha s + \beta}.$$

ச சூன் ௨௫௧௧

$$= \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{s + \beta/s} = \frac{1}{\alpha + 0} = \frac{1}{\alpha}$$

திரு வுரு மாநிலி.

10) யுடு தொட்டியை 5000 விட்டம் கிளர்ந்து
உள்ளது என்க. யுடு விட்டத்துக்கு 30 க்
அளவு உயர் தொண்ட உயர்ந்து 25 வி/ந்
தான் அளவான தொட்டியை தொடுத்துப்
படுகின்றது. 6 விட்டங்களின் கிட்டு
உயர்ந்து அளவு (கிட்டு) (விட்டம்)

$$C(t) = \frac{30t}{200+t} \text{ or } 30 \ln(400+2t) \text{ mg}$$

$t \rightarrow$ മ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കുക ?

उत्तर $C(t) = \frac{30t}{200+t}$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{30t}{200+t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{30}{\frac{200}{t} + 1} = \frac{30}{1} = 30$$

பயிற்சி 9.4

மதிப்பைக் காண்க.

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x-1}{\sqrt{1+x}-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{\sqrt{1+x} - 1} \times \frac{\sqrt{1+x} + 1}{\sqrt{1+x} + 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{(1+x)^2} \cdot (\sqrt{1+x} + 1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{x} (\sqrt{1+x} + 1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{1+x} + 1)$$

$$= \log_3 (\sqrt{1+1}) = \log_3 (2) = \log_3 2$$

தமிழ் :- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$

$$2) \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$$

3) $\lim_{x \rightarrow 0} (x+1)^{1/x} = e$

$$4) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = e^k.$$

(9)

புறக்கி 9.4

1) பின்வருகியவற்றின் மதிப்பைக் காண்க

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 1/x)^{7x} = \left[\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 1/x)^x \right]^7$$

$$= e^7$$

2) $\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{1/3x} = \left[\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{1/x} \right]^{1/3}$

$$= e^{1/3}$$

3) $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + K/x)^{m/x} = (1+0)^0 = 1^0 = 1$

4) $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{3}{x})^{x+2} = \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{3}{x})^x \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{3}{x})^2$

$$= e^3 \cdot (1^2) = e^3$$

5) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2+3}{2x^2+5} \right)^{8x^2+3}$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2+5-2}{2x^2+5} \right)^{4(2x^2+5)-17}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{2x^2+5} \right)^{4(2x^2+5)-17}$$

$y = 2x^2 + 5$ எனில்
 $x \rightarrow \infty$ எனில் $y \rightarrow \infty$.

$$= \lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{y} \right)^{4y-17}$$

$$= \lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{y} \right)^{4y} \times \lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{y} \right)^{-17}$$

$$= (e^{-2})^4 (1)^{-17} = e^{-8}$$

6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 \frac{x}{2}}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 \left(\frac{x}{2} \right)}{\left(\frac{x^3}{8} \right)}$

$$= \lim_{\frac{x}{2} \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^3 \cdot \frac{1}{8}$$

$$= 1 \left(\frac{1}{8} \right) = \frac{1}{8}$$

$\left[\because \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta}{\theta} = 1 \right]$

7) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha x}{\sin \beta x} = \lim_{\alpha x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha x}{\alpha x} \cdot \frac{\alpha x}{\beta x} \cdot \lim_{\beta x \rightarrow 0} \frac{\sin \beta x}{\beta x} \cdot \beta x$

$$= \frac{1 \cdot \alpha}{1 \cdot \beta} = \frac{\alpha}{\beta}$$

8) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\sin 5x} = \lim_{2x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{2x} \cdot 2x \cdot \lim_{5x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{5x} \cdot 5x$

$$= \frac{1(2)}{1(5)} = \frac{2}{5}$$

9) $\lim_{d \rightarrow 0} \frac{\sin(d)^n}{(\sin d)^m}$

$$= \lim_{d \rightarrow 0} \frac{\sin d^n}{d^n} \cdot d^n$$

$$\left(\lim_{d \rightarrow 0} \frac{\sin d}{d} \right)^m \cdot d^m$$

$$= \frac{1 \cdot d^n}{1 \cdot d^m} = d^{n-m}$$

Case (i) $n = m$ $\lim_{d \rightarrow 0} \frac{\sin d^n}{(\sin d)^m} = d^0 = 1$

Case (ii) $n > m$ எனில்
 $\lim_{d \rightarrow 0} \frac{\sin d^n}{(\sin d)^m} = 0$

Case (iii) $n < m$ எனில்
 $\lim_{d \rightarrow 0} \frac{\sin d^n}{(\sin d)^m} = \infty$

10) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a+x) - \sin(a-x)}{x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos \left(\frac{a+x+a-x}{2} \right) \sin \left(\frac{a+x-x}{2} \right)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos a \sin x}{x} = 2 \cos a \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

$$= 2 \cos a (1) = 2 \cos a$$

$\left[\because \sin C - \sin D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \sin \frac{C-D}{2} \right]$

$$11) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + a^2} - a}{\sqrt{x^2 + b^2} - b}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 + a^2)^{1/2} - (a^2)^{1/2}}{(x^2 + b^2)^{1/2} - (b^2)^{1/2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 + a^2)^{1/2} - (a^2)^{1/2}}{x^2}$$

$$= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + b^2)^{1/2} - (b^2)^{1/2}}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 + a^2)^{1/2} - (a^2)^{1/2}}{(x^2 + a^2) - a^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 + b^2)^{1/2} - (b^2)^{1/2}}{(x^2 + b^2) - b^2}$$

$$= \frac{1/2 (a^2)^{1/2-1}}{1/2 (b^2)^{1/2-1}} = \frac{(a^2)^{-1/2}}{(b^2)^{-1/2}}$$

$$= \frac{a^{-1}}{b^{-1}} = \frac{b}{a}$$

N. Kamatchi (PG, Asst)
G. HSS, Govindavadi
Kanchipuram (Ct)

$$12) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \arcsin x}{3x} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} x}{x}$$

$$= \frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3}$$

$$13) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 x/2}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x/2}{(x/2)^2} \cdot \frac{1}{2} = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x/2}{x/2} \right)^2 \cdot \frac{1}{2}$$

$$= 1^2 \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

$$14) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x} = \lim_{2x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{2x} \times 2$$

$$= (1)(2) = 2$$

$$15) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 3^x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1 + 3^x - 1}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{x} = \log 2 - \log 3$$

$$= \log \frac{2}{3}$$

$$16) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{\sqrt{x+1} - 1} \times \frac{\sqrt{x+1} + 1}{\sqrt{x+1} + 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3^x - 1)(\sqrt{x+1} + 1)}{(x+1) - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x+1} + 1)$$

$$= \log 3 (\sqrt{1} + 1) = \log 3 (2)$$

$$= 2 \log 3 = \log 3^2 = \log 9$$

$$17) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x \sin 2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x (2 \sin x \cos x)}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x}$$

$$= \frac{1}{2} \times 1 \times 1 = \frac{1}{2}$$

$$18) \lim_{x \rightarrow 0} x \left(3^{1/x} + 1 - \cos\left(\frac{1}{x}\right) - e^{1/x} \right)$$

$$1/x = y \text{ as } x \rightarrow 0$$

$$= \lim_{y \rightarrow \infty} y \left(3^y - 1 + 1 - \cos y + 1 - e^y \right)$$

$$\frac{1}{y} = y \text{ as } y \rightarrow \infty \text{ as } y \rightarrow \infty$$

$$\therefore x = \frac{1}{y}$$

$$= \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{3^y - 1 + 1 - \cos y + 1 - e^y}{y}$$

$$= \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{3^y - 1}{y} + \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos y}{y} + \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{1 - e^y}{y}$$

$$= \log 3 + \lim_{y/2 \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 y/2}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y}$$

$$= \log 3 + \lim_{y/2 \rightarrow 0} \frac{\sin^2 y/2}{y/2} = 1$$

$$= \log 3 + 1 = \log 3$$

(ii)

$$19) \lim_{x \rightarrow \infty} x (\log(x+a) - \log x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\frac{\log(x+a)}{x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} x \log \left(1 + \frac{a}{x} \right)$$

$$\frac{1}{x} = y \text{ எனில் } y \rightarrow 0$$

$$x \rightarrow \infty \text{ எனில் } y \rightarrow 0$$

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \log \left(\frac{1+ay}{y} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \log \frac{(1+ay)^a}{ay}$$

$$= a \times 1 = a$$

$$20) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin 3x}{\sin 2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(3x-3\pi)}{\sin(2x-2\pi)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin(3x-3\pi)}{3x-3\pi} \cdot \frac{2x-2\pi}{\sin(2x-2\pi)}$$

$$= \lim_{3x \rightarrow 3\pi} \frac{\sin(3x-3\pi)}{3x-3\pi} \cdot \lim_{2x \rightarrow 2\pi} \frac{\sin(2x-2\pi)}{2x-2\pi} \cdot \frac{(2x-2\pi)}{(3x-3\pi)}$$

$$= \lim_{3x \rightarrow 3\pi} \frac{(1)}{(1)} \cdot \frac{\lim_{3x \rightarrow 3\pi} (3x-3\pi)}{\lim_{2x \rightarrow 2\pi} (2x-2\pi)}$$

$$= \frac{3}{2}$$

$$21) \lim_{x \rightarrow \pi} (1+\sin x)^{2 \operatorname{cosec} x}$$

$$\sin x = y \text{ எனில் } \operatorname{cosec} x = \frac{1}{y}$$

$$x \rightarrow \pi \text{ எனில் } y \rightarrow 0$$

$$= \lim_{y \rightarrow 0} (1+y)^{\frac{2}{y}} = e^2$$

$$22) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} - \sqrt{1+\cos x}}{\sin^2 x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} - \sqrt{2 \cos^2 \frac{x}{2}}}{\sin^2 x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} - \sqrt{2} \cos \frac{x}{2}}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} (1 - \cos \frac{x}{2})}{\sin^2 x}$$

$$= \sqrt{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{4}}{\sin^2 x}$$

$$= \sqrt{2} (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{x}{4}}{(\frac{x}{4})^2} \left(\frac{x}{4} \right)^2$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} \cdot x^2$$

$$= 2 \sqrt{2} \cdot \frac{1}{16} \cdot \frac{(1)}{(1)} = \frac{\sqrt{2}}{8}$$

$$23) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}}{\tan x}$$

N. Kamatchi (PG Asst)
GHS, Govindavadi
Kanchipuram (T)

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+\sin x} - \sqrt{1-\sin x}) (\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x})}{\tan x (\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+\sin x) - (1-\sin x)}{\tan x (\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x}{\sin x (\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x \cos x}{\sin x (\sqrt{1+\sin x} + \sqrt{1-\sin x})}$$

$$= \frac{2 \cos 0}{\sqrt{1+\sin 0} + \sqrt{1-\sin 0}} = \frac{2 \times 1}{\sqrt{1} + \sqrt{1}}$$

$$= \frac{2}{1+1} = \frac{2}{2} = 1$$

$$24) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 4x + 2} \right)^x$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2 - 4x + 2 + 2x - 1}{x^2 - 4x + 2} \right)^x$$

$$\left(\lim_{x \rightarrow a} (1+f(x)) \right)^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x-1}{x^2-4x+2} \right)^x$$

$$f(x) = \frac{2x-1}{x^2-4x+2}, \quad g(x) = \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x-1}{x^2-4x+2} \div \frac{1}{x} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2-x}{x^2-4x+2}$$

$$= e$$

$$= e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(2-1/x)}{x^2(1-4/x+2/x^2)}$$

$$= e \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2-1/x}{1-4/x+2/x^2} = e$$

$$= e^2$$

(25-28 கனக்கு கடைசி பக்கம் பார்க்க)
பயிற்சி 9.5

1) $f(x) = 2x^2 + 3x - 5$, R ன் என்ன
புள்ளிகளில் தொடர்ச்சியானது
புள்ளியாக.

தீர்வு $f(x) = 2x^2 + 3x - 5$
என்பது மெய்யுறவு கோவை சார்பு

$\therefore f$ ஆனது R ன் எல்லாம்
புள்ளிகளில் தொடர்ச்சியானது.

2) பின்வருவனவற்றின் தொடர்ச்சித்
தன்மையை ஆராய்க.

(1) $x + \sin x$.

இங்கு x என்பது மெய்யுறவு கோவை
சார்பு. இது R ன் தொடர்ச்சியானது.
மேலும் $\sin x$ என்பது உட்கார்பு
இதுவும் R ன் தொடர்ச்சியானது.
எனவே இவை இரண்டும் கூடுதலான
 $x + \sin x$ ம் R ன் தொடர்ச்சியானது.

(ii) $x^2 \cos x$.

தீர்வு x^2 ஆனது மெய்யுறவு கோவை
சார்பு. இது R ன் தொடர்ச்சியானது.
மேலும் உட்கார்பு $\cos x$ ம் R ன்
தொடர்ச்சியானது. இவற்றின் பெருக்க-
புள்ள $x^2 \cos x$ ம் R ன் தொடர்ச்சியானது.

(iii) $e^x \tan x$

தீர்வு e^x ஆனது R ன் தொடர்ச்சியானது
எனவே உட்கார்பு $\tan x$ ஆனது
அதன் சார்புள்ள $R - \{(2n+1)\pi/2\}$
 $\forall n \in \mathbb{Z}$ ன் தொடர்ச்சியானது

$\therefore e^x \tan x$ ஆனது $R - \{(2n+1)\pi/2\}$
 $n \in \mathbb{Z}$ ன் தொடர்ச்சியானது.

(iv) $e^{2x} + x^2$

தீர்வு e^{2x} ஆனது R ன் தொடர்ச்சி
யானது. மேலும் மெய்யுறவு கோவை
சார்பு x^2 -ம் R ன் தொடர்ச்சியானது
 $e^{2x} + x^2$ ம் R ன் தொடர்ச்சியானது.

(v) $x \ln x$

தீர்வு x ஆனது R ன் தொடர்ச்சியானது
மேலும் $\ln x$ உட்கார்பு
 $(0, \infty)$ ன் தொடர்ச்சியானது
 $\therefore x \ln x$ ஆனது $(0, \infty)$ ன்
தொடர்ச்சியானது. N.Kamatchi
GHS, Govindavadi,
Kanchipuram (Dt)

(vi) $\frac{\sin x}{x^2}$

தீர்வு உட்கார்பு $\sin x$ ஆனது
 R ன் தொடர்ச்சியானது.
 x^2 ம் R ன் தொடர்ச்சியானது
 $\therefore \frac{\sin x}{x^2}$ ஆனது $x \neq 0$ ன்
புள்ளியில் கிட்ட உட்கார்பு.

$\therefore \frac{\sin x}{x^2}$ ஆனது இதன் சார்புள்ள
 $R - \{0\}$ ன் தொடர்ச்சியானது.

(vii) $\frac{x^2-16}{x+4}$

தீர்வு x^2-16 , $x+4$, இரண்டும்
 R ன் தொடர்ச்சியானவை.
எனவே $\frac{x^2-16}{x+4}$ ஆனது $x \neq -4$ ன்
புள்ளியில் கிட்ட உட்கார்பு.

$\therefore$ இச்சார்பு $R - \{-4\}$ ன்
தொடர்ச்சியானது.

(13)

(viii) $|x+2| + |x-1|$

தீர்வு $|x+2|$ சார்ந்த $|x+2|$, $|x-1|$ சார்ந்த R இல் தொடர்ச்சியானது. $\therefore |x+2| + |x-1|$ சார்ந்த R இல் தொடர்ச்சியானது.

(ix) $\frac{|x-2|}{|x+1|}$

தீர்வு $|x-2|$ & $|x+1|$ R இல் தொடர்ச்சியானது. $\therefore \frac{|x-2|}{|x+1|}$ சார்ந்த R இல் தொடர்ச்சியானது.

சார்ந்த $\frac{|x-2|}{|x+1|}$ சார்ந்த $x = -1$ இல் தொடர்ச்சியானது.

$\therefore \frac{|x-2|}{|x+1|}$ சார்ந்த $R - \{-1\}$ இல் தொடர்ச்சியானது.

தொடர்ச்சியானது.

(x) $\cot x + \tan x$

தீர்வு $\cot x$ சார்ந்த $R - \{n\pi\}$ இல் தொடர்ச்சியானது.

$\tan x$ சார்ந்த $R - \{(2n+1)\frac{\pi}{2}\}$ இல் தொடர்ச்சியானது.

$\cot x + \tan x$ சார்ந்த $R - \{n\pi\}$ இல் தொடர்ச்சியானது.

3) மின்னழுத்த சார்ந்த R இல் தொடர்ச்சியானது. $\therefore$ மின்னழுத்த சார்ந்த R இல் தொடர்ச்சியானது.

(i) $f(x) = \begin{cases} 4x+5 & x \leq 3 \\ 4x-5 & x > 3 \end{cases}$

தீர்வு $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (4x+5) = 4(3)+5 = 12+5 = 17$

$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} 4x-5 = 4(3)-5 = 12-5 = 7$

$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ இல் தொடர்ச்சியானது.

$x = 3$ இல் தொடர்ச்சியானது.

(ii) $f(x) = \begin{cases} x+2 & x \geq 2 \\ x^2 & x < 2 \end{cases}$

தீர்வு $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} x^2 = 2^2 = 4$

$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} x+2 = 2+2 = 4$

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$

$f(2) = 2+2 = 4$

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$

$\therefore x = 2$ இல் தொடர்ச்சியானது.

$\therefore R$ இல் தொடர்ச்சியானது.

(iii) $f(x) = \begin{cases} x^2-3 & x \leq 2 \\ x^2+1 & x > 2 \end{cases}$

தீர்வு $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} x^2-3 = 2^2-3 = 4-3 = 1$

$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} x^2+1 = 2^2+1 = 5$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$

$x = 2$ இல் தொடர்ச்சியானது.

(iv) $f(x) = \begin{cases} \sin x & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4} \\ \cos x & \frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2} \end{cases}$

தீர்வு $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}^-} \sin x = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}^+} \cos x = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\therefore \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$f(\frac{\pi}{4}) = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 14} f(x) = f(14)$$

$\therefore x = 14$ ன் இச்சார்புத் தொடங்கியானது இது R ஓடுவதும் தொடங்கியானது

4) தொடுக்கப்பட்ட சார்புக் கோடு தொடுக்கப்பட்ட புள்ளி x_0 ன் தொடங்கியானது (அ) தொடங்கியானது அல்லது காணப்படவில்லை.

தீர்வு (i) $x_0 = 1$ $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$

(i) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1}$
 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)(x-1)}{(x-1)} = 1+1 = 2$

2) மேலும் $f(1) = 2$

3) $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ என்கிறால்
 $x_0 = 1$ ன் இச்சார்புத் தொடங்கியானது.

(ii) $x_0 = 3$, $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-9}{x-3}, & x \neq 3 \\ 5, & x = 3 \end{cases}$

a) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2-9}{x-3}$
 $= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)} = 3+3 = 6$

b) $f(3) = 5$

(c) $\therefore \lim_{x \rightarrow 3} f(x) \neq f(3)$ என்கிறால்
 $x_0 = 3$ ன் $f(x)$ தொடங்கியானது.

5) $\begin{cases} \frac{x^3-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 3, & x = 1 \end{cases}$ என்கிறால் $(-\infty, \infty)$ ன் தொடங்கியானது அல்லது காணப்படவில்லை.

தீர்வு (i) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{x-1} = 3(1) = 3$
 $= 3(1)^2 = 3$

(ii) $f(1) = 3$

(iii) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ என்கிறால் $x = 1$ ன் இச்சார்புத் தொடங்கியானது $\therefore R$ ஓடுவதும் இச்சார்புத் தொடங்கியானது

6) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^4-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ 2, & x = 1 \end{cases}$ என்கிறால் $x = 1$ ன் தொடங்கியானது அல்லது காணப்படவில்லை.

தீர்வு (i) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4-1}{x-1} = 4$

(ii) $f(1) = 2$

(iii) இச்சார்புத் தொடங்கியானது $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ என்கிறால்

$4 = 2$

$\Rightarrow \boxed{2=4}$ N.Kamatchi
 G.H.S. Govindavadi
 Kanchipuram (Dt)

7) $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x < 2 \\ 4, & x \geq 2 \end{cases}$

என்கிறால் $x = 0$ ன் தொடங்கியானது $(-\infty, \infty)$ ன் தொடங்கியானது அல்லது காணப்படவில்லை.

தீர்வு $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0$

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 = 0^2 = 0$

மேலும் $f(0) = 0^2 = 0$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$ என்கிறால் $x = 0$ ன் தொடங்கியானது இச்சார்புத் தொடங்கியானது $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} x^2 = 2^2 = 4$

$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} 4 = 4$

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$ மேலும் $f(2) = 4$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ என்கிறால் $x = 2$ ன் இச்சார்புத் தொடங்கியானது R ஓடுவதும் இது தொடங்கியானது

(15)

8) ஸ்ரீமத் 9 தொடர்ச்சியான
சார்புக் கோடு $f(3) = 5$ ஸ்ரீமத்
 $\lim_{x \rightarrow 3} (2f(x) - g(x)) = 4$ எனில்
 $g(3)$ காண்க.

தீர்வு f, g தொடர்ச்சியான
சார்புக் கோடு எனப்படுக.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 3} (2f(x) - g(x)) &= 4 \\ \lim_{x \rightarrow 3} (2f(x) - g(x)) &= 4 \\ &= 2f(3) - g(3) = 4 \\ &= 2(5) - g(3) = 4 \\ 10 - g(3) &= 4 \\ 10 - 4 &= g(3)\end{aligned}$$

$$\boxed{g(3) = 6}$$

9) சார்பு தொடர்ச்சியற்றதாக உள்ள
புள்ளிகளைக் காண்க. இம்
புள்ளிகளின் அங்குதிற்து f க்கு
உடம்பக்க தொடர்ச்சி இடம்பக்க
தொடர்ச்சி ஸ்ரீமத் அது உடம்பக்க
எனக் காண்க. f ன் உடம்பக்க

$$(i) f(x) = \begin{cases} 2x+1 & x \leq -1 \\ 3x & -1 < x < 1 \\ 2x-1 & x \geq 1 \end{cases}$$

$$\begin{array}{ccc} 2x+1 & x & 3x & x & 2x-1 \\ & & 0 & & \end{array}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^-} (2x+1) \\ &= 2(-1)+1 \\ &= -2+1 = -1\end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} 3x = 3(-1) = -3$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$$

எனப்படுக $x = -1$ இச்சார்பு


தொடர்ச்சியற்றது.

$$\text{கோடு } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 3x = 3(1) = 3$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2x-1) = 2(1)-1 = 2-1 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \text{ எனப்படுக}$$

$x = 1$ இம் இச்சார்பு தொடர்ச்சியற்றது



x	-2	-1	0	1	2
y	-3	-1	0	1	3

x	-0.5	0.5
y	-1.5	1.5

10) f ன் உடம்பக்க உடம்பக்கக் கிட்டுகிறது

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x & 0 \leq x < 1 \\ -x^2 + 4x - 2 & 1 \leq x < 3 \\ 4-x & x \geq 3 \end{cases}$$

இச்சார்பு தொடர்ச்சியானதா?

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} 0 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

$$\text{கோடு } f(0) = 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \text{ எனப்படுக}$$

$x = 0$ இம் தொடர்ச்சியானது.

$$(i) \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x = 1$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} (-x^2 + 4x - 2) \\ &= -1 + 4 - 2 = 1\end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$$

$$\text{கோடு } f(1) = -1 + 4 - 2 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

$\therefore x = 1$ இம் தொடர்ச்சியானது.

$$(iii) \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (-x^2 + 4x - 2)$$

$$\begin{aligned}\text{N. Kamatchi (PG Arts)} &= -(3^2) + 4(3) - 2 \\ \text{G. H. S. G. Vindaradi} &= -9 + 12 - 2 = 1. \\ \text{Kanehipuram} &\end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} 4 - x = 4 - 3 = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 1$$

$$\text{வேலும் } f(3) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) \text{ எனப்படுகிறது}$$

$x = 3$ இச்சார்பு தொடர்ச்சி கொண்டது. வேலும் R சூழலில் தொடர்ச்சியானது.

ii) பின்வரும் சார்புகளில் வயற்றுக்கூறு $x = x_0$ இக்கூறுகளில் தொடர்ச்சியற்ற தன்மை உள்ளது எனக் காண்க? தொடர்ச்சியற்ற தன்மை இருக்குமானால், $f(x)$, $x \neq x_0$ ஏற்ற வாய் R தொடர்ச்சியாக இருக்குமாறு g என்ற சார்பைக் காண்க.

$$i) f(x) = \frac{x^2 - 2x - 8}{x + 2}, x_0 \neq -2$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 2x - 8}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x-4)(x+2)}{(x+2)}$$

$$= -2 + 4 = -6 \quad \text{N. Kamatchi, A. H. S., Govindavadi}$$

$$\text{வேலும் } f(-2) = \frac{0}{0}$$

$\therefore f(-2)$ வரையறுக்கப்படவில்லை
 $\Rightarrow f(x)$ கொண்ட $x_0 = -2$ இக்கூறுகளில் தொடர்ச்சியற்ற தன்மை உள்ளது.

$$\text{எனவே } f(x) \text{ உடனடியாக } g(x) = \begin{cases} x^2 - 2x - 8 & x_0 \neq -2 \\ -6 & x_0 = -2 \end{cases}$$

என வரையறுத்தால் இச்சார்பு R தொடர்ச்சியாக இருக்கும்.

$$ii) f(x) = \frac{x^3 + 64}{x + 4}, x_0 = -4$$

$$\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^3 + 64}{x + 4} = \lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^3 - (-4)^3}{x - (-4)}$$

$$= 3(-4)^2 = 3 \times 16 = 48$$

எனவே $f(-4) = \frac{0}{0}$
 $\therefore f(-4)$ வரையறுக்கப்படவில்லை
 $\therefore x_0 = -4$ இக்கூறுகளில் தொடர்ச்சியற்ற தன்மை உள்ளது.
 தொடர்ச்சியற்ற தன்மை உள்ளது.
 எனவே இச்சார்பை $f(x) = \begin{cases} x^3 + 64, & x_0 \neq -4 \\ 48 & x_0 = -4 \end{cases}$

என வரையறுத்தால் இச்சார்பு R தொடர்ச்சியாக இருக்கும்.

$$ii) f(x) = \frac{3 - \sqrt{x}}{9 - x}, x_0 = 9$$

$$\lim_{x \rightarrow 9} f(x) = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{3 - \sqrt{x}}{9 - x} = \lim_{x \rightarrow 9} \frac{1/2 - 1/2}{9 - x}$$

$$= \frac{1}{2} 9^{1/2 - 1} = \frac{1}{2} (9^{-1/2}) = \frac{1}{2 \sqrt{9}}$$

$$= \frac{1}{2(3)} = \frac{1}{6}$$

எனவே $x_0 = 9$ இக்கூறுகளில் $f(x)$ வரையறுக்கப்படவில்லை.

$\therefore$ இச்சார்பு $x_0 = 9$ இக்கூறுகளில் தொடர்ச்சியற்ற தன்மை உள்ளது. எனவே இச்சார்பை

$$g(x) = \begin{cases} \frac{3 - \sqrt{x}}{9 - x} & x_0 \neq 9 \\ 1/6 & x_0 = 9 \end{cases}$$

என வரையறுத்தால் இச்சார்பு R தொடர்ச்சியாக இருக்கும்.

$$ii) g(x) = \begin{cases} x^2 - b^2 & x < 4 \\ 6x + 20 & x \geq 4 \end{cases}$$

சார்பு $[-a, a]$ தொடர்ச்சியானது எனின் a மதிப்பை b எனக் காண்க.

$$\text{தீர்வு} \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^-} x^2 - b^2 = 16 - b^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 4^+} 6x + 20 = 4b + 20$$

இச்சார்பு தொடர்ச்சியானது எனப்படுகிறது

$$16 - b^2 = 4b + 20$$

$$-b^2 - 4b + 16 - 20 = 0$$

$$\Rightarrow -b^2 - 4b - 4 = 0$$

(17)

$$b^2 + 4b + 4 = 0$$

$$(b+2)^2 = 0$$

$$b = -2$$

13) $f(x) = x \sin \frac{1}{x}$ என்க. $f(0)$ ன்
தரத்த மதிப்பைக் f என்ன இடம்
கொள்ளும் ஏதாபிச்சிபாணதாச
இருக்கும்?

$$-1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1$$

$$-x \leq x \sin \frac{1}{x} \leq x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} -x \leq \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} \leq \lim_{x \rightarrow 0} x$$

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} \leq 0$$

$\therefore$ இடம்பெட்டுத் தேற்றத்தின் மூலம்

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$$

$\therefore$ இச்சார்பு என்ன இடங்கொள்ளும்
ஏதாபிச்சிபாணதாச இருக்க
வேண்டுமெனின் $f(0) = 0$ என
வரையறுக்கப்பட வேண்டும்.


14) $f(x) = \frac{x^2-1}{x^3-1}$ என்க சார்பு

$x=1$ ன் வரையறுக்கப்பட உண்ம
 $f(1)$ ன் தரத்த மதிப்பைக் $x=1$ ன்
 f ஏதாபிச்சிபாணதாச இருக்கும்.

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x^3-1} = \frac{2}{3}$$


$\therefore x=1$ ன் $f(1) = \frac{2}{3}$ என இருக்கும்
சார்பு f என்ன ஏதாபிச்சிபாணதாச
இருக்கும்.

15) பின் வருவது வரைவரைகளைக்
 $x=x_0$ ன் எவ்வாறு ஏதாபிச்சிபாணதாச
உள்ளது எனக் கூறு.



$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ என
இருப்பதன் இச்சார்புக் $x=x_0$ ன்
எவ்வாறு ஏதாபிச்சிபாணதாச.


$x=x_0$ ன் f ஏதாபிச்சிபாணதாச.



$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ என உண்ம


N. Kamatchi (PG & Asst)
GHS, Grovindavadi,
Kanchipuram (Dist)

சார்பு $x=x_0$ ன் சார்பு
வரையறுக்கப்பட உண்ம
 $x=x_0$ ன் ஏதாபிச்சிபாணதாச
(c)



இங்கு $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$

$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$
எனவே $x=x_0$ ன் எவ்வாறு ஏதாபிச்சிபாணதாச
சார்பு f என்ன
 $x=x_0$ ன் இச்சார்பு ஏதாபிச்சிபாணதாச
இருக்கும்.



$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ என உண்ம
 $x=x_0$ ன் எவ்வாறு ஏதாபிச்சிபாணதாச
 $x=x_0$ ன் இச்சார்பு ஏதாபிச்சிபாணதாச
இருக்கும்.

25) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x}$

Soln $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1/e^x}{\sin x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{e^x \sin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x} \times \frac{x}{\sin x} \times \frac{1}{e^x}$$

$$= 2(1)(1) = 2$$

26) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - e^{bx}}{x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{ax} - 1) - (e^{bx} - 1)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{bx} - 1}{x}$$

$$= a - b \quad (\because \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1)$$

27) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (1 - \cos x)}{x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (1 - \cos x)}{x^3} \cdot \frac{(1 + \cos x)}{(1 + \cos x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (1 - \cos^2 x)}{x^3 (1 + \cos x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (\sin^2 x)}{x^3 (1 + \cos x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^3 x}{x^3 (1 + \cos x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^3 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \cos x}$$

$$= (1) \cdot \frac{1}{1 + \cos 0} = (1) \cdot \frac{1}{1 + 1}$$

$$= \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

28) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{\cos x} - \sin x}{x^3}$$

$$\cos x \text{ 가 } 0 \text{ 이 아니므로 곱해준다.}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin x \cos x}{x^3 \cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (1 - \cos x)}{x^3 \cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (2 \sin^2 x/2)}{x^3 \cos x}$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right) \times \frac{\sin^2 x/2}{x^2} \times \frac{1}{\cos x}$$

$$= 2(1) \times \frac{1}{\cos 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x/2}{x^2/4}$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{4} \left(\frac{\sin x/2}{x/2} \right)^2$$

$$= 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

-x-

N. Kamatchi (PG Asst)
GHS, Erode
Kanchipuram (Dist)

மாதம் : 12

நிகழ்தகவு கோட்பாடு மீள் அறிமுகம்.

பயிற்சி 12.1

1. பின்னரும் மூன்றையொன்று விளக்கிய A, B, C மற்றும் D என்ற நான்கு நிகழ்ச்சியை மட்டும் கொண்டு ஒரு சோதனையின் நிகழ்ச்சிகளின் நிகழ்தகவுகள் சாத்தியமானவையா என்பதை நீர் மானிக்கவும்.

$$\begin{aligned} \text{i) } P(A) &= 0.15, P(B) = 0.30, \\ P(C) &= 0.43, P(D) = 0.12 \\ P(A) + P(B) + P(C) + P(D) \\ &= 0.15 + 0.30 + 0.43 + 0.12 \\ &= 1.00 = 1. \end{aligned}$$

நிகழ்தகவுகள் சாத்தியமானவை.

$$\begin{aligned} \text{ii) } P(A) &= 0.22, P(B) = 0.38, \\ P(C) &= 0.16, P(D) = 0.34 \\ P(A) + P(B) + P(C) + P(D) \\ &= 0.22 + 0.38 + 0.16 + 0.34 \\ &= 1.1 \neq 1 \end{aligned}$$

கொடுக்கப்பட்ட நிகழ்தகவுகள் சாத்தியமானவையல்ல

$$\begin{aligned} \text{iii) } P(A) &= \frac{2}{5}, P(B) = \frac{3}{5}, \\ P(C) &= -\frac{1}{5}, P(D) = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

$P(C) = -\frac{1}{5}$ ஒரு நேர் எண் நிகழ்தகவு சாத்தியமற்றது.

2) இரண்டு நாணயங்கள் மீள் சுழத்திச் சுண்டப் படுகின்றன.

அ) ஒரு தலை மற்றும் ஒரு தலை
ஆ) அதிகபட்சமாக இரண்டு தலைகள்
மதற்காண நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.
தீர்வு $S = \{HH, HT, TH, TT\}$
 $n(S) = 4$

$$\begin{aligned} \text{i) } &\text{ஒரு தலை மற்றும் ஒரு தலை} \\ &A = \{HT, TH\} \quad \text{நா. கா. மட்டும் (அ) HT, TH, TT, HH} \\ &n(A) = 2 \\ &P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii) } &\text{அதிகபட்சமாக இரண்டு தலைகள்} \\ &B = \{HH, HT, TH, TT\} \\ &n(B) = 4 \\ &P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{4}{4} = 1 \end{aligned}$$

3) ஒரு மெட்டிரான் 5 லாம் மழைக்காலம் 4 சூழலின் மழைக்காலம் உள்ளது. சமவாய்ப்பு முறையால் இரண்டு மழைக்காலம் எடுக்கப் பட்டால் (i) ஒரு மழைக்காலம் ஒரு சூழலின் மழைக்காலம் மற்றும் ஒரு சூழலின் மழைக்காலம் (ii) இரண்டும் ஒரு வகையைச் சார்ந்ததாகவும் தலைப் பதற்காண நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

$$\begin{aligned} \text{தீர்வு:} &\text{மழைக்காலம்} = 5, \text{ சூழலின்} = 4 \\ &\text{மொத்தம்} = 5 + 4 = 9. \\ &\text{இரண்டு மழைக்காலம் எடுக்க மொத்த நிகழ்தகவு} \\ &n(S) = {}^9C_2 = \frac{9 \times 8}{1 \times 2} = 36 \end{aligned}$$

i) ஒரு மழைக்காலம் ஒரு சூழலின்

$$\begin{aligned} n(A) &= {}^5C_1 \times {}^4C_1 \\ &= 5 \times 4 = 20 \\ P(A) &= \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{20}{36} = \frac{5}{9} \end{aligned}$$

ii) இரண்டும் ஒரு வகை

$$\begin{aligned} n(B) &= {}^5C_2 + {}^4C_2 \\ &= \frac{5 \times 4}{1 \times 2} + \frac{4 \times 3}{1 \times 2} \\ &= 10 + 6 = 16 \\ P(B) &= \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{16}{36} = \frac{4}{9} \end{aligned}$$

4) i) ஒரு சாதாரண உருத்தி மற்றும் ஒரு விம் உருத்தி 53 நாள் கிழமைகள் வருவதற்கான நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

$$\begin{aligned} \text{தீர்வு:} &\text{சாதாரண உருத்தி} = 365 \text{ நாள்} \\ &= 52 \times 7 + 1 \text{ நாள்} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S &= \{T, SF, 4, 2, 5, 6, 7\} \\ n(S) &= 7. \end{aligned}$$

ii) சாதாரண உருத்தி 53 வது நாள் வராத கிழமை.

$$\begin{aligned} n(A) &= 1 \\ P(A) &= \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{1}{7} \end{aligned}$$

ii) வீடு 2 குடம் = 366 நாட்கள்
= (52 x 7) + 2 நாட்கள்

$S = \{(52, 1), (1, 52), (52, 4), (4, 52), (52, 7), (7, 52)\}$

$$n(S) = 7.$$

வீடு 2 குடத்தின் 53 வது
நாட்களுக்கு கிடைக்க

$$n(B) = 2$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{2}{7}.$$

5) எட்டு நாட்களில் எவ்வளவு நாட்கள்
செல்லும்படுகின்றன? பரிமாறு
இரண்டு பூக்கள் ii) குறைந்தது
இரண்டு பூக்கள் (iii) அதிகமாக
இரண்டு பூக்கள் கிடைப்பதற்கான
நிகழ்தகவு காண்க?

தீர்வு
 $n(S) = \{H, T\} \times \{H, T\} \times \dots \times \{H, T\}$
= 8 coins.

$$n(S) = 2^8 = 256$$

i) சரியாக இரண்டு பூக்கள்

$$n(A) = 8C_2 = \frac{8 \times 7}{1 \times 2} = 28$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{28}{256} = \frac{7}{64}$$

ii) அதிகமாக இரண்டு
பூக்கள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு

$$n(B) = 8C_0 + 8C_1 + 8C_2$$

$$= 1 + 8 + \left(\frac{8 \times 7}{1 \times 2} \right) = 1 + 8 + 28$$

$$= 37$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{37}{256}$$

iii) குறைந்தது இரண்டு பூக்கள்

$$n(C) = 8C_2 + 8C_3 + \dots + 8C_8$$

$$= n(S) - (8C_0 + 8C_1)$$

$$= 256 - (1 + 8)$$

$$= 256 - 9 = 247.$$

$$P(C) = \frac{n(C)}{n(S)} = \frac{247}{256}$$

நா.கா.மா.சி (மு.அ.)
G.H.S, கோலந்தவாடி,
காஞ்சிபுரம் (மா)

6) முதல் 100 மனைகளுக்கு
ஒரு எண் ~~கிடைப்பது~~ கிடைக்கின்றன.
இது ஒரு மகா எண் அல்லது 8
மடங்காக இருக்க நிகழ்தகவு
யாது?

தீர்வு $S = \{1, 2, 3, 4, \dots, 100\}$

$$n(S) = 100$$

i) ஒற்றைப்பட எண் கிடைப்பது
-கான நிகழ்தகவு

$$A = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97\}$$

$$n(A) = 25$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

ii) 8 மடங்காக இருக்க
நிகழ்தகவு.

$$B = \{8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96\}$$

$$n(B) = 12$$

$$P(B) = \frac{12}{100} = \frac{12}{100}.$$

$$A \cap B = \{ \} \Rightarrow n(A \cap B) = 0$$

$$P(A \cap B) = 0.$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{25}{100} + \frac{12}{100} - 0$$

$$= \frac{37}{100}.$$

(3)

7) ஒரு மையம் 7 சிவப்பு மற்றும் 4 கருப்பு நிறம் பந்துகளை உள்ளன. 3 பந்துகள் சமவாய்வு சூழலில் எடுக்கப்பட்டன

(i) எல்லாப் பந்துகளும் சிவப்பு நிறம் பந்துகள்

(ii) ஒரு சிவப்பு மற்றும் இரண்டு கருப்பு நிறம் பந்துகள் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு கணக்கிடுக.

தீர்வு மொத்தப்பந்துகள் = 7 + 4 = 11

3 பந்துகள் எடுக்க நிகழ்தகவு

$$n(S) = {}^{11}C_3 = \frac{11 \times 10 \times 9}{3 \times 2 \times 1} = 11 \times 5 \times 3$$

(i) எல்லாப் பந்துகளும் சிவப்பு நிறம் பந்துகள்

$$n(A) = {}^7C_3 = \frac{7 \times 6 \times 5}{1 \times 2 \times 3} = 35$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{35}{11 \times 5 \times 3} = \frac{7}{33}$$

(ii) ஒரு சிவப்பு மற்றும் இரண்டு கருப்பு நிறம் பந்துகள்

$$n(B) = {}^7C_1 \times {}^4C_2 = 7 \times \left(\frac{4 \times 3}{1 \times 2} \right) = 7 \times 6 = 42$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{4 \times 14}{11 \times 5 \times 3} = \frac{14}{55}$$

(14 = 4 × 3.5)
(55 = 11 × 5)
(3 = 3 × 1)

8) 52 சீட்டு கணைக் கொண்டு ஒரு கட்டி விடுந்து ஒரு சீட்டு எடுக்கப்படுகிறது. அச்சீட்டு ய் ஒரு A உ அல்லது King

(i) 6 அல்லது அதற்கு மேல் குறைவான எண் (ii) Queen அல்லது 9 கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவுகளைக் காண்க.

தீர்வு $n(S) = 52$ சீட்டு

(i) ஒரு A உ அல்லது King

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{4}{52} + \frac{4}{52} = \frac{8}{52} = \frac{1}{13}$$

(ii) 6 அல்லது அதற்கு மேல் குறைவான எண்.

$$P(C \cup D) = P(C) + P(D) = \frac{4}{52} + \frac{16}{52} = \frac{20}{52} = \frac{5}{13}$$

(iii) Queen அல்லது 9 கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(E \cap F) = P(E) + P(F) = \frac{4}{52} + \frac{4}{52} = \frac{8}{52} = \frac{2}{13}$$

9) ஒரு கிரிக்கெட் சிங்கிள் 16 ஸ்பைனர்கள் உள்ளன. அவர்களில் 5 பேர் மட்டுமே பந்து வீசும் திறம் வலத்தையர்கள். இவர்களில் 11 பேர் கொண்டு ஒரு குழுவினை சூழந்து 3 பந்து வீச்சாளர்களாவது குடும்பம் மறுவதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

$$\begin{aligned} \text{தீர்வு } n(S) &= {}^{16}C_{11} \\ &= {}^{16}C_5 \\ &= \frac{{}^{16}P_5}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} \\ &= \frac{16 \times 15 \times 14 \times 13 \times 12}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5} \end{aligned}$$

11 பேர் கொண்டு குழுவினை சூழந்து 3 பந்து வீச்சாளர்கள் குடும்பம் மறு நிகழ்தகவு.

11 பேர்	5 பந்து வீச்சாளர்	குழு
${}^{16}C_8$	5C_3	${}^{11}C_8 \times {}^5C_3 = 165 \times 10 = 1650$
${}^{16}C_7$	5C_4	${}^{11}C_7 \times {}^5C_4 = 330 \times 5 = 1650$
${}^{16}C_6$	5C_5	${}^{11}C_6 \times {}^5C_5 = 462 \times 1 = 462$

$$\begin{aligned} 1650 + 1650 + 462 \\ = 3762. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{3762}{14 \times 2 \times 13 \times 12} \\ &= \frac{627}{728}. \end{aligned}$$

10) \(\cup\) ஒரு நிகழ்ச்சி A நிகழ சாதகமாக 5 க்கு 7 எண்ணி $P(A)$ உக் காண்க. (ii) $P(B) = \frac{2}{5}$ எண்ணி நிகழ்ச்சி B நிகழ சாதகமாக 2 க்கு 5 எண்ணி $P(B)$ உக் காண்க.

தீர்வு (i) $n(A) = 5$ $n(\bar{A}) = 7$
 $n(S) = n(A) + n(\bar{A})$
 $= 5 + 7 = 12$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{5}{12}.$$

(ii) $P(B) = \frac{2}{5}$

நிகழ்ச்சி B நிகழ சாதகமாக 2 க்கு 5 எண்ணி

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(B) + n(\bar{B})}$$

$$\frac{2}{5} = \frac{n(B)}{n(B) + n(\bar{B})}$$

$$n(B) = 2$$

$$n(\bar{B}) = 3.$$

சாதகமாக 2 க்கு 3 எண்ணி

மற்றும் 12.2

1. A மற்றும் B ஒன்றையொன்றை
 மீண்டும் நிகழ்ச்சிகள் $P(A) = \frac{3}{8}$
 மற்றும் $P(B) = \frac{1}{8}$ எனில்

(i) $P(\bar{A})$ (ii) $P(A \cup B)$ (iii) $P(\bar{A} \cap B)$

(iv) $P(\bar{A} \cup \bar{B})$ காண்க. நா.காமாட்சி (டி.சி.எஸ். கோவிந்தராஜன், காஞ்சிபுரம் (மலர்)

தீர்வு $P(A \cap B) = 0$.

(i) $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$

(ii) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 $= \frac{3}{8} + \frac{1}{8} - 0 = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

(iii) $P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$
 $= \frac{1}{8} - 0 = \frac{1}{8}$

(iv) $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{A \cap B}) = 1 - P(A \cap B)$
 $= 1 - 0 = 1$

2) A மற்றும் B என்னும் ஒரு சம்பவம்
 சோதனையின் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும்
 $P(A) = 0.35$, $P(A \cap B) = 0.15$ எனில்
 மற்றும் $P(A \cup B) = 0.85$ எனில்

(i) $P(B)$ (ii) $P(\bar{B})$

(iii) $P(A \cup B)$ காண்க.

தீர்வு $P(A) = 0.35$

$$P(A \cup B) = 0.85$$

$$P(A \cap B) = 0.15$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$0.85 = 0.35 + P(B) - 0.15$$

$$0.85 = 0.20 + P(B)$$

$$P(B) = 0.85 - 0.20$$

$$P(B) = 0.65$$

(i) $P(B \cup \bar{A}) = P(\bar{A} \cap B)$
 $= P(B) - P(A \cap B)$

$$= 0.65 - 0.15 = 0.50$$

(ii) $P(\bar{B}) = 1 - P(B)$

$$= 1 - 0.65 = 0.35$$

(iii) $P(A \cup \bar{B}) = P(A \cap \bar{B})$
 $= P(A) - P(A \cap B)$

$$= 0.35 - 0.15 = 0.20.$$

3) ஒரு மரடை இரு குறை
 உருட்டிப் படுகிறது. முதன்முறை
 விசுவதின் 5 விடுவது நிகழ்ச்சி

A எனவும், இரண்டாவது
 குறை விசுவதின் 5 விடுவது

B எனக் கொண்டு
 $P(A \cup B)$ உக் காண்க.

தீர்வு $n(S) = 36$.

(5)

i) A எண்பது முதல் ஐந்து
5 விடுவது என்ன
 $A = \{(5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6)\}$

$$n(A) = 6$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

ii) B எண்பது கிரண்டாவது ஐந்து
5 விடுவதால்

$$B = \{(1,5), (2,5), (3,5), (4,5), (5,5), (6,5)\}$$

$$n(B) = 6$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{6}{36}$$

$$A \cap B = \{(5,5)\}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{36}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{6}{36} + \frac{6}{36} - \frac{1}{36} = \frac{11}{36}$$

4) A எண்பது நிகழ்ச்சியான நிகழ்வு 0.5, B எண்பது நிகழ்ச்சியான நிகழ்வு 0.3 மற்றும் A யும் B யும் ஒன்றையொன்று உள்ளகிய நிகழ்ச்சி என்ன கீழ்க்காணும் நிகழ்வுகளைக் காண்க

i) $P(A \cup B)$ ii) $P(A \cap B)$ iii) $P(\bar{A} \cap B)$

$$\text{கீழ் } P(A) = 0.5, P(B) = 0.3$$

$$P(A \cap B) = 0$$

$$i) P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$= 0.5 + 0.3 = 0.8$$

$$ii) P(A \cap B) = P(A) - P(A \cap B)$$

$$= 0.5 - 0 = 0.5$$

$$iii) P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$$

$$= 0.3 - 0 = 0.3$$

5) ஒரு நகரத்தில் இரு தீயணைக்கும் வண்டிகள் தனித்தனியாகச் செயல்பட்டு உணர்வு உள்பாடு தீயணைக்கும் வண்டி கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு 0.96

i) தேவையான மொத்த தீயணைக்கும் வண்டி கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு?

ii) தேவையான மொத்த ஒரு தீயணைக்கும் வண்டியும் கிடைக்காமல் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

$$\text{கீழ் } P(A) = 0.96, P(\bar{A}) = 0.04$$

$$P(B) = 0.96, P(\bar{B}) = 0.04$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B})$$

$$= (0.04)(0.04) = 0.0016$$

$$P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B})$$

$$= 1 - 0.0016 = 0.9984$$

6) ஒரு தொடர்வண்டி எசன் ஸ்டீவ் மதிய மாலத்தில் எதிர்பார்த்து வரும் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு 0.48. நேர்த்தியான ஐந்து மணி மொத்தகளைப் பயன்படுத்தியதாக அடுத்து கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவு 0.36 மற்றும் மேற்கண்ட இரு அடுத்து கிளையம் மொத்ததற்கான நிகழ்தகவு 0.2 எனில் i) இன்று நேர்த்தியான ஒரு அடுத்தவது கிடைப்பதற்கு ii) மூல ஒரு அடுத்து மட்டும் கிடைப்பதற்கான நிகழ்தகவுகள் யாவை?

$$\text{கீழ் } P(A) = 0.48,$$

$$P(B) = 0.36$$

$$P(A \cap B) = 0.2$$

$$i) \text{ இன்று நேர்த்தியான ஒரு அடுத்து}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= 0.48 + 0.36 - 0.2 = 0.64$$

$$ii) \text{ மூல ஒரு அடுத்து}$$

$$= P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B)$$

$$= P(A) - P(A \cap B) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= 0.48 - 0.2 + 0.36 - 0.2$$

$$= 0.44$$

பயிற்சி 12.3

நிகழ்ச்சிகள்

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$(i) P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$(ii) P(A|B) + P(A|B) = 1$$

$$(iv) P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

$$(v) P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

சார்பற்ற நிகழ்ச்சிகள் எனில்

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B})$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

1) இரு நிகழ்ச்சிகளை ஒரே சமயத்தில்
ஒன்றாக நிகழும் சார்பற்ற
நிகழ்ச்சிகளாக இருக்க இயலாது.

தீர்வு

இவ்வாறு. ஒரே சமயத்தில்

(i) இரு நிகழ்ச்சிகளை ஒன்றாக
ஒரே சமயத்தில் நிகழும் சார்பற்ற
நிகழ்ச்சிகளாக இருக்க இயலாது.

(ii) இரு நிகழ்ச்சிகளை சார்பற்ற
நிகழ்ச்சிகளாக இருந்தால் ஒரே
சமயத்தில் நிகழும் சார்பற்ற
நிகழ்ச்சிகளாக இருக்க இயலாது.

2) A மற்றும் B சார்பற்ற இரு நிகழ்ச்சி
களாக $P(A \cup B) = 0.7$, $P(A \cap B) = 0.2$
மற்றும் $P(B) = 0.5$ எனில் A மற்றும் B
சார்பற்ற நிகழ்ச்சிகள் எனக் காட்டுக.

$$\text{தீர்வு } P(A \cup B) = 0.7$$

$$P(A \cap B) = 0.2, P(B) = 0.5$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$0.7 = P(A) + 0.5 - 0.2$$

$$0.7 = P(A) + 0.3$$

$$0.7 - 0.3 = P(A)$$

$$P(A) = 0.4$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$0.2 = (0.4)(0.5)$$

$$(0.2) = 0.20$$

$$0.2 = 0.2$$

∴ A மற்றும் B சார்பற்ற நிகழ்ச்சிகள்

3) A மற்றும் B சார்பற்ற நிகழ்ச்சி
களாக $P(A \cup B) = 0.6$, $P(A) = 0.2$
எனில் P(B) காண்க.

$$\text{தீர்வு } P(A \cup B) = 0.6$$

$$P(A) = 0.2$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$0.6 = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)$$

$$0.6 = 0.2 + P(B) [1 - P(A)]$$

$$0.6 - 0.2 = P(B) [1 - 0.2]$$

$$0.4 = P(B) [0.8]$$

$$\frac{0.4}{0.8} = P(B)$$

$$P(B) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 0.5$$

4) $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.8$
மற்றும் $P(B|A) = 0.8$ எனில்
 $P(A|B)$ மற்றும் $P(A \cup B)$ காண்க.

$$\text{தீர்வு } P(A) = 0.5$$

$$P(B) = 0.8$$

$$P(B|A) = 0.8$$

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$0.8 = \frac{P(A \cap B)}{0.5}$$

$$P(A \cap B) = 0.8 \times 0.5 = 0.40$$

$$= 0.4$$

(7)

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.4}{0.8} = \frac{1}{2} = 0.5$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= 0.5 + 0.8 - 0.4$$

$$= 0.9.$$

5) A, B என்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கு
 $P(A) = \frac{3}{4}$, $P(B) = \frac{2}{5}$ மற்றும்
 $A \cup B = S$ எனில் சரிதான் நினை
 நிகழ்தகவு காண்க.

தீர்வு $P(A) = \frac{3}{4}$, $P(B) = \frac{2}{5}$
 $A \cup B = S$

$$P(A \cup B) = P(S) = 1$$

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$$

$$= \frac{3}{4} + \frac{2}{5} - 1$$

$$= \frac{15 + 8 - 20}{20} = \frac{3}{20}.$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{3/20}{2/5}$$

$$= \frac{3}{20} \times \frac{5}{2} = \frac{3}{8}.$$

6) கண்தையலின் ஒரு விண்ணாக்கம்
 சூண்டு மாணவர்களிடம் தீர்வு
 காண்பதற்காக கொடுக்கப் படுகிறது. விண்ணாக்கத் தீர்வு காண
 அவர்கள் தனித் தனியே தீர்ப்பதற்கான - மதற்கான நிகழ்தகவு
 நிகழ்தகவு $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ மற்றும் $\frac{1}{5}$ —

(1) அந்த விண்ணா தீர்வு காண்டதற்கான
 நிகழ்தகவு யாது?

(2) சரியாக ஒருவர் மட்டுமே அந்த
 விண்ணாக்கத் தீர்வு காண்பதற்கான
 நிகழ்தகவு யாது? நா.காமாட்சி (மீ.வி.)
 GHS, கோவில்துறை,
 காஞ்சிபுரம் (மா)

$$P(A) = \frac{1}{3}$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$P(B) = \frac{1}{4}$$

$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$P(C) = \frac{1}{5}$$

$$P(\bar{C}) = 1 - P(C) = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{60}$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = 1 - P(A \cap B \cap C)$$

$$= 1 - \frac{1}{60} = \frac{59}{60}$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = \frac{59}{60}$$

$$P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) + P(\bar{A}) \cdot P(B) \cdot P(\bar{C})$$

$$+ P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B}) \cdot P(C)$$

$$= \left(\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{2}{3} \times \frac{1}{4} \times \frac{4}{5}\right)$$

$$+ \left(\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{5}\right)$$

$$= \frac{12}{60} + \frac{8}{60} + \frac{6}{60} = \frac{26}{60} = \frac{13}{30}.$$

7) மயக்கோன் நிரம்பப்பட்ட ஒரு
 மகிழ்ச்சிக்கு எண்ணையி
 மாற்ற நிகழ்தகவு 0.30. எண்ணையி
 உறுப்பினி மாற்ற நிகழ்தகவு 0.4
 எண்ணையி மாற்றம் எண்ணையி
 உறுப்பினி இரண்டையும் மாற்ற
 நிகழ்தகவு 0.15

(1) எண்ணையி மாற்றம் மட
 வேண்டாம் எண்ணையி ஒரு
 மதிய எண்ணையி உறுப்பினி
 தேவைப் படுவதற்கான நிகழ்
 தகவு என்ன?

(2) மதிய எண்ணையி உறுப்பினி
 தேவைப் பட்டால், எண்ணையி
 மாற்றம் வேண்டியதற்கான
 நிகழ்தகவு என்ன?

தீர்வு $A \rightarrow$ எண்ணெய்
 $B \rightarrow$ எண்ணெய் அல்லது பண்ணை
 $P(A) = 0.30$ $P(B) = 0.40$
 $P(A \cap B) = 0.15$
 i) $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.15}{0.30}$
 $= \frac{15}{30} = \frac{1}{2} = 0.5$
 ii) $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.15}{0.40}$
 $= \frac{15}{40} = \frac{3}{8} = 0.375$

8) ஒரு மையல் 5 மென்னை மற்றும் 3 கருப்பு நிறம் பந்தங்கள் உள்ளன. மற்றொரு மையல் 4 மென்னை மற்றும் 6 கருப்பு நிறம் பந்தங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு மையலிலிருந்து ஒரு பந்து எடுக்கப்படுகிறது. எனின் i) இரண்டு மென்னை நிறம் பந்தங்கள் ii) இரண்டு கருப்பு நிறம் பந்தங்கள் iii) ஒரு மென்னை மற்றும் ஒரு கருப்பு பந்து கிடைக்கும் நிகழ்தகவுகளை காண்க.

தீர்வு மொத்தப் பந்தங்கள்
 மைய I = 5 மெ + 3 க = 8
 மைய II : 4 மெ + 6 க = 10.

$$P(W_1) = 5/8, P(W_2) = 4/10$$

$$P(B_1) = 3/8, P(B_2) = 6/10$$

i) இரண்டு மென்னை நிறம் பந்தங்கள்

$$P(W_1 \cap W_2) = P(W_1) \cdot P(W_2) = \frac{5}{8} \times \frac{4}{10}$$

$$= \frac{1}{4}$$

ii) இரண்டு கருப்பு நிறம் பந்தங்கள்

$$P(B_1 \cap B_2) = P(B_1) \cdot P(B_2) = \frac{3}{8} \times \frac{6}{10}$$

$$= \frac{9}{10}$$

iii) ஒரு மென்னை மற்றும் ஒரு கருப்பு பந்து

$$= P(W_1) \cdot P(B_2) + P(W_2) \cdot P(B_1)$$

$$= \left(\frac{5}{8} \times \frac{6}{10}\right) + \left(\frac{4}{10} \times \frac{3}{8}\right)$$

$$= \frac{30}{80} + \frac{12}{80} = \frac{42}{80} = \frac{21}{40}$$

9) ஒரு மையல் 2 பந்து மொண்டை - கரும், மீதம் மொண்டை கரும் உள்ளன. ஒரு மொண்டை குதன் தரத்தின் தேர்ச்சிய் மைய நிகழ்தகவு 0.85 மற்றும் மொண்டை குதன் தரத்தின் தேர்ச்சிய் மைய நிகழ்தகவு 0.70. கூலாய்ப்பு குதையல் ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டால் அவரின் குதன் தரத்தின் தேர்ச்சி மையத்திற்கான நிகழ்தகவு யாது?

தீர்வு:- $A_1 \rightarrow$ மொண்டை குதன் தரம் மையத்தின்

$A_2 \rightarrow$ மொண்டை குதன் தரம் மையத்தின்

$$P(A_1) = 0.85 = \frac{85}{100}$$

$$P(A_2) = 0.70 = \frac{70}{100}$$

தேவையான நிகழ்தகவு

$$= \left(\frac{2}{3} \times \frac{70}{100}\right) + \left(\frac{1}{3} \times \frac{85}{100}\right)$$

$$= \frac{140}{300} + \frac{85}{300} = \frac{225}{300}$$

$$= \frac{75}{100} = 0.75$$

10) $P(A) = 0.4$ மற்றும் $P(A \cup B) = 0.7$ எனின் $P(B)$ வ கிழ்க்காணம் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டுக் காண்க.

i) A மற்றும் B மென்னை மையம்
 ii) A மற்றும் B கார்ப்பா நிகழ்தகவு

$$P(A|B) = 0.4$$

$$P(A) = 0.4$$

$$P(A \cup B) = 0.7$$

v) A & B மென்னை மையம்
 vi) A & B கார்ப்பா நிகழ்தகவு

$$P(A \cap B) = 0$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$0.7 = 0.4 + P(B)$$

$$P(B) = 0.7 - 0.4 = 0.3$$

(9)

(i) A & B சார்பற்ற நிகழ்ச்சிகள்
எனவே $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 $0.7 = 0.4 + P(B) - P(A) \cdot P(B)$
 $0.7 - 0.4 = P(B) [1 - P(A)]$
 $0.3 = P(B) (1 - 0.4)$
 $0.3 = P(B) (0.6)$
 $\frac{0.3}{0.6} = P(B)$
 $P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5$

(ii) $P(A|B) = 0.4$ நிகழ்வுகளின் (சா)
 GHSS, கோவிந்தராஜ்
 கனத்தியம் (சா)
 $\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = 0.4$
 $\frac{P(A) + P(B) - P(A \cup B)}{P(B)} = 0.4$
 $P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.4 P(B)$
 $0.4 - 0.7 = 0.4 P(B) - P(B)$
 $-0.3 = P(B) (0.4 - 1)$
 $-0.3 = P(B) (-0.6)$
 $\frac{-0.3}{-0.6} = P(B)$
 $P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0.5$

(iv) $P(B|A) = 0.5$
 $\frac{P(A \cap B)}{P(A)} = 0.5$
 $P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.5 P(A)$
 $P(A) - 0.5 P(A) = P(A \cup B) - P(B)$
 $P(A) [1 - 0.5] = 0.7 - 0.4$
 $P(A) (0.5) = 0.3$
 $P(A) = 0.6$

$\frac{P(A) + P(B) - P(A \cup B)}{0.4} = 0.5$
 $0.4 + P(B) - 0.7 = 0.5 (0.4)$
 $P(B) - 0.3 = 0.2$
 $P(B) = 0.2 + 0.3 = 0.5$

ii) சூழலியல் சூறையின் ஒரு வகுப்பு
 தேர்ந்தெடுக்கப் படுகிறது. அது
 53 ஆயுள் நுகணைக் கொண்டதாக
 இருப்பதன் நிகழ்தகவு யாது?

iii) 53 ஆயுள் நுகணைக் கொண்ட
 ஒரு வீடு உருவாக கிடைப்பதற்கான
 நிகழ்தகவு யாது?

தீர்வு 1 வகுப்பு = 365 நாட்கள்
 (சாதாரண வருடம்)
 = 52 வாரம் + 1 நாள்

$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
 $n(S) = 7$
 $n(A) = 1$
 $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{1}{7}$

வீடு உருவம் = 366 நாட்கள்
 = 52 வாரங்கள் + 2 நாட்கள்
 $S = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6), (6, 7), (7, 1)\}$
 $n(S) = 7$

$n(B) = 2$
 $P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} = \frac{2}{7}$

சாதாரண வருடத்திற்கான
 நிகழ்தகவு = $\frac{3}{4}$
 வீடு உருவத்திற்கான
 நிகழ்தகவு = $\frac{1}{4}$

(i) 53 ஆயுள் நுகணை
 இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு
 $= \left(\frac{3}{4} \times \frac{1}{7}\right) + \left(\frac{1}{4} \times \frac{2}{7}\right)$
 $= \frac{3}{28} + \frac{2}{28} = \frac{5}{28}$

யூ லீம் உடுத்தின் 53வது நாள்
கிடைக்க நிகழ்தகவு

$$= \frac{1}{A_2} \times \frac{2}{7} = \frac{1}{14}$$

12) ஒரு இலக்கை குறிப்பாத்தல்
சுடும் போது 4ன் 3 குறை X ம்
5ன் 4 குறை Y ம், 3ன் 2 குறை
Z ம் சரியாக இலக்கைச் சுடுகின்றனர்.
முதலும் அந்த இலக்கைச் சுடும்
போது சரியாக இடுவர் மட்டுமே
சுடுவதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

தீர்வு $P(X) = \frac{3}{4}$

$$P(\bar{X}) = 1 - P(X) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$$

$$P(Y) = \frac{4}{5}$$

$$P(\bar{Y}) = 1 - P(Y) = 1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$$

$$P(Z) = \frac{2}{3}$$

$$P(\bar{Z}) = 1 - P(Z) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

சரியாக இடுவர் மட்டுமே
சுடுவதற்கான நிகழ்தகவு.

$$= P(X) P(Y) P(\bar{Z}) + P(X) P(\bar{Y}) P(Z) \\ + P(\bar{X}) P(Y) P(\bar{Z})$$

$$= \left(\frac{3}{4} \times \frac{4}{5} \times \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{3}{4} \times \frac{1}{5} \times \frac{2}{3} \right) \\ + \left(\frac{1}{4} \times \frac{4}{5} \times \frac{2}{3} \right)$$

$$= \frac{12}{60} + \frac{6}{60} + \frac{8}{60} = \frac{26}{60} = \frac{13}{30}$$

பயிற்சி 12.4

கூட்டு நிகழ்தகவு

$$P(B) = P(A_1) P(B/A_1) + P(A_2) P(B/A_2) \\ + \dots + P(A_n) P(B/A_n)$$

பேயின் தேற்றம்

$$P(A_i/B) = \frac{P(A_i) P(B/A_i)}{P(A_1) P(B/A_1) + P(A_2) P(B/A_2) \\ + \dots + P(A_n) P(B/A_n)}$$

நாகாமாட்சி (20)
GHS, கோவாந்தியா
காந்தியம் (10)

1. ஒரு ததாபிற்சாணயன் இயந்திரங்கள்
I மற்றும் II இடுவதை உள்ளன.
இயந்திரம் I ததாபிற்சாணயன்
உற்பத்தியை 60% தயாரிக்கிறது
மற்றும் இயந்திரம் II உற்பத்தியை
40% தயாரிக்கிறது - மேலும்
இயந்திரம் I ன் சீமை உற்பத்தி
செய்யப்பட்ட மொடுகளில் 2%
குறைமாமென்றதாகும். இயந்திரம்
II ன் சீமை உற்பத்தி செய்யப்பட்ட
மொடுகள் 4% குறைமாமென்றா-
தாகும் இடுக்கின்றன. உற்பத்தி

செய்யப்பட்ட மொடுகள் கனிவிடுத்த
செய்யப்பட்ட குறைமாமென்றா
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. அப்போது
மொடுகள் குறைமாமென்ற இடுவது
மதற்கான நிகழ்தகவு யாது?
தீர்வு $A_1 \rightarrow$ இயந்திரம் I
 $A_2 \rightarrow$ இயந்திரம் II

$$P(A_1) = 60\% = \frac{60}{100}$$

$$P(A_2) = \frac{40}{100} = 40\%$$

$$P(B/A_1) = 2\% = \frac{2}{100}$$

$$P(B/A_2) = 4\% = \frac{4}{100}$$

கூட்டு நிகழ்தகவு

$$P(B) = P(A_1) P(B/A_1) \\ + P(A_2) P(B/A_2)$$

$$= \left(\frac{60}{100} \times \frac{2}{100} \right) + \left(\frac{40}{100} \times \frac{4}{100} \right)$$

$$= \frac{120}{10000} + \frac{160}{10000} = \frac{280}{10000}$$

$$= 0.0280$$

2) ஒத்த இரு ஜாமுகளின் ஒன்றின்
6 கருப்பு மற்றும் 4 சிவப்பு
நிறப்பந்தங்கள். உள்ளன.
மற்றொரு ஜாமுகள் 2 கருப்பு
மற்றும் 2 சிவப்பு நிறப்பந்தங்கள்

(11)

உள்ளன. சமயாம்படி முறையானது
ஆய் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அதிலிருந்து
ஒரு மந்திர எடுக்கப்படுகிறது.

i) அம்பந்து கருப்பாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.
ii) எடுக்கப்பட்ட மந்திர கருப்பு எனில் முதல் ஆய் யாவிருந்து எடுக்கப்பட்டதற்கான நிகழ்தகவு யாது?

தீர்வு:-
ஆய் கருப்பு சிவப்பு மொத்தம்
I 6 4 10
II 2 2 4.

$$P(A_1) = \frac{1}{2} \quad P(B|A_1) = \frac{6}{10}$$

$$P(A_2) = \frac{1}{2} \quad P(B|A_2) = \frac{2}{4}$$

i) கருப்பு மந்திர இருக்க நிகழ்தகவு

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$$

$$= \left(\frac{1}{2} \times \frac{6}{10}\right) + \left(\frac{1}{2} \times \frac{2}{4}\right)$$

$$= \frac{3}{10} + \frac{1}{4} = \frac{6+5}{20} = \frac{11}{20}$$

ii) கருப்பு மந்திர முதல் ஆய் யாக இருக்க நிகழ்தகவு

$$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \times \frac{6}{10}}{\frac{11}{20}} = \frac{6}{22} \times \frac{20}{11} = \frac{6}{11}$$

3) ஒரு PVC மைம் தயாரிக்கும் நிறுவனம் X, Y மற்றும் Z என்ற மூன்று தொழிற்சாலைகள் மூலம் உற்பத்தி செய்கிறது. X, Y மற்றும் Z களின் தினந்தோறும் உற்பத்தி செய்யும் மைம்களின் அளவுகள் முறையே 2000 அலகுகள், 3000 கள் முறையே 2000 அலகுகள், 3000 அலகுகள் மற்றும் 5000 அலகுகள் ஆகும். முந்தைய திறுணைப் பொறுத்த X, Y மற்றும் Z தொழிற்சாலைகளில் உற்பத்தியாகும் மைம்களின் குறைபாடுகளை முறையே 3%, 4% மற்றும் 2% ஆகும். சமயாம்படி முறையானது ஒரு நாள் உற்பத்தியான மைம் கிடைக்கிறது ஆகையே தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது.

i) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மைம் குறைபாடுள்ளதாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

ii) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மைம் குறைபாடுள்ளதாக இருப்பின் அது தொழிற்சாலை Y யில் உற்பத்தியானதற்கான நிகழ்தகவு என்ன?

$$\text{தீர்வு:- } P(A_1) = \frac{2000}{10000} = \frac{2}{10}$$

$$P(A_2) = \frac{3000}{10000} = \frac{3}{10}$$

$$P(A_3) = \frac{5000}{10000} = \frac{5}{10}$$

$$P(B|A_1) = \frac{3}{100}$$

$$P(B|A_2) = \frac{4}{100}$$

$$P(B|A_3) = \frac{2}{100}$$

ii) கூட்டு நிகழ்தகவு

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)$$

$$= \left(\frac{2}{10} \times \frac{3}{100}\right) + \left(\frac{3}{10} \times \frac{4}{100}\right) + \left(\frac{5}{10} \times \frac{2}{100}\right)$$

$$= \frac{6}{1000} + \frac{12}{1000} + \frac{10}{1000} = \frac{28}{1000}$$

$$= 0.028$$

ii) குறைபாடு Y யில் உற்பத்தியாக இருக்க நிகழ்தகவு

$$P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)}$$

$$= \frac{\frac{3}{10} \times \frac{4}{100}}{\frac{28}{1000}} = \frac{12}{28} = \frac{3}{7}$$

4) ஒரு நிறுவனம் திறுணைத்திய A, B மற்றும் C ஆகியோர் மூன்று மாதங்களுக்குள்ளாக வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் முறையே 5:3:2 என்ற விகிதத்தில் உள்ளனர். A, B மற்றும் C ஆகியோர் வேலையாளர்களாக இருந்தால்

தயவுசெய்து கருத்து தெரிவிக்கவும் (10 மதிப்புகள்)

பிஷுமனக உணவகத்தினை மேல்
மடுத்து உதற்கான நிகழ்தகவுகள்
குறையுடைய 0.4, 0.5 மற்றும் 0.3 ஆக
நிதான்மயனர மேலாளராக நியமனம்
செய்தான். பிஷுமனக உணவகம்
மேல்மடு உதற்கான நிகழ்தகவு
என்ன?

தீர்வு $A : B : C = 5 : 3 : 2$

மொத்தம் = $5 + 3 + 2 = 10$

$P(A_1) = \frac{5}{10}$ $P(B|A_1) = \frac{4}{10}$

$P(A_2) = \frac{3}{10}$ $P(B|A_2) = \frac{5}{10}$

$P(A_3) = \frac{2}{10}$ $P(B|A_3) = \frac{3}{10}$

B என்மயர் மேலாளராக நியமனம்
செய்ய நிகழ்தகவு

$P(A_2|B) = \frac{P(A_2) \cdot P(B|A_2)}{P(B)}$

$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3)$

$= \left(\frac{5}{10} \times \frac{4}{10}\right) + \left(\frac{3}{10} \times \frac{5}{10}\right) + \left(\frac{2}{10} \times \frac{3}{10}\right)$

$= \frac{20}{100} + \frac{15}{100} + \frac{6}{100} = \frac{41}{100}$

$P(A_2|B) = \frac{\frac{3}{10} \times \frac{5}{10}}{\frac{41}{100}} = \frac{\frac{15}{100}}{\frac{41}{100}} = \frac{15}{41}$

5) திருமணமான அணிகள் மற்றும்
பெண்கள் பிரதான நேரத்தில்
காணும் தொணக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளைப்
பற்றி ஒரு வினாடி நியுயனத்தின்
நிர்வாகி அராந்த மயாசூசு கடந்த
காணம் பதினானின் மூன்று பிரதான நேரத்தில்
தொணக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளைக் காணும்
மனைமயர் 60%. சகயர். மனைமயர்
தொணக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளைக்
காணும் நேரத்தில் 40%. கணயர்களும்
தொணக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளைக்
காணும் கண்மயர். மனைமயர் தொணக்
காட்சி நிகழ்ச்சிகளைக் காணாத
நேரங்களில் 30%. கணயர்கள்
தொணக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளைக்
காண்கின்றனர் எனில் (i) பிரதான
நேரத்தில் கணயர் தொணக்காட்சி
காணும் நிகழ்தகவு (ii) கணயர்
தொணக்காட்சி காணும் நேரங்
களில் மனைமயர் தொணக்காட்சி
காணும் நிகழ்தகவு அகியவற்றைக்
காண்க.

தீர்வு $P(A_1) = \frac{60}{100}$ $P(B|A_1) = \frac{40}{100}$

$P(A_2) = \frac{40}{100}$ $P(B|A_2) = \frac{30}{100}$

$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2)$
 $= \left(\frac{60}{100} \times \frac{40}{100}\right) + \left(\frac{40}{100} \times \frac{30}{100}\right)$

$= \frac{24}{100} + \frac{12}{100} = \frac{36}{100} = \frac{9}{25}$

பிரதான நேரத்தில் கணயர்
தொணக்காட்சி காணும்
நிகழ்தகவு $= \frac{9}{25}$

(ii) கணயர் தொணக்காட்சி
காணும் நேரங்களில் மனைமயர்
-யும் தொணக்காட்சி
காணும் நிகழ்தகவு

$P(A_1|B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)}$

$= \frac{\frac{60}{100} \times \frac{40}{100}}{\frac{36}{100}} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$

$= \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$

N. காட்சி (சூசு)
N.H.S.S. குறைந்தவாய்,
காண்கியம் (மன)