

1. கணங்கள், தொடர்புகள் மற்றும் சார்புகள்

- $A = \{(x, y): y = e^x, x \in R\}$ மற்றும் $B = \{(x, y): y = e^{-x}, x \in R\}$ எனில், $n(A \cap B)$ என்பது
 - ∞
 - 0
 - 1
 - 2
- $A = \{(x, y): y = \sin x, x \in R\}$ மற்றும் $B = \{(x, y): y = \cos x, x \in R\}$ எனில், $A \cap B$ -ல்
 - உறுப்புகளில்லை
 - எண்ணிலடங்கா உறுப்புகள் உள்ளன
 - ஒரே ஒரு உறுப்பு உள்ளது
 - தீர்மானிக்க இயலாது
- $A = \{0, -1, 1, 2\}$ எனும் கணத்தில் $|x^2 + y^2| \leq 2$ எனுமாறு xRy ஆக வரையறுக்கப்பட்ட தொடர்பு R எனில், கீழ்க்கண்டவற்றில் எது சரியானது?
 - $R = \{(0,0), (0,-1), (0,1), (-1,0), (-1,1), (1,2), (1,0)\}$
 - $R^{-1} = \{(0,0), (0,-1), (0,1), (-1,0), (1,0)\}$
 - R -ன் சார்பகம் $\{0, -1, 1, 2\}$
 - R -ன் வீச்சகம் $\{0, -1, 1\}$
- $f(x) = |x - 2| + |x + 2|, x \in R$ எனில்,
 - $f(x) = \begin{cases} -2x; x \in (-\infty, -2] \\ 4; x \in (-2, 2] \\ 2x; x \in (2, \infty) \end{cases}$
 - $f(x) = \begin{cases} 2x; x \in (-\infty, -2] \\ 4; x \in (-2, 2] \\ -2x; x \in (2, \infty) \end{cases}$
 - $f(x) = \begin{cases} -2x; x \in (-\infty, -2] \\ -4; x \in (-2, 2] \\ 2x; x \in (2, \infty) \end{cases}$
 - $f(x) = \begin{cases} -2x; x \in (-\infty, -2] \\ 2; x \in (-2, 2] \\ 2x; x \in (2, \infty) \end{cases}$
- R மெய்யெண்களின் கணம் என்க. $R \times R$ -ல் கீழ்க்கண்ட உட்கணங்களைக் கருதுக. $S = \{(x, y): y = x + 1 \text{ மற்றும் } 0 < x < 2\}; T = \{(x, y): x - y \in Z\}$ எனில் கீழ்க்காணும் கூற்றில் எது மெய்யானது?
 - T சமானத் தொடர்பு ஆனால், S சமானத் தொடர்பு அல்ல.
 - S, T இரண்டுமே சமானத் தொடர்பு அல்ல.
 - S, T இரண்டுமே சமானத் தொடர்பு.
 - S சமானத் தொடர்பு ஆனால், T சமானத் தொடர்பு அல்ல.
- இயல் எண்களின் அனைத்துக்கணம் N -க்கு A மற்றும் B உட்கணங்கள் எனில் $A' \cup [(A \cap B) \cup B']$ என்பது
 - A
 - A'
 - B
 - N
- கணிதம் மற்றும் வேதியியல் இரண்டும் பாடங்களாக ஏற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 70. இது கணிதத்தை ஏற்றவர்களின் 10% மற்றும் வேதியியல் ஏற்றவர்களின் 14% ஆகும். இவற்றில் ஏதாவதொன்றைப் பாடமாக ஏற்ற மாணவர்களின் எண்ணிக்கை
 - 1120
 - 1130
 - 1100
 - போதுமான தகவல் இல்லை.
- $n[(A \times B) \cap (A \times C)] = 8$ மற்றும் $n(B \cap C) = 2$ எனில், $n(A)$ என்பது
 - 6
 - 4
 - 8
 - 16
- $n(A) = 2$ மற்றும் $n(B \cup C) = 3$, எனில் $n[(A \times B) \cup (A \times C)]$ என்பது
 - 2^3
 - 3^2
 - 6
 - 5
- A மற்றும் B எனும் இரு கணங்களில் 17 உறுப்புகள் பொதுவானவை எனில், $A \times B$ மற்றும் $B \times A$ ஆகிய கணங்களில் உள்ள பொது உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை
 - 2^{17}
 - 17^2
 - 34
 - போதுமான தகவல் இல்லை.
- வெற்றற்ற கணங்கள் A மற்றும் B என்க. $A \subset B$ எனில் $(A \times B) \cap (B \times A) =$
 - $A \cap B$
 - $A \times A$
 - $B \times B$
 - இவற்றுள் எதுவும் இல்லை.
- 3 உறுப்புகள் கொண்ட கணத்தின் மீதான தொடர்புகளின் எண்ணிக்கை
 - 9
 - 81
 - 512
 - 1024
- ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறுப்புகளைக் கொண்ட கணம் X -ன் மீதான அனைத்துத்தொடர்பு R எனில் R என்பது
 - தற்சுட்டுத் தொடர்பு அல்ல
 - சமச்சீர் தொடர்பல்ல
 - கடப்புத் தொடர்பு
 - இவற்றுள் எதுவுமன்று
- $X = \{1, 2, 3, 4\}$ மற்றும் $R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (3,3), (2,1), (3,1), (1,4), (4,1)\}$ எனில் R என்பது
 - தற்சுட்டுத் தொடர்பு
 - சமச்சீர் தொடர்பு
 - கடப்புத் தொடர்பு
 - சமானத் தொடர்பு
- $\frac{1}{1-2 \sin x}$ என்ற சார்பின் வீச்சகம்
 - $(-\infty, -1) \cup (\frac{1}{3}, \infty)$
 - $(-1, \frac{1}{3})$
 - $[-1, \frac{1}{3}]$
 - $(-\infty, -1) \cup [\frac{1}{3}, \infty)$

16. $f(x) = ||x| - x|, x \in R$ என்ற சார்பின் வீச்சகம்
 1) $[0,1]$ 2) $[0,\infty)$ 3) $[0,1]$ 4) $(0,1)$
17. $f(x) = x^2$ என்ற சார்பு இருபுறச் சார்பாக அமைய வேண்டுமெனில் அதன் சார்பகமும், துணைச்சார்பகமும் முறையே
 1) R, R 2) $R, (0, \infty)$ 3) $(0, \infty), R$ 4) $[0, \infty), [0, \infty)$
18. m உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு கணத்திலிருந்து n உறுப்புகள் கொண்ட ஒரு கணத்திற்கு வரையறுக்கப்படும் மாறிலிச் சார்புகளின் எண்ணிக்கை
 1) mn 2) m 3) n 4) $m+n$
19. $f: [0, 2\pi] \rightarrow [-1, 1]$ என்ற சார்பு $f(x) = \sin x$ என வரையறுக்கப்படுகிறது எனில், அது
 1) ஒன்றுக்கொன்று 2) மேற்கோர்த்தல் 3) இருபுறச் சார்பு 4) வரையறுக்க இயலாது
20. $f: [-3, 3] \rightarrow S$ என்ற சார்பு $f(x) = x^2$ என வரையறுக்கப்பட்டு மேற்கோர்த்தல் எனில், S என்பது
 1) $[-9, 9]$ 2) R 3) $[-3, 3]$ 4) $[0, 9]$
21. $X = \{1, 2, 3, 4\}, Y = \{a, b, c, d\}$ மற்றும் $f = \{(1, a), (4, b), (2, c), (3, d), (2, d)\}$ எனில் f என்பது
 1) ஒன்றுக்கொன்றானச் சார்பு 2) மேற்கோர்த்தல் சார்பு 3) ஒன்றுக்கொன்று அல்லாத சார்பு 4) சார்பன்று
22. $f(x) = \begin{cases} x & ; x < 1 \\ x^2 & ; 1 \leq x \leq 4 \\ 8\sqrt{x} & ; x > 4 \end{cases}$ எனில்
 1) $f^{-1}(x) = \begin{cases} x & ; x < 1 \\ \sqrt{x} & ; 1 \leq x \leq 16 \\ \frac{x^2}{64} & ; x > 16 \end{cases}$ 2) $f^{-1}(x) = \begin{cases} -x & ; x < 1 \\ \sqrt{x} & ; 1 \leq x \leq 16 \\ \frac{x^2}{64} & ; x > 16 \end{cases}$
 3) $f^{-1}(x) = \begin{cases} x^2 & ; x < 1 \\ \sqrt{x} & ; 1 \leq x \leq 16 \\ \frac{x^2}{64} & ; x > 16 \end{cases}$ 4) $f^{-1}(x) = \begin{cases} 2x & ; x < 1 \\ \sqrt{x} & ; 1 \leq x \leq 16 \\ \frac{x^2}{8} & ; x > 16 \end{cases}$
23. $f: R \rightarrow R$ -ல் சார்பு $f(x) = 1 - |x|$ என வரையறுக்கப்படுகிறது எனில், f -ன் வீச்சகம்
 1) R 2) $(1, \infty)$ 3) $(-1, \infty)$ 4) $(-\infty, 1]$
24. $f: R \rightarrow R$ -ல் $f(x) = \sin x + \cos x$ எனில், f ஆனது
 1) ஒரு ஒற்றைப்படைச் சார்பு 2) ஒற்றைப்படையுமல்ல இரட்டைப்படையுமல்ல
 3) ஒரு இரட்டைப்படைச் சார்பு 4) ஒற்றைப்படை மற்றும் இரட்டைப்படைச் சார்பு
25. $f: R \rightarrow R$ -ல் $f(x) = \frac{(x^2 + \cos x)(1 + x^4)}{(x - \sin x)(2x - x^3)} + e^{-|x|}$ எனில், f
 1) ஒரு ஒற்றைப்படைச் சார்பு 2) ஒற்றைப்படையுமல்ல இரட்டைப்படையுமல்ல
 3) ஒரு இரட்டைப்படைச் சார்பு 4) ஒற்றைப்படை மற்றும் இரட்டைப்படைச் சார்பு

விடைகள் :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
3	2	4	1	1	4	2	2	3	2	2	3	3	2	4	3	4	3	2	4	4	1	4	2	3

2. அடிப்படை இயற்கணிதம்

1. $|x + 2| \leq 9$ எனில், x அமையும் இடைவெளி
 1) $(-\infty, -7)$ 2) $[-11, 7]$ 3) $(-\infty, -7) \cup [11, \infty)$ 4) $(-11, 7)$
2. x, y மற்றும் b ஆகியவை மெய்யெண்கள் மற்றும் $x < y, b > 0$ எனில்,
 1) $xb < yb$ 2) $xb > yb$ 3) $xb \leq yb$ 4) $\frac{x}{b} \geq \frac{y}{b}$
3. $\frac{|x-2|}{x-2} \geq 0$ எனில், x அமையும் இடைவெளி
 1) $[2, \infty)$ 2) $(2, \infty)$ 3) $(-\infty, 2)$ 4) $(-2, \infty)$
4. $5x - 1 < 24$ மற்றும் $5x + 1 > -24$ என்ற அசமன்பாடுகளின் தீர்வு
 1) $(4, 5)$ 2) $(-5, -4)$ 3) $(-5, 5)$ 4) $(-5, 4)$
5. $|x - 1| \geq |x - 3|$ என்ற அசமன்பாட்டின் தீர்வுக்கணம்
 1) $[0, 2]$ 2) $(2, \infty)$ 3) $(0, 2)$ 4) $(-\infty, 2)$
6. $\log_{\sqrt{2}} 512$ -ன் மதிப்பு
 1) 16 2) 18 3) 9 4) 12
7. $\log_3 \frac{1}{81}$ -ன் மதிப்பு
 1) -2 2) -8 3) -4 4) -9

8. $\log_{\sqrt{x}} 0.25 = 4$ எனில், x -ன் மதிப்பு
 1) 0.5 2) 2.5 3) 1.5 4) 1.25
9. $\log_a b \log_b c \log_c a$ -ன் மதிப்பு
 1) 2 2) 1 3) 3 4) 4
10. 343-ன் மடக்கை 3 எனில், அதன் அடிமானம்
 1) 5 2) 7 3) 6 4) 9
11. $2x^2 + (a - 3)x + 3a - 5 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களின் கூடுதல் மற்றும் பெருக்கல்பலன் ஆகியவை சமம் எனில், a -ன் மதிப்பு
 1) 1 2) 2 3) 0 4) 4
12. $x^2 - kx + 16 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்கள் a மற்றும் b ஆகியவை $a^2 + b^2 = 32$ -ஐ நிறைவு செய்யும் எனில், k -ன் மதிப்பு
 1) 10 2) -8 3) -8,8 4) 6
13. $x^2 + |x - 1| = 1$ -ன் தீர்வுகளின் எண்ணிக்கை
 1) 1 2) 0 3) 2 4) 3
14. $3x^2 - 5x - 7 = 0$ -ன் மூலங்களுக்கு எண்ணளவில் சமமாகவும், எதிர் குறியீடுகளையும் உடைய மூலங்களைக் கொண்ட சமன்பாடு
 1) $3x^2 - 5x - 7 = 0$ 2) $3x^2 + 5x - 7 = 0$ 3) $3x^2 - 5x + 7 = 0$ 4) $3x^2 + x - 7 = 0$
15. $x^2 + ax + c = 0$ -ன் மூலங்கள் 8 மற்றும் 2 ஆகும். மேலும், $x^2 + dx + b = 0$ -ன் மூலங்கள் 3,3 எனில், $x^2 + ax + b = 0$ -ன் மூலங்கள்
 1) 1,2 2) -1,1 3) 9,1 4) -1,2
16. $x^2 - kx + c = 0$ -ன் மெய் மூலங்கள் a, b எனில், $(a, 0)$ மற்றும் $(b, 0)$ -க்கு இடைப்பட்ட தூரம்
 1) $\sqrt{k^2 - 4c}$ 2) $\sqrt{4k^2 - c}$ 3) $\sqrt{4c - k^2}$ 4) $\sqrt{k - 8c}$
17. $\frac{kx}{(x+2)(x-1)} = \frac{2}{x+2} + \frac{1}{x-1}$ எனில், k -ன் மதிப்பு
 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
18. $\frac{1-2x}{3+2x-x^2} = \frac{A}{3-x} + \frac{B}{x+1}$ எனில், $A + B$ -ன் மதிப்பு
 1) $\frac{-1}{2}$ 2) $\frac{-2}{3}$ 3) $\frac{1}{2}$ 4) $\frac{2}{3}$
19. $(x + 3)^4 + (x + 5)^4 = 16$ -ன் மூலங்களின் எண்ணிக்கை
 1) 4 2) 2 3) 3 4) 0
20. $\log_3 11 \log_{11} 13 \log_{13} 15 \log_{15} 27 \log_{27} 81$ -ன் மதிப்பு
 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4

விடைகள்:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1	1	3	2	2	3	1	2	2	2	3	3	2	3	1	3	1	1	4

3. முக்கோணவியல்

1. $\frac{1}{\cos 80^\circ} - \frac{\sqrt{3}}{\sin 80^\circ} =$
 1) $\sqrt{2}$ 2) $\sqrt{3}$ 3) 2 4) 4
2. $\cos 28^\circ + \sin 28^\circ = k^3$ எனில், $\cos 17^\circ$ இன் மதிப்பு
 1) $\frac{k^3}{\sqrt{2}}$ 2) $-\frac{k^3}{\sqrt{2}}$ 3) $\pm \frac{k^3}{\sqrt{2}}$ 4) $-\frac{k^3}{\sqrt{3}}$
3. $4\sin^2 x + 3\cos^2 x + \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2}$ இன் மீப்பெரு மதிப்பு
 1) $4 + \sqrt{2}$ 2) $3 + \sqrt{2}$ 3) 9 4) 4
4. $\left(1 + \cos \frac{\pi}{8}\right) \left(1 + \cos \frac{3\pi}{8}\right) \left(1 + \cos \frac{5\pi}{8}\right) \left(1 + \cos \frac{7\pi}{8}\right) =$
 1) $\frac{1}{8}$ 2) $\frac{1}{2}$ 3) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 4) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
5. $\pi < 2\theta < \frac{3\pi}{2}$ எனில், $\sqrt{2 + \sqrt{2 + 2\cos 4\theta}}$ இன் மதிப்பு
 1) $-2\cos \theta$ 2) $-2\sin \theta$ 3) $2\cos \theta$ 4) $2\sin \theta$
6. $\tan 40^\circ = \lambda$ எனில், $\frac{\tan 140^\circ - \tan 130^\circ}{1 + \tan 140^\circ \tan 130^\circ} =$
 1) $\frac{1-\lambda^2}{\lambda}$ 2) $\frac{1+\lambda^2}{\lambda}$ 3) $\frac{1+\lambda^2}{2\lambda}$ 4) $\frac{1-\lambda^2}{2\lambda}$

- 1) $30^4 \times 29^2$ 2) $30^3 \times 29^3$ 3) $30^2 \times 29^4$ 4) 30×29^5
4. எல்லாம் ஒற்றை எண்களாகக் கொண்ட 5 இலக்க எண்களின் எண்ணிக்கை
1) 25 2) 5^5 3) 5^6 4) 625
5. 3 விரல்களில், 4 மோதிரங்களை அணியும் வழிகளின் எண்ணிக்கை
1) $4^3 - 1$ 2) 3^4 3) 68 4) 64
6. $(n + 5)P_{(n+1)} = \left(\frac{11(n-1)}{2}\right)(n + 3)P_n$ எனில், n-ன் மதிப்பு
1) 7 மற்றும் 11 2) 6 மற்றும் 7 3) 2 மற்றும் 11 4) 2 மற்றும் 6
7. அடுத்தடுத்த r மிகை முழு எண்களின் பெருக்கற்பலன் எதனால் வகுபடும்
1) $r!$ 2) $(r - 1)!$ 3) $(r + 1)!$ 4) r^r
8. குறைந்தபட்சம் ஒரு இலக்கம் மீண்டும் வருமாறு 5 இலக்க தொலைபேசி எண்களின் எண்ணிக்கை
1) 90000 2) 10000 3) 30240 4) 69760
9. $a^2 - aC_2 = a^2 - aC_4$ எனில் a-ன் மதிப்பு
1) 2 2) 3 3) 4 4) 5
10. ஒரு தளத்தில் 10 புள்ளிகள் உள்ளன. ஆவற்றில் 4 ஒரே கோடமைவன. ஏதேனும் இரு புள்ளிகளை இணைத்து கிடைக்கும் கோடுகளின் எண்ணிக்கை
1) 45 2) 40 3) 39 4) 38
11. ஒரு விழாவிற்கு 12 நபர்களில் 8 நபர்களை ஒரு பெண் அழைக்கிறார். இதில் இருவர் ஒன்றாக விழாவிற்கு வரமாட்டார்கள் எனில், அவர்களை அழைக்கும் வழிகளின் எண்ணிக்கை
1) $2 \times 11C_7 + 10C_8$ 2) $11C_7 + 10C_8$ 3) $12C_8 - 10C_6$ 4) $10C_6 + 2!$
12. நான்கு இணையான கோடுகளின் தொகுப்பானது மூன்று இணையான கோடுகளைக் கொண்ட மற்றொரு தொகுப்பை வெட்டும்போது உருவாகும் இணைகரங்களின் எண்ணிக்கை
1) 6 2) 9 3) 12 4) 18
13. ஓர் அறையில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் மற்றவருடன் கைக்குலுக்குகிறார்கள். 66 கைக்குலுக்கல் நிகழ்கின்றது எனில், அந்த அறையில் உள்ள நபர்களின் எண்ணிக்கை
1) 11 2) 12 3) 10 4) 6
14. 44 மூலைவிட்டங்கள் உள்ள ஒரு பலகோணத்தின் பக்கங்களின் எண்ணிக்கை
1) 4 2) $4!$ 3) 11 4) 22
15. எந்த இரண்டு கோடுகளும் இணையாக இல்லாமலும் மற்றும் எந்த மூன்று கோடுகளும் ஒரு புள்ளியில் வெட்டிக்கொள்ளாமலும் இருக்குமாறு ஒரு தளத்தின் மீது 10 நேர்க்கோடுகள் வரையப்பட்டால், கோடுகள் வெட்டிக்கொள்ளும் புள்ளிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை
1) 45 2) 40 3) $10!$ 4) 2^{10}
16. ஒரு தளத்தில் உள்ள 10 புள்ளிகளில் 4 புள்ளிகள் ஒரு கோடமைவன எனில், அவற்றை கொண்டு உருவாக்கும் முக்கோணங்களின் எண்ணிக்கை
1) 110 2) $10C_3$ 3) 120 4) 116
17. $2nC_3 : nC_3 = 11:1$ எனில் n-ன் மதிப்பு
1) 5 2) 6 3) 11 4) 7
18. $(n - 1)C_r + (n - 1)C_{(r-1)}$ என்பது
1) $(n + 1)C_r$ 2) $(n - 1)C_r$ 3) nC_r 4) nC_{r-1}
19. 52 சீட்டுகள் உள்ள ஒரு சீட்டுக்கட்டிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும் 5 சீட்டுகளில் குறைந்தபட்சம் ஒரு இராஜா சீட்டு இருக்குமாறு உள்ள வழிகளின் எண்ணிக்கை
1) $52C_5$ 2) $48C_5$ 3) $52C_5 + 48C_5$ 4) $52C_5 - 48C_5$
20. ஒரு சதுரங்க அட்டையில் உள்ள செவ்வகங்களின் எண்ணிக்கை
1) 81 2) 9^9 3) 1296 4) 6561
21. 2 மற்றும் 3 இலக்கங்களை கொண்டு உருவாக்கப்படும் 10 இலக்க எண்களின் எண்ணிக்கை
1) $10C_2 + 9C_2$ 2) 2^{10} 3) $2^{10} - 2$ 4) $10!$
22. P_r என்பது rP_r ஐ குறித்தால் $1 + P_1 + 2P_2 + 3P_3 + \dots + nP_n$ என்ற தொடரின் கூடுதல்
1) P_{n+1} 2) $P_{n+1} - 1$ 3) $P_{n-1} + 1$ 4) $(n + 1)P_{(n-1)}$
23. முதல் n ஒற்றை இயல் எண்களின் பெருக்கலின் மதிப்பு
1) $2nC_n \times nP_n$ 2) $\left(\frac{1}{2}\right)^n \times 2nC_n \times nP_n$ 3) $\left(\frac{1}{4}\right)^n \times 2nC_n \times 2nP_n$ 4) $nC_n \times nP_n$
24. nC_4, nC_5, nC_6 ஆகியவை APயில் (கூட்டுத்தொடரில்) உள்ளன எனில், n-ன் மதிப்பு
1) 14 2) 11 3) 9 4) 5
25. $1 + 3 + 5 + 7 + \dots + 17$ -ன் மதிப்பு

- 1) 101 2) 81 3) 71 4) 61

விடைகள் :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2	2	1	2	4	2	1	4	2	2	3	4	2	3	1	4	2	3	4	3	2	2	2	1	2

5. ஈருறுப்புத் தேற்றம், தொடர்முறைகள் மற்றும் தொடர்கள்

1. $2 + 4 + 6 + \dots + 2n$ -ன் மதிப்பு
 1) $\frac{n(n-1)}{2}$ 2) $\frac{n(n+1)}{2}$ 3) $\frac{2n(2n+1)}{2}$ 4) $n(n+1)$
 2. $(2+2x)^{10}$ இல் x^6 - ன் கெழு
 1) $10C_6$ 2) 2^6 3) $10C_6 2^6$ 4) $10C_6 2^{10}$
 3. $(2x+3y)^{20}$ என்ற விரிவில் $x^8 y^{12}$ -ன் கெழு
 1) 0 2) $2^8 3^{12}$ 3) $2^8 3^{12} + 2^{12} 3^8$ 4) $20C_8 2^8 3^{12}$
 4. r -ன் எல்லா மதிப்புக்கும் $nC_{10} > nC_r$ எனில், n -ன் மதிப்பு
 1) 10 2) 21 3) 19 4) 20
 5. இரு எண்களின் கூட்டுச்சராசரி a மற்றும் பெருக்குச் சராசரி g எனில்,
 1) $a \leq g$ 2) $a \geq g$ 3) $a = g$ 4) $a > g$
 6. $(1+x^2)^2(1+x)^n = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + x^{n+4}$ மற்றும் a_0, a_1, a_2 ஆகியவை கூட்டுத் தொடர்முறை எனில், n -ன் மதிப்பு
 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4
 7. $a, 8, b$ என்பன கூட்டுத்தொடர் முறை, $a, 4, b$ என்பன பெருக்குத் தொடர்முறை மற்றும் a, x, b என்பன இசைத் தொடர்முறை எனில், x -ன் மதிப்பு
 1) 2 2) 1 3) 4 4) 16
 8. $\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{3}+2\sqrt{2}}, \dots$ என்ற தொடர்முறை
 1) கூட்டுத்தொடர் முறை 2) பெருக்குத் தொடர்முறை
 3) இசைத் தொடர்முறை 4) கூட்டு பெருக்குத் தொடர்முறை
 9. இரு மிகை எண்களின் கூட்டுச் சராசரி மற்றும் பெருக்குச் சராசரி முறையே 16 மற்றும் 8 எனில், அவற்றின் இசைச்சராசரி
 1) 10 2) 6 3) 5 4) 4
 10. பொது வித்தியாசம் d ஆக உள்ள ஒரு கூட்டுத் தொடரின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல் S_n எனில், $S_n - 2S_{n-1} + S_{n-2}$ -ன் மதிப்பு
 1) 0 2) $2d$ 3) $4d$ 4) d^2
 11. 38^{15} ஐ 13 ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதி
 1) 12 2) 1 3) 11 4) 5
 12. $1, 2, 4, 7, 11, \dots$ என்ற தொடர்முறையின் n ஆவது உறுப்பு
 1) $n^3 + 3n^2 + 2n$ 2) $n^3 - 3n^2 + 3n$ 3) $\frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ 4) $\frac{n^2-n+2}{2}$
 13. $\frac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{7}} + \dots$ என்ற தொடரின் முதல் n உறுப்புகளின் கூடுதல்
 1) $\sqrt{2n+1}$ 2) $\frac{\sqrt{2n+1}}{2}$ 3) $\sqrt{2n+1} - 1$ 4) $\frac{\sqrt{2n+1}-1}{2}$
 14. $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \frac{15}{16}, \dots$ என்ற தொடர்முறையின் n ஆவது உறுப்பு
 1) $2^n - n - 1$ 2) $1 - 2^{-n}$ 3) $2^{-n} + n - 1$ 4) 2^{n-1}
 15. $\sqrt{2} + \sqrt{8} + \sqrt{18} + \sqrt{32} + \dots$ என்ற தொடரின் n உறுப்புகளின் கூடுதல்
 1) $\frac{n(n+1)}{2}$ 2) $2n(n+1)$ 3) $\frac{n(n+1)}{2}$ 4) 1
 16. $\frac{1}{2} + \frac{7}{4} + \frac{13}{8} + \frac{19}{16} + \dots$ என்ற தொடரின் மதிப்பு
 1) 14 2) 7 3) 4 4) 6
 17. ஒரு முடிவற்ற பெருக்குத் தொடரின் மதிப்பு 18 மற்றும் அதன் முதல் உறுப்பு 6 எனில் பொது விகிதம்
 1) $\frac{1}{3}$ 2) $\frac{2}{3}$ 3) $\frac{1}{6}$ 4) $\frac{3}{4}$
 18. e^{-2x} என்ற தொடரில் x^5 -ன் கெழு

14. p மற்றும் q ஆகியவற்றின் எந்த மதிப்புகளுக்கும் $(p + 2q)x + (p - 3q)y = p - q$ என்ற கோட்டின் மீது அமையும் புள்ளி
- 1) $(\frac{3}{2}, \frac{5}{2})$ 2) $(\frac{2}{5}, \frac{2}{5})$ 3) $(\frac{3}{5}, \frac{3}{5})$ 4) $(\frac{2}{5}, \frac{3}{5})$
15. $(1,2)$ மற்றும் $(3,4)$ ஆகிய இரு புள்ளியிலிருந்து சமத் தொலைவிலும், $2x - 3y = 5$ என்ற கோட்டின் மீது அமைந்துள்ள புள்ளி
- 1) $(7,3)$ 2) $(4,1)$ 3) $(1,-1)$ 4) $(-2,3)$
16. $y = -x$ என்ற கோட்டிற்கு $(2,3)$ என்ற புள்ளியின் பிம்பப்புள்ளி
- 1) $(-3,-2)$ 2) $(-3,2)$ 3) $(-2,-3)$ 4) $(3,2)$
17. $\frac{x}{3} - \frac{y}{4} = 1$ என்ற கோட்டிற்கு ஆதியிலிருந்து செங்குத்துத் தொலைவு
- 1) $\frac{11}{5}$ 2) $\frac{5}{12}$ 3) $\frac{12}{5}$ 4) $\frac{5}{7}$
18. $2x - 3y + 1 = 0$ என்ற கோட்டிற்குச் செங்குத்தாகவும் $(1,3)$ என்ற புள்ளி வழியே செல்லும் நேர்க்கோட்டின் y வெட்டுத்துண்டு
- 1) $\frac{3}{2}$ 2) $\frac{9}{2}$ 3) $\frac{2}{3}$ 4) $\frac{2}{9}$
19. $x + (2k - 7)y + 3 = 0$ மற்றும் $3kx + 9y - 5 = 0$ இவ்விரு கோடுகள் செங்குத்தானவை எனில் k -ன் மதிப்பு
- 1) $k = 3$ 2) $k = \frac{1}{3}$ 3) $k = \frac{2}{3}$ 4) $k = \frac{3}{2}$
20. ஒரு சதுரத்தின் ஒரு முனை ஆதியாகவும் மற்றும் அதன் ஒரு பக்கம் $4x + 3y - 20 = 0$ என்ற கோட்டின் மீதும் அமைந்திருந்தால், அந்த சதுரத்தின் பரப்பு
- 1) 20ச.அ 2) 16ச.அ 3) 25ச.அ 4) 4ச.அ
21. $6x^2 + 41xy - 7y^2 = 0$ என்ற இரட்டைக் கோடுகள் x - அச்சுடன் ஏற்படுத்தும் கோணங்கள் α மற்றும் β எனில், $\tan \alpha \tan \beta = ?$
- 1) $-\frac{6}{7}$ 2) $\frac{6}{7}$ 3) $-\frac{7}{6}$ 4) $\frac{7}{6}$
22. $x^2 - 4y^2 = 0$ மற்றும் $x = a$ என்ற கோடுகளால் உருவாக்கப்படும் முக்கோணத்தின் பரப்பு
- 1) $2a^2$ 2) $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$ 3) $\frac{1}{2}a^2$ 4) $\frac{2}{\sqrt{3}}a^2$
23. $6x^2 - xy + 4cy^2 = 0$ என்ற கோடுகளில் ஒரு கோடானது $3x + 4y = 0$ எனில் c -ன் மதிப்பு
- 1) -3 2) -1 3) 3 4) 1
24. $x^2 - xy - 6y^2 = 0$ என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் θ எனில் $\frac{2 \cos \theta + 3 \sin \theta}{4 \sin \theta + 5 \cos \theta}$ -ன் மதிப்பு
- 1) 1 2) $-\frac{1}{9}$ 3) $\frac{5}{9}$ 4) $\frac{1}{9}$
25. $x^2 + 2xy \cot \theta - y^2 = 0$ என்ற இரட்டை நேர்க்கோட்டின் சமன்பாடுகளில் ஒரு சமன்பாடு
- 1) $x - y \cot \theta = 0$ 2) $x + y \tan \theta = 0$ 3) $x \cos \theta + y(\sin \theta + 1) = 0$ 4) $x \sin \theta + y(\cos \theta + 1) = 0$
- விடைகள் :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
4	4	3	4	3	2	2	4	2	3	1	2	3	4	2	1	3	2	1	2	1	3	1	3	4